
HONI · SOI
AL · Y · PENSE



The Marquis of Stafford.

16218/c
16846.48c

S.
19.11.06
293





JOANNES BURMANNUS Med: Doct:
Botan: Profess: Amstelæd: anno aetatis trigesimo.

Non haec effigies BURMANNI sculpta: sed ipsum
Arte Promethea vivere in aere vides.
Talis Paeoniis meditatur pellere morbos
Viribus, aut laetas Chloridos auget opes.
His oculis proavi, genitorque hac fronte renident.
Nil non egregiae pignora gentis habet.
Gaudeat Amstelidum longos Hygiea perannos
Huic tabulae carum composuisse caput.

JAC. PHIL. D'ORVILLE.

J. M. Quinkhard Pinxit 1736. — J. Houbraken sculpsit Amst.

THESAURUS ZEYLANICUS,

exhibens

PLANTAS IN INSULA ZEYLANA NASCENTES;

Inter quas

Plurimae novae ſpecies, & genera inveniuntur.
Omnia Iconibus illuſtrata, ac deſcripta

CURA & STUDIO

JOANNIS BURMANNI,

Med. Doct. & Botanices Profeſſoris in Horto Medico Amſtelaedamenſi.



A. van der Laan inv. et fec. 1736.

AMSTELÆDAMI,

Apud JANSSONIO-WAESBERGIOS, & SALOMONEM SCHOUTEN.

MDCCXXXVII.

WELLCOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

ILLUSTRISSIMIS & AMPLISSIMIS

INCLYTAE REIP.

AMSTELAEDAMENSIS

CUM MAXIME

CONSULIBUS

JOANNI VAN DE POLL,

JOANNI SIX,

LIEVE GEELVINK,

GUILIELMO MUNTER,

ET CONSULARIBUS

NICOLAO SAUTYN,

ÆGIDIO VAN DEN BEMPDEN,

MATTHEO LESTEVENON,

GERARDO CORVER,

BALTHAZARI SCOTT,

DIDERICO TRIP,

PATRIAE PATRIBUS,

CIVIUM DELICIIS,

BONARUM ARTIUM PATRONIS,

HORTI MEDICI CURATORIBUS,

S. P. D.

JOANNES BURMANNUS.

ILLUSTRISSIMIS & AMPLISSIMIS

INCLYTAE REIP.

AMSTELAEDAMENSIS

CUM MAXIME

CONSULIBUS

JOANNI VAN DE POLL,

JOANNI SIX,

LAEVINO GEELVINK,

GUILIELMO MUNTER,

ET CONSULARIBUS

NICOLAO SAUTYN,

AEGIDIO VAN DEN BEMPDEN,

MATTHEO LESTEVENON,

GERARDO CORVER,

BALTHAZARI SCOTT,

DIDERICO TRIP,

PATRIAE PATRIBUS,

CIVIUM DELICIIS,

BONARUM ARTIUM PATRONIS,

HORTI MEDICI CURATORIBUS,

S. P. D.

JOANNES BURMANNUS.

SOllicitus diu, dubiusque animi haesi, an nominibus veſtris tam ſplendidis, quam magnificis, & honoratis Opuſculum hoc qualecunque auderem inſcribere; Animo autem mecum reputans, VIRI AMPLISSIMI & NOBILISSIMI, vos non tantum bonarum artium fautores, & vindices eſſe, ſed & inſtauratores, curatoresque Horti noſtri publici, qui tam copioſe & ornate inſtructus eſt, ut parem ſibi vix ullum agnoſcat, nulli alii dignius hoc qualecunque ſcriptum offerri poſſe, aut inſcribi, quam VESTRIS NOMINIBUS perſuaſum mihi habeo, ut qui maxime: Unde & publice obſtrictiſſimum me vobis profiteri pro tot tantisque in me collatis beneficiis, quibus me tanto favore, & honore proſequi dignati fuiſtis, hac occaſione debui & volui, ut & porro certi eſſe posſitis, provinciam hanc, quam mihi credidiſtis, non ingrato, nec indigno prorſus, ut ſpero, demandatam fuiſſe. Omnia vero, quae tum temporis in hiſce profeceram, publice id enim profiteri

non erubeſco, unice me Batavo illi Apollini, *Hermanno* nempe *Boerhavio*, cujus teſtimonio & inpulſu me, vix tyrocinio ſtudiorum in Academia depoſito, ad hunc gradum evexiſtis, acceptum referre fateor, & grato id ſemper animo agnoſcam. Ut interim vobis appareat, mihi, ex quo huic Spartae admotus fui, non deſidi in otio, aut ignavo torpore tempus effluxiſſe, VIRI NOBILISSIMI & AMPLISSIMI, hae paginae vos certiores facere, ut puto, valebunt, quod ſi vobis approbavero, erit, quod mihi calcar addet ad majora etiam tentanda, ut & famam illam, quam per deceſſores meos doctiſſimos & celeberrimos Hortus veſter Medicus in toto terrarum orbe obtinuit, non tantum conſervare, ſed & eam ulterius propagare poſſim. Interim ſcriptum hoc tanquam obſequioſi, ac grati erga vos animi pignus ac monumentum habete, & ſuſcipite.

Valete, VIRI ILLUSTRES & AMPLISSIMI, Patriae Patres, ac Literarum egregii cuſtodes, ac vindices: & in publicae rei decus & columen diu felices, ac ſuperſtites agite, noſtrisque his laboribus favere, univerſaeque bonarum artium ſaluti porro conſulere velitis, etiam atque etiam oro.

Æquis

Æquis, & Rei Herbariae ſtudioſis Lectoribus

S. D.

JOANNES BURMANNUS.

Exhibeo vobis, L. B. elegantiſſimam rariorum plantarum in inſula Zeylana naſcentium Syllogen, quae ex plurimis auctoribus, qui has plantas commemorarunt, vel de iis ex profeſſo egerunt, nec non ex Herbariis vivis collecta eſt. Vulgares, & plures aliae vilioris pretii ſine dubio ſuperſunt, ſed quae non magni erunt momenti, earum vero praecipuas pro ſpecimine, quae Operi ipſi non ita apte interponi poterant, ex optimo illo ſcriptore *Grimmio*, hic ut loco maxime idoneo inſeram: Qui poſtquam diſtincte variarum plantarum virtutes, praeparationes ex iis, & uſus Medicos in *Laboratorio ſuo Ceylanico* deſcripſerat, haec ſub finem *pag.* 113. addit.

„ Supereſt nobis adhuc magna quantitas Herbarum, tam in hor-
„ tis, quam in ſylvis. &c. Ego vero nomina earundem ſubji-
„ ciam; ſunt autem, quae ſequuntur: Aſclepias, Auricula Mu-
„ ris, Acetoſa, Acetoſella, Arthemiſia, Aſparagus ſylveſtris,
„ Bardana minor, Baſilicon, Caryophyllus hortenſis, Ciſtus,
„ Conyza, Cichoreum, Colocaſia, Curcuma, Dracunculus mi-
„ nor, Dracontium, Endivia, Filix cum maxima parte gene-
„ rum ab iſto dependentium, Foeniculum, Faba, cujus innume-
„ rae ſunt variae ſpecies, Gentianella, Glycyrrhiza, Hedera ter-
„ reſtris, Kali, Lactuca, Lingua Cervina, Lonchitis, Arbor ex
„ qua Lacca provenit, Laſer, e qua Aſſa Foetida, Malva, Ma-
„ tricaria, Myrtus Indica, Nepeta, Naſturtium, Petroſelinum,

„ Por-

„ Portulaca, Pimpinella, Perſicaria, Ros Solis, Rosmarinus,
„ Ruta, Scabioſa, Scilla, Selinum, Semper Vivum, Triorchis,
„ Trifolia, Verbena *Bontii*, Veronica *Bontii*, Urticae varia ge-
„ nera &c. Quibus porro addit: „ hac in re praeſtantiſſimus eſt
„ Dominus Doctor noſter *Paulus Herman*, non ſecus ac in
„ cognitione aliorum naturalium, nec dubito, quin ſuo tempore
„ nobis praebeat occaſionem, aliquid extraordinarium ab eo re-
„ cuperandi.

Sed dolendum eſt, quod vir ille in hiſce verſatiſſimus, & Academiae Lugd. Batavae ſummum poſtea Lumen, propoſitum ſuum exſequi haud potuerit; Ille enim aliquot per annos inſulae Zeylanae Medicus oportunam ibi nactus eſt occaſionem omnia, quae ad forum hoc ſpectant, detegendi, indagandi, & perſcrutandi, horumque obſervatorum experimenta annotandi, ut ſedulus etiam, & accuratiſſimus harum rerum inveſtigator fuit, quod non tantum *Hortus Lugd. Batavus* ab eo conſcriptus, & *Paradiſus Batavus* poſt fata ejus in lucem publicam emiſſus docent, ſed maximus inſuper plantarum numerus ad amicos, dum adhuc in inſula Zeylana verſabatur, transmiſſus liquido oſtendit: harum autem omnium, ſi vitam ejus produxiſſet ſummum Numen, accuratam deſcriptionem, earumque hiſtoriam, nec non uſum Medicum in *Muſaeo ſuo Zeylanico* explanaſſet, quod poſt ejus mortem inperfectum adeo, & nullo modo elaboratum, ſed veluti Chaos confuſum eſt ed tum: ita ut tam pauca ex diuturno illo labore, quem ſummus ille vir inter tot incommoda, ac pericula indefeſſo ſtudio, & magno animo ſuſceperat, nobis ſuperſint. *Hermannus* enim unicus ille eſt, cui notitiam plantarum Zeylanenſium, quae ad nos pervenit, acceptam referre debemus; omnes enim plantas Zeylanenſes, quas ab auctoribus memoratas, vel deſcriptas invenimus, pauciſſimis quibusdam exceptis, ab *Hermanno* reliqui habuere, vel ab amicis, quibuſcum eas communicaverat, accepe-
runt;

runt; has tamen omnes in noſtro Opere videbitis collectas, in ordinem Alphabeticum digeſtas, ad certa ſua genera revocatas, & plurimas deſcriptionibus & figuris tanquam ad vivum expreſſis, a nobis illuſtratas; inter quas multae etiam occurrunt a nullis aliis adhuc obſervatae, quarum quaedam novi plane ſunt generis, quas ex vero *herbario* ipſius *Hermanni* maxima ex parte Lectoribus hic offero; Herbarium illum quondam, cum in Zeylana morabatur, ad Nobiliſſ. *Joannem Commelinum* elegantiſſime & nitidiſſime exſiccatum, ac diligentiſſime conſervatum tranſmiſit, quem poſtea Celeberrimus *Casparus Commelinus* deceſſor meus honoratiſſimus poſſedit, poſt cujus obitum filius illius, ejusdem nominis, ac virtutis haeres, me Operis illius participem fecit, ac poſſeſſorem. Qui theſaurus, quum ſatis diu jam, ut puto, delituiſſet, longius eum inter privatos Lares celare, ac publico invidere nefas duxi; praeſertim cum & altera talis gaza, qua priorem locupletare poteram, apud me ſupereſſet. Eſt autem illa collectio ſatis magna plantarum itidem Zeylonenſium, quas ſedulus ille *Joannes Hartog*, quum in Zeylonam fuit miſſus, obſervavit, & quas ad *Cornelium Voſſium* hortulanum nuper horti noſtri Amſtelaedamenſis laudatiſſimum quondam transmiſerat, qui mihi collectionem illam ante ſuum obitum commiſit ac credidit, in qua varias reperi plantas in *Herbario Hermanni* non occurrentes, ſed quae ſaepiſſime peſſimis nominibus, unde *Hertog* in hiſce non adeo verſatus mihi viſus eſt, fuere denominatae, ita ut plurima illarum nomina mutare, aliaque magis convenientia, & appoſita inponere coactus fuerim: *Hermanni* autem, quantum potui, ſi accuratiora non requirebantur, retinui. Haec prima fuere fundamenta Operis noſtri, quod in initio non adeo amplum in lucem publicam edere deſtinaveram: quum vero in examine illarum plantarum viderem, dignum fore, quod majori cura elaboretur, opus, praeſertim quum *Muſaeum* illud *Zeylanicum* adeo confuſe ſit divulgatum, ut ſaepius ter quar-

terve una eademque planta diverfis proponatur nominibus, in ordinem illud redigere incepi, privato prius commodo & ufui, nunc autem publico; ut arbitror: Quibus porro aliorum auctorum fynonyma, quae cum hifce plantis Zeylonenfibus congruere, ac conferitire videbantur, adjunxi. Varias infuper plantas aeri infigendas, quae in opere noftro exhibentur, communicavit nobiscum generofiffimus fimul, & peritiffimus Botanicus *Joh. Freder. Gronovius*, nec non Botanicorum Maecenas *D. Georgius Cliffortius*, qui plurimas exoticas, & eas quidem rariffimas in praedio fuo fane regio fumma induftria excolit plantas, quarum fyllogen, ac defcriptionem jam fere abfolvit doctiffimus ille Suecus, *Carolus Linnaeus*, operibus fuis variis Botanicis nuper editis clarum nomen adeptus.

Ita ut hic in unum corpus, ni fallor, plurima, quae de plantis Zeylonenfibus fcimus & habemus, inveniatis collecta, digefta, & quantum tempus mihi praxi Clinica quotidie ita occupato & diftracto, ut aliis exercitationibus, ac meditationibus horas fubcefivas inpendere vix concedatur, permittit, quantumque pro rerum mearum ratione, & modulo meo id fieri potuerit, illuftrata, &, ut puto, fatis accurate defcripta.

Hunc autem laborem fi alicujus utilitatis fuiffe quibusdam harum elegantiarum peritis cognovero, erit, quod me incitabit, ut curam & meditationem deinceps conferam ad fimile opus plantarum Africanarum elaborandum, quarum mihi magna & rariffima ad manus eft copia, praefertim cum rei huic optima fefe offerat etiam occafio; praeterquam enim quod centenas aliquot Africanarum in herbario meo, quod jam quinquaginta continet volumina, fervem plantas, non fine magno fumptu, multoque labore ex variis terrarum plagis, & aliorum herbariis mihi comparatas, non ita pridem quoque in publica auctione *D. Wilhel. Adr. van der Stell*, Gubernatoris quondam ad Caput Bonae Spei, mihi vindicavi

cavi rariſſimas illas plantas eo in loco naturalibus coloribus, & magnitudine tam nitide, tam eleganter ad vivum depictas, ut nihil niſi vita iis deſit; quarum licet magna copia a *Pluknetio*, aliisque jam fuerit aere expreſſa, plurimas tamen, & eas quidem rariſſimas, quas apud nullum ad hunc usque diem offendi, in illa collectione inveni optime depictas & conſervatas, in qua praeſertim etiam excellunt Lepidocarpodendra, Conocarpodendra, & Hypophyllocarpodendra juſtae magnitudinis coloribus vivis elegantiſſime depicta, quae adeo accurate & fideliter expreſſa inveniuntur in doctiſſimo illo *Indice Horti Lugd. Batavi*, cujus auctor eſt celeberrimus ille *Hermannus Boerhavius*, aevi noſtri ſumma gloria & prodigium, ita ut nihil de hiſce Lepidocarpodendris &c. amplius, niſi vivus color, deſideretur; unde & operi Weinmanniano inſerenda illa conceſſi: & licet ſcriptor quidam in Centuriis ſuis indigne ſaepius tantum Apollinem traducat, nos ejus generoſum animum, & ingenuam illarum plantarum communicationem inſtar Corollarii ad utiliſſimum illum Indicem, ut qui optimos plantarum continet characteres, admiramur & ſuſpicimus. Ad opus porro plantarum Africanarum augendum mihi etiam prolixa admodum humanitate ſeſe obtulit Nobiliſſimus & ſimul doctiſſimus *Nicol. Witſenius* urbis noſtrae Judex, qui ingentem plantarum Africanarum tam exſiccatarum, quam ad vivum depictarum ſervat numerum, quas olim Ampliſſimus & Nobiliſſimus vir Conſularis *Nicolaus Witſen* magna pecuniae vi, & inprobo labore ſibi ex Africa, aliisque locis comparavit, qui codex a Clariſſ. *Hermanno Boerhavio* non ſine ratione tam magnifice praedicatur, & in Indice ſuo ſaepe etiam ad partes vocatur. Ut interim inſtar Prodromi ſubſequentis operis Botanicae rei periti, ac ſtudioſi aliquid habeant, ſubjunxi hic duas plantarum Africanarum catalogos, quorum prior eſt plantarum, quas celeberr. *Paulus Hermannus* ad Caput Bonae Spei obſervavit, quem mecum ingenue ad-

 modum

modum communicavit *Joh. Freder. Gronovius*, quique etiam jam ſaepius a *Boerhavio* laudatus eſt. Alter autem eſt plantarum ab *Hertog* & *Oldenlando* in Capite Bonae Spei diligenter indagatarum, qui in deſcriptione Promontorii Bonae Spei a *Petro Colbe* belgice exarata invenitur, & minus apte ibi locatur, cujus licet aliquae a *Tournefortio* jam fuerint memoratae, multae tamen ab eo omiſſae in hoc catalogo inveniuntur plantae ; ex quibus duobus catalogis Lectores videre poterunt, quantus adhuc plantarum numerus in illis inveniatur terris, quae minus nobis cognitae, & quarum plurimae penitus ignotae, & nondum deſcriptae occurrunt.

Quum autem duo illi auctores, *Hermannus* nempe & *Hertog*, praecipui harum fuerint obſervatores, haud injucundum fore duxi, ſi hic ſubjungantur illi catalogi, quum plantarum Zeylanenſium iidem illi viri primi & praecipui fuerint indagatores.

Praeter haſce plantas, quae ibi denominatae inveniuntur, & alias plures ſervo, quae plane novae, & ab aliis nondum obſervatae fuerunt; ita ut, ſi Deus mihi vitam viresque conceſſerit, opus etiam illud, ſi elaboratum fuerit, alicujus utilitatis fore mihi audeam promittere. Antequam autem illud aggrediar, animus eſt publicae luci exponere tamdiu etiam nunc deſideratum, & omnibus numeris abſolutum opus Botanicum, Herbarium nempe Amboinicum *Georgii Everhardi Rumphii*, quod ultra millia fere plantarum Indicarum continet, ſexque ingentia volumina in folio complectitur; Plantae hae ab auctore illo tam accurate, tam ample, & nitide cum earum virtutibus, uſu & cultura ſunt deſcriptae, ut certe palmam *Horto Malabarico*, quantumvis & illud eximium, & regium ſane ſit opus, praeripiat ; plurimarum inſuper deſcriptionibus Figurae elegantiſſimae, & ad vivum in locis natalibus per *Rumphii* indefeſſam curam, & prodigioſos ſumptus depictae additae ſunt, quae maximas, & incredibiles licet requirant inpenſas, ac labores ad tale opus nitide inprimendum, inpedimento

mento

mento tamen non erunt, quo minus in gratiam Botanophilorum tantum inchoetur, ac elaboretur opus, quod Belgico licet idiomate confcriptum, ne & exteris ejus invideatur ufus, Latina nihilominus civitate etiam donari curabimus: Liber hic fuperiore jam faeculo ab auctore illo fuit confcriptus, qui totam fere vitae partem, dum in illis degebat terris, ad fummam usque fenectutem, & licet poftea oculorum ufum amitteret, in plantis illis obfervandis, examinandis, defcribendis, ac depingendis inpendit, ac confumfit, quo opere *Hortus Malabaricus* plurimis in locis haud parum illuftrabitur, ut ex *Thefauro hoc Zeylanico*, in quo toties laudatus, & cum *Herbario Rumphiano*, quem obiter tantum percurrere licuit, ad partes vocatus eft, facile conftat, ita ut non tantum praeftantia fua *Malabaricum Hortum* adaequet, fed & eo infuper elaboratior plurimis in locis habendus fit: ceterum operi huic fubnectam obfervationes, illuftrationesque meas cum aliorum auctorum fynonymis, ac defcriptionibus.

Per generofam autem, & non fatis laudabilem Rectorum & Praefectorum Societatis Indiae Orientalis munificentiam conceffa mihi eft iftius libri inpreffio, & editio, quum per femifeculare fere fpatium in domo focietatis Indiae Orientalis tam fplendidus, & adeo cuique exoptatus thefaurus delituiffet, jam communi bono ab Illuftriffimis & Nobiliffimis illis viris in publicum prodire, & cuique infervire dabitur. Quibus folis hoc donum acceptum referre, & eo fibi gratulari univerfa debet Botanicorum cohors, & cuncti hujus delectabilis ftudii amatores tranquilli. Interim hifce meis laboribus fruimini, & fi, quod humanum eft, vitia quaedam in opere hoc noftro fuerint commiffa, quod & fummis in hac arte contigit, aequo animo L. B. aberranti ignofcite, & conatibus noftris favete.

Dabam Amftelaedami ex Mufaeo,
ultimo Novembris, Anni
MDCCXXXVI.

COMPENDIA
LAUDATORUM AUCTORUM
EXPLICATA.

Acoſt. edit. Ital. Trattato di Chriſtof. Acoſtae della hiſtoria, natura & virtu delle droghe Medicin: *Venet.* in 4to.
Acoſt. hiſt. arom. Chriſtof. Acoſtae Hiſtoria aromatum a Cluſio interpret. in 8vo.
Acoſt. apud Cluſ. Chriſtof. Acoſtae Hiſtoria aromatum apud Cluſium in exoticis in folio.
Act. Phil. Lond. Acta Philoſophica Londinenſia in 4to. auctoribus *Petiver. Garcin.* &c.
Act. Reg. Paris. Acta Regia Pariſina. in 8vo. auctoribus *Vaillant.* & aliis.
Alp. de pl. Ægypt. De Plantis Ægypti Prosper Alpinus in 4to.
Ambroſ. Phyt. Hyacinthi Ambroſini Phytologia in folio.
Amm. Char. pl. Ammanni Character Plantarum. in 12o.
Amm. H. Boſian. Hortus Boſianus conſcriptus a Paulo Ammanno. in 4to.
Baldei Philip. Hiſtor. Ceylon. Philippus Baldeus beſchryving van Ceylon. in folio.
Baniſt. Cat. Stirp. Virgin. Joannis Baniſteri Catalogus plantarum in Virginia obſervatarum. apud *Ray. tom.* 3. in folio.
Bobart. Hiſt. Oxon. Jacobi Bobarti Hiſtoria Oxonienſis; eſt tomus tertius Moriſonis poſt mortem ab eo editus in folio.
Boccon. Muſ. Muſeo di Phiſica, di Piante &c. di Paulo Boccone. in 4to.
Boerh. Ind. H. L. B. Hermanni Boerhave Index alter Horti Lugduno Batavi. 2 tomi in 4to.
Boerh. Ind. in Oct. Ejusdem index primus in 8vo.
Bont. Hiſt. nat. Jacobi Bontii hiſtoria naturalis & Medic. Indiae Orient. in folio.
Bont. Mantiſſ. Arom. Bontii Mantiſſa Aromatica. ibidem.
Breyn. Cent. Jacobi Breynii Centuria prima exoticarum in folio.
Breyn. Prodr. 1 & 2. Jacobi Breynii Prodromus primus & ſecundus in 4to.
Breyn. Filii diſſert. Joannis Philip. Breynii diſſertatio de Acmella. in 4to.
C. B. Pin. Caspari Bauhini Pinax Theatri Botanici in 4to.
C. B. Prodr. Ejusdem Prodromus Theat. Botanici in 4to.
Cluſ. exot. Caroli Cluſii libri X. de exoticis in folio.
Cluſ. Cur. poſt. Cluſii Curae poſteriores in 4to. & folio.
Cluſ. rar. pl. hiſt. Cluſii hiſtoria rariorum plantarum in folio.
Cluſ. in Monard. Nicol. Monard. Hiſtoria ſimplicium, Cluſio interprete in 8vo.
Colum. obſerv. Fabii Columnae obſervationes poſt Ecphraſin inpreſſae in 4to.
Commel. Cat. Hort. Med. Amſt. Joan. Commel. catalogus Horti Medici Amſtelaed. in 8vo.
Commel. in not. Joannis Commelini in notis ad Hortum Malabaricum.
Commel. prael. Botan. Casp. Commelini Praeludia Botanica. in 4to.
Commel. Fl. Malab. Caspari Commelini Flora Malabarica in folio.
Dale Pharmac. Samuel Dale Pharmacologia in 8vo.
Dale. Supplem. Ejusdem ſupplementum ibidem.
Dalechamp. Hiſtoria generalis Plantarum a Dalechampio elaborata in folio.
Dillen. H. Elth. Johannis Jacobi Dillenii Hortus Elthamenſis tomi 2. in folio.
Dillen. nov. pl. gen. Joh. Jacob. Dillenii nova plantarum genera, poſt Catalogum plantarum circa Giſſam naſcentium inpreſſa in 8vo.

Dioſco-

Dioscorid. Dioscoridis opera in folio.
Dodart. Mem. Memoires pour dreſſer l'Hiſtoire des Plantes in 8vo.
Dod. Pempt. Romberti Dodonaei Pemptades in folio.
Ephemer. German. Ephemerides Germanicae Naturae Curioſorum auctoribus *Breynio*, *Rumphio* & aliis in 4to.
Ferrar. Fl. Cult. Joannis Baptiſtae Ferrarii florum cultura. in 4to.
Flacourt. Hiſt. Madag. Flacourt Hiſtoria inſulae Madagaſcar.
Freyer. itin. per Ind. Orient. Joannis Freyers reyſe door Ooſtindien &c. in 4to.
Garcin act. Phil. Lond. Garcin in Actis Philoſophicis Londinenſibus in 4to.
Garz. lib. arom. Garzias ab Horto Hiſtoria aromatum per Cluſium in 8vo.
Grimm. Labor. Ceyl. Nicolai Grimmii Inſulae Zeyloniae Theſaurus Medicus, vel Laboratorium Ceylonicum a Barthol. Pielat latinitate donatum in 12o.
Hart. Catal. ſemin. Eſt Catalogus plantarum & ſeminum ab Hartog ex Zeylana quondam ad Hortum Amſtelaedamenſem miſſus.
Heiſt. Cat. pl. H. Acad. Jul. Laurentii Heiſteri catalogus plantarum, quibus Hortum Academicum Julianum auxit annis 1731, 1732 & 1733. in 8vo.
Hernand. Hiſt. Mexic. Franciſci Hernandes Hiſtoria Plantarum Mexicanarum in folio.
H. A. tom. 1 & 2. Horti Medici Amſtelaedamenſis rariorum plantarum hiſtoria, cujus Tomus primus a Joan Commelino, Tomus alter a Caſp. Commelino eſt editus in fol.
H. Beaum. Horti Beaumontani Catalogus plantarum exoticarum in 8vo.
H. Boſian. Horti Boſiani Catalogus per Amman. in 4to.
H. Eyſt. Hortum Eyſtettenſem denotat a Beſlero in magno folio editum.
H. L. Bat. Hortus Lugduno-Batavus a Paulo Hermanno editus in 8vo.
H. L. App. Ejusdem horti appendix.
H. Malab. Hortus Malabaricus eſt conſtans duodecim voluminibus in folio.
H. Piſan. Hortus Piſanus eſt auctore Michaele Anglo Tillio in folio.
H. Mauroc. Hortus Maurocenus eſt, cujus catalogum dedit Antonius Tita in 8vo.
H. R. Par. Eſt Hortus Regius Pariſinus in folio.
Herb. Ambon. Herbarium Ambonicum MStum, ab Everhardo Rumphio Belgice conſcriptum, ſex voluminibus in folio conſtans.
Herbar. Garcin. D. Garcin ex Herbario ſuo plures mecum communicavit plantas exoticas.
Herbar. Gronov. Johan. Fredericus Gronovius Zeylanenſ. plantas ex herb. ſuo conceſſit.
Herb. Hart. & *Hert.* Hartog ſeu Hertog herbarium eſt, quod ſervo, quodque ex plurimis elegantiſſimis plantis Zeylanenſibus conſtat, quondam ab eo ex Zeylana ad Cornelium Voſſium hortulanum miſſum.
Herb. Herm. Eſt idem Herbarium, quod Clariſſ. Paulus Hermannus olim ex Zeylana ad Nobiliſſ. Joannem Commelinum miſerat, ex quo praeſertim rariſſimas, & nunquam antea viſas plantas publici jam juris fecimus.
Herm. Fl. Lugd. Bat. Pauli Hermanni Flora Lugduno Batava. in 8vo.
J. B. Joannis Bauhini Hiſtoria plantarum univerſalis, 3 conſtans voluminibus in fol.
Jonſt. Dendr. Joannis Jonſtoni Dendrologia in folio.
Kaemph. Amoenit. exot. Engelberti Kaempheri Amoenitates exoticae in 4to.
Knox Hiſt. Ceyl. Rombert Knox Beſchryving van Ceylon in 4to.
Linnaeus char. pl. gen. Caroli Linnaei characteres plantarum generici in 8vo. qui liber jam jam inpreſſus erit, unde & omnibus locis, ubi debuerat, laudari vix potuit, aureus ſane caeteroquin Botanicis habendus, ut qui nova & facili methodo naturales plantarum characteres accuratiſſime definit.
Linn. tract. de Muſ. Cliffort. Car. Linnaei Muſa Cliffortiana florens Hartecampi in 4to.

Lin-

Linſchot. Ind. Orient. Johannes Hugo Linſchotens Reyſe door Ooſtindien in folio.
Marcgr. Georgii Marcgravii Hiſtoria rerum natural. Braſiliae in folio.
Merian. inſect. Surin. Mariae Sibyllae Merian Hiſtoria inſectorum Surinam. in folio ingenti, quod opus elegantiſſimas complectitur quarundam plantarum figuras.
Moriſ. Hiſt. pl. Roberti Moriſon Hiſtoria plantarum univerſalis. 3 vol. in fol.
Munt. Phytogr. Abrahami Muntingii Phytographia curioſa in folio.
Muſ. Zeyl. Pauli Hermanni Muſaeum Zeylanicum in 8vo.
Par. Bat. Pauli Hermanni Paradiſus Batavus in 4to.
Par. Bat. App. Ejusdem libri appendix ibidem.
Par. Bat. Pr. Paradiſi Batavi Prodromus in 12o.
Parkins Theat. Johannis Parkinſoni Theatrum Botanicum Anglice cum fig. in fol.
Petiv. Muſ. Jacobi Petiver Muſaeum, ſeu Centuriae in 8vo.
Petiv. Gazoph. nat. & art. Jacobi Petiver Gazophylacium naturae & artis in folio.
Petiv. Hort. ſicc. Petiver Hortus ſiccus apud Ray in tom. 3. appendice in fol.
Petiv. Act. Phil. Lond. Petiver in Actis Philoſophicis Angliae in 4to.
Piſon. Hiſt. Gulielmi Piſonis Hiſtoria naturalis Braſiliae. in fol.
Piſon. Mantiſſ. Aromat. Ejusdem Mantiſſa aromatica ibidem.
Plukn. Almag. Leonardi Pluknetii Almageſtum Botanicum in 4to.
Plukn. Amalth. Ejusdem Amaltheum Botanicum in 4to.
Plukn. Mantiſſ. Ejusdem Mantiſſa Almageſti Botanici in 4to.
Plukn. Phyt. Ejusdem Phytographia. Figurae.
Plum. pl. Amer. Caroli Plumier Deſcriptio Plantarum American. in folio.
Plum. nov. pl. gen. Caroli Plumier nova plantarum Americanarum genera in 4to.
Plum. Cat. pl. Amer. Caroli Plumier Catalogus plantarum American. ibidem.
Ray. hiſt. pl. Joannis Raji Hiſtoria plantarum tomi tres in folio. cujus tertius cum Dendrologia, & aliis adjectis poſt ejus mortem ab aliis eſt editus.
Ray. meth. pl. auct. & emend. Joan Raji Methodus plantarum aucta & emendata in 8vo.
Rivin. ord. pl. irreg. Fl. Monop. Quirini Rivini ordo plantarum floribus irregularibus monopetalis &c. in fol. cum elegantisſimis figuris.
Rumph. Herb. Ambon. Everhardi Rumphii Herbarium Ambonicum, conſtans ſex magnis voluminibus in fol. MStum. Quod opus ſane regium eſt; & propediem a nobis edendum, de quo vide Praefationem hic praefixam.
Scheuchz. Agraſt. Scheuchzeri Agraſtographia, ſive graminum hiſtoria in 4to.
Sch. Botan. Schola Botanica Pariſina. in 8vo.
Sebae rer. nat. theſ. part. 1. Alberti Sebae rerum naturalium theſaurus. Pars prima in fol.
Seyen in not. Arnoldus Syen in notis ad Hortum Malabaricum.
Sloan. Cat. pl. Jam. Hans Sloane Catalogus Plantarum Inſulae Jamaicae in 8vo.
Sloan. Hiſt. Jam. Hans Sloane Hiſtoria Jamaica Anglice duobus volum. in fol. cum elegantiſſimis & ſplendiſſimis figuris.
Sutherl. H. Edinb. Jacobi Sutherland Hortus Medicus Edinburgenſis in 8vo.
Theophr. Ereſii Theophraſti opera in folio.
Tournef. inſt. Joſephi Pitton Tournefortii inſtitutiones rei Herbariae in 4to. 3 vol.
Vaill. act. Reg. Paris. Sebaſtiaan Vaillant in actis Regiis Pariſinis in 8vo.
Vaill. ſtruct. Fl. Sebaſtiaan Vaillant de florum ſtructura in 4to.
Veſl. in Alpin. Johannis Veſlingii obſervationes in Alpinum de plantis Ægypt. in 4to.
Weinm. Phytant. Weinmanni Phytanthozoiconographia in folio: vivis coloribus plantas inpreſſas complectitur hoc Opus novum, quod quatuor conſtabit tomis.
Zanon. Hiſtoria Botanica di Giacomo Zanoni. Italice in folio.
Zeyl. Zeylonenſes.

T H E-

THESAURUS ZEYLANICUS.

ABUTILON Avicennae *H. Eyst. Æst. Ord. 6. Fol.* 10. *Fig.* 1. ubi elegans figura & varii citantur auctores videndi. Alcea Indica *Abutilon* dicta major, pericarpio membranaceo, orbiculari, compresso, vertice corniculis extus coronato, intus in decem aut duodecim loculamenta diviso. *Plukn: Almag.* pag. 17. Abutilon Indicum flore luteo, *Breyn. Prodr.* 1. pag. 1. Althaea Theophr. flore luteo. CB. ANODA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag.* 52. ubi additur in arboris altitudinem saepius extollitur trunco crasso, satis lignoso, levi. nota ejus characteristica invenitur apud *Amman* in *Charact. plant. pag.* 243. & usus medicus apud *Samuel Dale. Pharmacol. supplem. pag.* 145.

Abutilon Indicum, flore luteo, minore. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 1. Althaea *Abutilon* dicta, Indica, flore luteo minore. H. L. B. *Par. Bat. Pr. pag.* 309. Althaea Theophrasti flore luteo minore. H. L. B. *pag.* 24. *Mus. Zeyl. pag.* 52. Alcea populi folio, villoso, leviter serrato. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 98. Alceae adfinis, Indica, *Abutilon* dicta, flore flavo, foliis mollibus profunde venosis, siliculis lanuginosis. *Plukn. Phyt. Tab.* 126. Fig. 5. vide & *Almag. pag.* 17. ANODA haec etiam Zeylonice dicitur, quod nomen genericum

Abutili videtur, plures enim ejusdem familiae plantae uno ſaepius apud Zeylonenſes indigitantur vocabulo, quod nomen genericum eſt, ut in ſequentibus pluries occurret, uti videre eſt in Filicum, Hedyſari, Aſtragali, Sinapiſtri, aliisque plantarum generibus.

ABUTILON Indicum foliis profunde crenatis. *Nobis*. Althaea Theophraſti foliis profunde crenatis *Muſ. Zeyl.* pag. 52. Althaea *Abutilon* dicta, folio lobato. *Par. Bat. Pr. pag.* 309. Alcea *Abutilon* dicta, foliis lobatis minima Indiae Orientalis. *Plukn. Almag. pag.* 17.

ABUTILON Periplocae anguſtioris folio, fructu ſtellato. *Dillen. H. Elth. pag.* 4. *Tab.* 3. Althaea Zeylanica, folio ſagittato, flore albo, capſula criſtata. *Commelini ibidem* Althaea Scammonii folio, floſculis albis, Zeylanica. *Par. Bat. Pr. pag.* 309. *Muſ. Zeyl. pag.* 68. hujus icon etiam exhibetur, ſed floribus viduus apud *Plukn.* in *Phyt. Tab.* 74. *Fig.* 7. & in *Almag. pag.* 17. vocatur Alcea Orientalis Scammoniae folio major, floribus albis. WISSADULI & NILAVONANGHU Zeylonice dicitur.

ACACIA aculeata, multiflora, foliis pennas avium referentibus. *Nobis Tab.* 1. Acacia Zeylanica elegans Mimoſae folio, flore albo. *Herb. Hart.* Acacia Zeylanica, floribus rotundis, albis, pappoſis, in ſummitate ramulorum racematim diſpoſitis. *Muſ. Zeyl pag.* 29. ubi HINGHURUWAEL, & TSIAWAEL Zeylonice audit.
Adſurgit elegans hic & ſpecioſus frutex caule firmo, lignoſo, leviter ſulcato & anguloſo, ſpinis undique obſeſſo, fuſcis, inſtar hami recurvis, in apice nigricantibus, parvis quidem, ſed robuſtis, nec facile fragilibus, quae infiguntur cortici fuſco, ſcabro, quo obducitur lignum albicans, medulla fuſca repletum; ramos undique ſpargens, ad quorum exortum folia emergunt pinnata, longo & firmo, ſpinoſoque rachi innixa, tenuiſſima, mollia, ad contactum ſe inſtar Mimoſae contrahentia, plumoſa, ſeu pennas avium referentia; pinnae hae ſunt communes, aequales, oppoſitae foliolis linealibus fere contiguis, vel potius imbricatis numero infinito conſtantes; Flores in ſummitate ramorum gerit racemoſos, qui clauſi racemum uvarum nondum expanſum rotundum referunt, aperti vero ſtellam radios emittentem repraeſentant per pappum, qui ſtamina ſunt numeroſiſſima, in apice florum undique diſperſum; ſinguli autem floſculi ſuo inſtructi calice, ſuo



ACACIA aculeata, multiflora, foliis pennas avium referentibus. Nobis.





ACACIA *spinosa ex alis spicata, foliis pennas avium referentibus. Nobis.*

fuo nituntur pedunculo, qui in medio ad centrum idem concurrunt, & inftar radiorum emifforum aequales fibi invicem circulum quafi formant, de filiqua mihi non conftat, quum ea deftituar.

Acacia Zeylanica, flofculis globofis luteis, foliis pinnatis, tenuiffime incifis fpinis minoribus. *Muf. Zeyl. pag.* 30. ubi additur, folia funt fere capillacea. Forte Acacia fpinofa foliolis perexiguis & veluti crispatis, Maderaspatana. *Pl. Phyt. Tab.* 73. *Fig.* 3.

Acacia Zeylanica farmentofa, flore luteo globofo. *Muf. Zeyl. pag.* 34. fimilis huic fpecies flofculis candidis occurrit in *H. Malab. part.* 6. *Tab.* 4. quae *Insja* ibi vocatur, & in notis Acacia Mala barica, flore globofo, filiquis latis.

Acacia fpinofa ex alis fpicata, foliis pennas avium referentibus. *Nobis. Tab.* 2. Acacia Zeylanica, flofculis fpicatis, plumofis, inferiore fpicae parte rubellis, fuperiore vero luteis, filiqua articulata contorta. *Herb. Hart.* Acacia Zeylanica flore fpicato, pappofo, colore ex albo, luteo & rubicundo eleganter variegato. *Muf. Zeyl. pag.* 24. ubi ANDARA & KUKULUGHAS Zeylonice vocatur.
Ex cortice albo ad exortum pedunculi foliorum exfurgunt fpinae folitariae, ad bafin latae, in mucronem tenuiffimum, acutiffimum recte abeuntes, albicantes itidem, ad quarum medium aliquando etiam erigitur pedunculus foliorum, qui rachin dat ab utraque parte gerentem foliola pinnata fibi invicem oppofita, ad tactum fefe non contrahentia, glabra, viridia, obtufa. Flores vero inter foliorum pedunculum & fpinam ortum habent, fpicati inftar *Tamarifci Narbonenfium*, plumofi, varii coloris, in inferiore enim parte rubelli, fuperiore vero lutei, & intermixti albi elegantem dant varietatem & adfpectum. Flofculis hifce plumofis deciduis filiqua fubfequitur articulata contorta, ut indicat hujus plantae denominatio ab *Hertogh* in loco natali ad vivum inpofita.

Acacia major, tinctoria, Zeylanica, *Panfapan* dicta. *Muf. Zeyl. pag.* 42. Erythroxylum, feu lignum rubrum Indicum, fpinofiffimum, Coluteae foliis, floribus luteis, filiquis maximis. *Par. Bat. Pr. pag.* 332. *Amm. Char. plant. pag.* 552. Acacia gloriofa Zeylanica, tinctoria, amplioribus foliis fpinofa. *Plukn. Almag. pag.* 5. Tsjampangam. *H. Malab.*

Malab. part. 6. *Tab.* 2. Criſta Pavonis Coronillae foliis ſecunda, ſive Tinctoria Indica, flore luteo, racemoſo minore, ſiliqua latiſſima glabra, lignum rubrum, *Sappan* dictum ferens. *Breyn Prodr.* 2. *pag.* 37. Lignum *Sappan.* Caju Sappan *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 6. *cap.* 26. de hujus ligno vide *Ray tom.* 3. *in dendrol. pag.* 109. & *Samuel Dale, Pharmac. pag.* 469. ad *lignum ſapan* officin. PATAGHI & PATANGHI Zeylanice audit. alteram hujus ſpeciem non ſpinoſam invenies in *H. Amſtel. part.* 1. *Tab.* 103. ad Senas accedit, quas Criſtas Pavonis Breynius vocavit.

Acacia Zeylanica minor, tinctoria, floſculis luteis, racematim diſpoſitis, ſiliquis auriculatis, ventricoſis, nigris, oſſiculis globoſis duriſſimis. *Muſ. Zeyl. pag.* 53. KALUWATHU WA Zeylanenſibus.

Acacia, qui lobus echinatus Cluſii, oculus Cati Luſitanis. *Muſ. Zeyl. pag.* 57. Arbor exotica ſpinoſa, foliis Lentiſci C. B. Bonduch Indorum Ponae *Muſ. Zeyl. pag.* 35. Acacia glorioſa Lentiſci folio ſpinoſa, flore luteo ſpicato, ſiliqua magna muricata. *Plukn. Phyt. Tab.* 2. *Fig.* 2. & in ejus *Almageſt. pag.* 4. plurima vide ſynonyma, ut & apud *Sloan. Catal. pl. Jamaic. pag.* 144. & *Hiſt. Jam. vol.* 2. *pag.* 41. vide & Samuel *Dale. Pharmac. Supplem. pag.* 308. ad Bonduch offic. Caretti haec in *H. Malab part.* 2. *Tab.* 22. vocatur, ubi conſule notas, & *Amm. Char. pl. pag.* 317 & 318. quae eſt Criſta Pavonis Glycyrrhizae folio minor, repens, ſpinoſiſſima, flore luteo ſpicato minimo, ſiliqua latiſſima echinata, ſemine rotundo cinereo, lineis circularibus cincto, majore. *Breyn Prodr.* 2. *pag.* 38. Lobus echinatus fructu caeſio, foliis longioribus. *Par. Bat. Pr. pag.* 348. KUBURUWAEL Zeylanenſibus. Globuli majores *Gondo* dicti, *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 7. *cap.* 50.

Acacia, qui lobus echinatus Cluſii fructu albo. *Muſ. Zeyl. pag.* 12. ubi dicitur, fructus ex lobis ſuis eruti, Elephantorum fiunt pabulum. ad Senas hae proxime accedunt, ſed ſtaminibus brevioribus differunt.

Acacia glorioſa Coluteae folio Chinenſis, rachi medio tam ad genicula, quam ad internodia ſpinis curtis duplicatis, deorſum inflexis munito, an WAWOULAETHYA Cinghalenſibus dicta. *Plukn. Almag. pag.* 5. vide & ejus *Mantiſſam pag.* 1. *planta penult.* ut & *Ray tom.* 3. *pag.* 418. Arbor Indica ſpinoſa, cujus fructus veſpertilionum inſtar a ramis

ramis dependent. *Muf. Zeyl. pag.* 41. Crifta Pavonis monofpermos fecunda, five arbor vespertilionis Indica, Lentifci folio, fpinofiffima, flore racemofo luteo, parvo, odorato, filiqua & femine glabro. *Breyn Prodr.* 2. *pag.* 39. Arbor filiquofa Indica fpinofa, flore papilionaceo, decapetalo, filiquis latis monofpermos. *Ray hift. pl. pag.* 1745. Cacu-Mullu. *H. Malab. part.* 6. *Tab.* 19. vide & notas ad *H. Malab. part.* 1. *pag.* 70. Waga Madrasp, fpinofa Mimofae foliis, floribus parvis fpicatis. *Muf. Petiv. no.* 700. & *Act. Philof. Lond. vol.* 22. *no.* 271. *pl.* 115. WAWULAETHYA Zeylanenfibus dicitur a *Wawoula*, id eft vespertilione, quod arboris hujus fpinae fimiles funt unguiculis Vespertilionum, quibus fe arborum ramis affigere folent. arbor caeterum eft farmentofa, fpinofa, ad fepes ftruendas idonea, ut notatur *in Muf. Zeyl. pag.* 41. ad Senas accedit haec, neutiquam ad Acacias.

Acacia Zeylanica minus fpinofa. pinnularum coftis & caule rufefcente hirfutie villofa. *Plukn. Phyt. Tab.* 122. *Fig.* 3. & *Almag. pag.* 4. ut & *Ray tom.* 3. *pag.* 477.

Acacia Malabarica filiquis ac feminibus compreffis, femilunatis. *Muf. Zeyl. pag.* 58. an Acacia foliis amplioribus filiquis compreffis, flore coccineo? *Plum. Cat. Pl. Amer. pag.* 17.

Acacia Malabarica, flofculis fpicatis, filiquis compreffis, latiffimis. *Muf. Zeyl. pag.* 59. Acacia non fpinofa, filiquis latis compreffis, flore albo. *Plum. Cat. pl. Amer. pag.* 17. an Wagha. *H. Malab. part.* 6. *Tab.* 5? quae eft Waga Madrasp. Senae foliis, filiqua lata compreffa, ubi feminibus inflata. *Petiv. Muf. no.* 697.

Acacia Zeylanica floribus luteis, racematim ad foliorum (exortum) extremitates difpofitis. *Muf. Zeyl. pag.* 68. huc fpectat Nilacamaram *H. Malab. part.* 1. *Tab.* 38. ubi vide *notas fubjectas.* qui eft Mirobalanus Embilicus, Boa Malacca Nilikay. *Rumph. Herb. Ambon. auctuar. cap.* 2. KATHUKARAMBA Zeylonenfibus, hoc eft Acetofa fpinofa, a *Karamba* quod acidum feu acetofum dicitur; folia enim acidum grate fapiunt & *Kathu* fpina eft.

Acacia Zeylanica nova. *Breyn. Prodr.* 1. *pag.* 1.

Acacia Zeylanica Tamarindi foliis, flore albo umbellato. *Hertog.* in *Catal.* feminum ab ipfo quondam ex Zeylona transmifforum reperitur. Acacia aculeata flore albo, foliis Tamarindi. *Plum. Cat. pl. Amer. pag.* 17.

Acacia Zeylanica, fpinis maximis albis, flore globofo. *Hertog. ibidem.* Acacia forte Maderasp. foliolis parvis, aculeis è regione binis praegrandibus horrida, cortice cinereo. *Plukn. Phyt. Tab.* 121. *Fig.* 4. Notatu dignum cenfeo, quod in examine harum plantarum invenerim, quod plurimae plantae Maderaspatanae, quae apud Pluknetium occurrunt, cum noftris plantis Zeylonenfibus maxime quadrent & conveniant, ut ex plurimis illarum fynonymis in fequentibus magis elucefcet.

ACORUS Afiaticus radice tenuiore. *H. L. B. pag.* 9. ubi ejus defcriptio. Calamus aromaticus *Garziae ab Horto. lib. Aromat.* 1. *Cap.* 32. & *Edit. Ital. in quarto pag.* 289. ubi Figura. *Muf. Zeyl. pag.* 56. Acorus Afiaticus radice tenuiore. HERMANNI *Moris Hift. Oxon. Tom.* 3. *pag.* 246. ubi brevis ejus defcriptio, & ad *Typhas* reducitur. Calamus aromaticus Orientalis folio & radice tenuiore. *Act. Philof. Lond. no.* 274. *pag.* 943. Acorus verus Afiaticus radice tenuiore, vel Calamus aromaticus Garciae. *Plukn. Almag. Botan. pag.* 8. Deryngo *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 8. *cap.* 23. Characterem invenies apud *Linnaeum in Char. gen pl. pag.* 104. Vaembu *H. Malab. part.* 11. *Tab.* 40. Calamus aromaticus. *Grimm. Laborat. Ceyl. pag.* 123. ubi haec habet. apud nos pariter inplantatur: Firmior atque perennior radix eft, quam ea, quae aliunde nobis transmitti folet; ufus ipfius fat eft notus. VAZABU & VAZUMBO Zeylonenfibus.

ADHATODA Zeylonenfium *H. L. App. pag.* 642. ubi Figura & *Plukn. Phyt. Tab.* 173. *Fig.* 3. Arbor Indica, cujus cortex foetum extrahit. *Muf. Zeyl. pag.* 23. Dictamno forte adfinis, Indica, arborefcens, Lauri Americanae foliis, feu Ecbolium Zeylanicum, foliis Laurinis. *Breyn Prodr.* 2. *pag.* 41. ubi vide defcriptionem & apud *Ray tom.* 3. *pag.* 650. Ecbolium *Rivini ord. plant. fl. irregul. monopet.* ubi elegans Figura. hujus character defcribitur ab *Amm. in Char. plant. pag.* 247. & *Linnaeo* in *char. gener. plant. pag.* 4. ad *Jufticiam Houft.* Malab. dicitur WANAEPALA. ADHATODA. SINGHADHAE, & SINGHIKA. *Muf. Zeyl. pag.* 23.

ADHA-



ADHATODA *spicata, flosculos ex foliolis membranaceis producens. Nobis.*

ADHATODA, *flore solitario ex singula folii ala proveniente. Nobis.*



AMARANTUS *humilis, foliis oppositis. &c.*

ADHATODA *spica longissima, flore reflexo. Nobis.*

ADHATODA, flore folitario ex fingula folii ala proveniente. *Nobis. Tab.* 3. *Fig.* 1. Adhatoda Zeylanica, folio Salicis, flore albo parvo. *Herbar. Hartog.* Adhatoda Zeylanica folio rigido oblongo. *Hart. Catal. femin. transmiſſorum.* Differt ab Adhatoda Indica folio faligno, flore albo. *Boerhavii in Indice H. L. B.* foliis majoribus, latioribusque, floribus triplo fere minoribus: qui flores inter alas foliorum eriguntur gemini, ex fingula fcilicet unicus, funt autem albicantes, calice oblongo dis-fecto contenti, monopetali, perfonati, labio fuperiore adunco, reflexo, barba vero pendula trifida, ftamina bina recondentes. Folia vero brevi pediculo emergunt bina fibi invicem oppofita, glabra, tenuia, acuta, in fuperiore parte viridia, in inferiore pallida, fenfim minora, in fummo minima. Fructus eft filicula oblonga, bivalvis, bilocularis, in fingulo loculo duo condens femina, rotunda, fpadicea; uti in Tabula noftra ejus icon exhibet.

ADHATODA fpicata, flofculos ex foliolis membranaceis producens. *Nobis. Tab.* 3. *Fig.* 2. Adhatoda Zeylanica minima flore albo. *Herb. Hart.* Adhatoda Maderaspatana, fpica longa foliacea, marginibus albis. *Muſ. Petiv. no.* 338. Adhatoda Canarienfis oleae folio viridi, huic proxime convenit, quae reperitur defcripta in *Ray. tom.* 3. *pag.* 81. *Dendrol.* Lignofus hic fruticulus ramofiſſimus eft, ramos undique fpargens ad terram inclinantes, folia Hyſſopum referentia gerens, bina fibi mutuo oppofita, fcabra, duriufcula, viridia: flores habens in fummo caulium collectos, fpicatos, albicantes, inter foliola fubrotunda Thymum aemulantia, fimbriâ albicante tenuiſſimâ cincta, abfconditos, fi clauſi, aperti vero fefe inter illa extollentes, fuo contenti calice; qui flofculi anomali perfonati funt, labio fuperiore acutiore conftantes, barba autem pendula, reflexa trifida.

ADHATODA fpica longiſſima, flore reflexo. *Nobis Tab.* 4. *Fig.* 1. Adhatoda floris labio fuperiore anguftiſſimo & ad pofteriora reclinato. *Tournef. inſtit. pag.* 175. Kokeria Zeylanica, folio conjugato, flore albo. *Herb. Hart.* hujus varietas eft, quae Arbor Zeylanica, floribus coeruleis in fpica difpofitis dicitur in *Muſ. Zeyl. pag.* 33. quae eft Carim-Curini *H. Malab. part.* 2. *Tab.* 20. & Curini forte prima fpecies. *Plukn. Phyt. Tab.* 171. *Fig.* 4.
Caulis hujus fruticis lignofus eft & glaber: folia oppofita, ovato-lan-

ceo,


ceolata, glaberrima, utrinque viridia. Caulem terminat ſpica longiſſima, flores gerens inter foliola provenientes, inferius florere incipiens, & ad ſummitatem denuo deſinens. ſub ſingulo flore ſubjicitur foliolum oblongum utrinque acuminatum, quod cum ipſis floribus ſimul decidit, niſi fructus excreſcat. reliqua in *H. Malab.* accurate deſcribuntur.

ADHATODA ad alas ſpinoſa & florifera. *Nobis.* Adhatoda Malabarica, tetracantha. *Petiv. Act. Phil. Lond. vol.* 20. *num.* 244. &c.
Eryngium Zeylanicum luteum febrifugum. *Muſ. Zeyl. pag.* 43. Planta Indica ſpinoſa, amara, antifebrilis *ibidem. pag.* 62. Coletta-Veetla *H. Malab. part.* 9. *Tab.* 41.
Melampyro cognata Maderaspatana, ſpinis horrida, an Coletta Veetla? *H. Malab. Plukn. Phyt. Tab.* 119. *Fig.* 5. Lycium Indicum ſpinis quaternis ad foliorum ſingulorum ortum. *Par. Bat. Pr. pag.* 349. *H. Beaum. pag.* 28. & *Alb. Sebae rerum natur. theſ. part.* 1. *Tab.* 13. *Fig.* 1. *pag.* 21. KATHUKAROHITI Zeylanenſibus *Tsje-Mulli & Semul.* Malabaris.

ADIANTHUM caule reflexo, pinnulis alternis, ſtriatis, in ſummo crenatis & frugiferis. *Nobis. Tab.* 5. *Fig.* 1. Adianthum Zeylanicum Filicis facie. *Muſ. Zeyl. pag.* 37. Adianthum Zeylanicum Filiceum Hermanni. *Herbar. Gronov.* Filicula Maderaspatana, foliolis furcatis, ex apice prolifera. *Petiv. Muſ. no.* 767.
Communicavit mecum elegantem hanc plantam doctiſſimus Botanicus Joh. Freder. Gronovius, qui illam per D. Scherard ex herbario Hermanni poſſidet.
Caulis hujus plantae eſt ſimplex, filiformis, purpureus, longus, incurvatus; pinnae ab utroque latere pinnatim exeunt ſitu fere alterno, maxime ſibi adjacentes, verſus ſummitatem ſenſim breviores, & in ipſo caulis apice minimae, citra ordinem ſparſae, valde rarae. Apex caulis videtur terram petere & radices agere. Pinna ſingula eſt folium ſimplex ſine notabili petiolo, margine inferiore recto, vel fere falcato, ſuperiori convexo magis ſerrato, & interdum profundius ſecto, margine verſus apicem rotundo, diviſo. Folii baſis eſt transverſim angulo inferiori caulis adnata.
Fructificatio fit infra marginem ſuperiorem, ut in Adiantho.



Pag. 8.
Tab. 5.
Fig. 2.
AMARANTHOIDES
Indicum, nodiflorum. &c.
Fig. 3.
AMARANTUS
spicatus Zeylanicus,
foliis obtusis, &c.
Fig. 1.
ADIANTHUM caule reflexo,
pinnulis alternis, striatis. &c.



ADIANTHUM Indicum repens foliis Coriandri. *Muſ. Zeyl. pag.* 51. an A-dianthum nigrum majus, ramoſum, Coriandi folio? *Sloan. Catal. pl. Jam. pag.* 23. BOBU Zeylonenſibus.

ALCANNAE ſpecies Zeylanica, MANITHONDI Zeylonenſibus. *Muſ. Zeyl. pag.* 6.

ALCEA Indica floſculis parvis, albis. *Muſ. Zeyl. pag.* 65. an Althaea peregrina longiore Betonicae folio, floribus albis perexiguis, capitulis arcte conglomeratis. *Plukn. Almag. pag.* 25? quae in *Phytogr.* inſcribitur Malva Orientalis, elatior, longiori folio, flore albo minimo, capſulis conglomeratis. *Tab.* 44. *Fig.* 5. Malvindae habenda ſpecies.

ALCEA Indica floribus roſeis parvis, fructibus parvis, quinquepartitis, hispidis, lappaceis. *Muſ. Zeyl. pag.* 8. Alcea roſea Zeylanica *ibidem pag.* 10. Althaea Zeylanica fructu hispido, lappaceo. *Amm. H. Boſiani pag.* 2. Uren. *H. Malab. part.* 10. *Tab.* 2. quae Alcea Malabarica folio Vitis, flore minore, roſaceo colore, fructu lappaceo, ſemine roſtrato. *Commelini in notis ibidem.* Malva, vel Alcea fruticoſa Ribeſii foliis, ſeminibus aſperis. *Sloan. Cat. Pl. Jam. pag.* 96. ubi vide reliqua. & *Hiſt. Jam. vol.* 1. *pag.* 37. *Tab.* 11. *Fig.* 2. AEPALA Zeylonenſibus. annua eſt haec planta, toto anno florens & virens. ut notatur in *Muſ. Zeyl. pag.* 8. ſine dubio haec Urenae ſpecies eſt, cujus notas vide deſcriptas apud Doctiſſimum & accuratiſſimum *Dillenium in H. Eltham. pag.* 430. & 431. qui hanc habet pro Alcea Indica fruteſcente, foliis ad marginem exaſperatis, Bryoniae albae diviſuris. *Plukn. Phyt. Tab.* 5. *Fig.* 3.

ALCEA Zeylanica, oblongo, anguloſo folio, flore parvo luteo, fructu orbiculato, ſemine anguloſo. *Hert. Catal. ſemin.*

ALCEA Indica minor, ſemine leviter crispato. *Muſ. Zeyl. pag.* 42. quae *Dillenio* eadem videtur cum Alcea Indica molli & hirſuto, ſeu lanuginoſo folio, ſeminibus duplici & nonnunquam triplici roſtro donatis. *Muſ. Zeyl. pag.* 2. Vide *H. Eltham. pag.* 213. & infra Malvindam.

ALCEAE ſpecies ſingularis. *Muſ. Zeyl. pag.* 42. SINIHIDDA, SIHINELLA, & SIHINIDDA. Zeylonenſibus.

ALCEA Indica, Bellidis ſpinoſae folio, floſculis parvis. *Muſ. Zeyl. pag.* 44. KOTHIHAMBAEBILA & KOTHIHAMBAEWILA Zeylonenſibus.

ALCEA Indica, floſculis luteis parvis, triangulo folio. KAEJARABAEWILA Zeylonenſibus. *Muſ. Zeyl. pag.* 54.

ALCEA Zeylanica, Carpini folio, floſculis faſciculatim congeſtis. *H. L. Bat. pag.* 13. ubi brevis deſcriptio. Sine dubio hae ſunt Malvindae ſpecies; quas juxta *Hermannum* hic poſuimus, cujus plures infra ad Malvindam commemorantur.

ALCHIMILLAE congener planta Indica. *Muſ. Zeyl. pag.* 57. MAHANCAKUNUWAENNA Zeylonenſibus. *Makuna* Aranea eſt, utcunque enim plantae folia aranearum telis circumdata obſervantur. *ibidem.*

ALCHIMILLAE vel Perchepier affinis, Zeylanica, procumbens, Chamaeciſſi foliis & facie, floſculis purpureis. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 11.

ALKEKENGI ſomniferum Cydoniae folio, flore & fructu rubris. *Nobis.* Solanum Antiquorum Alpini *Muſ. Zeyl. pag.* 58. Solanum ſomniferum antiquorum *Alpin. exot. cap.* 33. *pag.* 70. Figura & 71. ejus deſcriptio. Solanum ſomniferum, verticillatum *C. B. P. pag.* 166. Solanum verticillatum. *J. B. tom.* 3. *lib.* 34. *pag.* 610. Alkekengi Mexiocanum. COLUM. *ad Hernand. pag.* 296. Solanum ſomniferum antiquorum verum. *Parkin. Theat. pag.* 347. Peevetti *H. Malab. part.* 4. *Tab.* 55. ubi vide notas, & *Plukn. in Almag. pag.* 352. qui hanc a Solano Alpini ſeparat. de ejus viribus & uſu vide *Samuel. Dale. Pharmacol. ſupplem. pag.* 159. ad Solanum ſomniferum Offic.

ALKEKENGI Indicum, glabrum, Capſici folio. *H. Elth. pag.* 12 & 13. *Tab.* 11. qui omnino videndus. Solanum veſicarium, Indicum, maximum. *Muſ. Zeyl. pag.* 2. Solanum veſicarium Zeylanicum, baccis folliculiſque herbaceis. *ibidem. pag.* 30. ubi dicitur; Convenit cum Camaru *Marcgravii*, & Solano Veſicario *Camerarii*, & Halicacabo *Bontii*, quod recte refutatur a *Dillenio* in *H. Elth.* loco citato, quum tres diverſae ſint plantae. NALALBATHU haec incolis audit; a *Nalal* fronte,



ALSINE hirta minor, foliis alternis. &c.

ALSINE lutea, ramosissima, pentaphylla, polyanthos. Nobis.

fronte, & *Bathu* ſonitu, has enim veſiculas pueri jocantes fronti allidunt ad ſonitum excitandum, ut notatur in *Muſ. Zeyl. pag.* 2.

ALKEKENGI Zeylanicum, fructu parvo, rotundo, rubro. *Nobis.* an Halicacabus, Indicus, minor DAUN CAPO-CAPO. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 10. *cap.* 44. quod eſt Solanum Indicum *Grim.* in *Laborat. Ceyl. pag.* 125. ubi ſic deſcribitur: planta eſt mediocriter alta, fructus profert parvos, rotundos, rubros, ſicut Alkekengi concluſos; apud incolas maximo in pretio habetur, atque ipſi vires easdem, quas nos Alkekengi adſcribunt.

ALKEKENGI Indicum, minimum, fructu vireſcente. *Tournef. Inſt. pag.* 151. Solanum veſicarium Zeylanicum, minus, fructu folliculoque herbaceo. *Muſ. Zeyl. pag.* 62. Solanum veſicarium Indicum minimum. *H. L. B. pag.* 569. ubi Figura & deſcriptio. *Moriſ. part.* 3. *pag.* 527. *Plukn. Almag. pag.* 352. ubi & huic jungitur Halicacabum Alkekengi Arabibus dictum *Bontii pag.* 149. & inquiritur an ſit Pee-Inota-Inodien. *H. Malab. part.* 10. *Fig.* 71. Solanum veſicarium Ceylanicum, minimum Bontii. *Amm. H. Boſian. pag.* 33. ubi adeſt deſcriptio. Alkekengi character optime invenitur apud *Linnaeum in char. pl. gener. pag.* 51. qui novum nomen PHYSALIS huic generi tribuit.

ALLAKERALYA. *Muſ. Zeyl. pag.* 67. *Alla* denotat radices majores edules.

ALOE Zeylanica pumila foliis variegatis. *Par. Bat. Pr. pag.* 306. *H. Amſt. tom.* 2. *Fig.* 21. *pag.* 41. Aloë pumila Zeylanica ſerpentaria. *Breyn Prodr.* 2. *pag.* 12. *Plukn. Phyt. Tab.* 256. *Fig.* 5. Separantur hae plantae in *Ray. tom.* 3. ut apparet. *pag.* 568. & *pag.* 572. Aloë Zeylanica, folio ex viridi & nigro vario. *Heiſt. Cat. pl. Acad. Juliae ann.* 1732. *pag.* 2. Aloes character habetur apud *Linnaeum in char. gen. pl. pag.* 99.

ALSINE hirta minor, foliis alternis, floribus ſolitariis. *Nobis. Tab.* 6. *Fig.* 1. Alſine Zeylanica, humirepens, foliis Auriculae muris, floſculis cæruleis, ſiliquis puſillis turgidis. *Herb. Herm.* Alſine Zeylanica repens, Auriculae muris folio, floribus caeruleis, liliaceis (ſiliquis) parvis turgidis. *Muſ. Zeyl. pag.* 11. Alſine Zeylanica, rotundifolia,

 hirſuta,

hirſuta, floſculis coeruleis *ibidem pag.* 37. Alſine folio Piloſellae, exiguis capitulis Lini. *ibidem pag.* 56. Myoſotis foliis ſubrotundis, herba Indiae Orientalis. *Plukn. Phyt. Tab.* 205. *Fig.* 7. WISNUGARANDI incolis vocatur, a *Wisnu*, quod nomen alicujus Dei eſt apud Malabaros, quem in templis ſuis adorant. *Garandi* notat Dyſenteriam, cui plurimum confert haec planta; ut notatur in *Muſ. Zeyl. pag.* 11 & 56.

Puſilla licet haec planta ſit, non tamen inelegans eſt, quae ex radice fibroſa repente oritur, multis ramulis praedita, tota quanta hirſuta, caules enim, ut & folia, immo ipſi foliorum & florum pedunculi hirſutie ſua ruffa, quaſi lanugine undique obducti ſunt. Folia gerit alterna, ſubrotunda ab utraque parte piloſa, cauliculis brevi annexa pedunculo, ex quorum alis flores ſolitarii egrediuntur longo pediculo, & calice quinquefido ſuffulti; floſculi autem ſunt liliacei, pentapetaloides, coloris coerulei, pro plantae ratione ſatis magni, quibus deciduis vaſcula ſeminalia apparent rotunda, turgida membranacea, pericarpio magno in quinque partes diſſecto contenta, in quibus vaſculis plurima reperiuntur ſemina, minima, ſubrotunda, nigricantia.

Dubito, an non ſit Anagallidis inferius deſcriptae & depictae ſpecies, ſi non eadem; quum autem diverſis nominibus ab *Hermanno* & *Hertog* fuerint collectae & ad vivum denominatae, in exſiccatis mutationem facere & eas conjungere arduum mihi videbatur, praeterquam quod ante collationem jam aeri eſſent inſculptae, ſi quis vero pro iisdem habeat, non multum forte hallucinabitur.

ALSINE lutea, ramoſiſſima, pentaphylla, polyanthos. *Nobis. Tab.* 6. *Fig.* 2. Alſine Zeylanica, humirepens, floribus luteis, capitulis Lini, Spergulae facie. *Herb. Herm.* Alſine folio viridi, ſubrotundo, ramoſa, capitulis parvis rotundis, *Muſ. Zeyl. pag.* 33. Alſine Spergulae facie, Maderaspatenſis, foliis latioribus, ſemine minutiſſimo nigro. *Plukn. Phyt. Tab.* 118. *Fig.* 1.

Major & elatior multo quam praecedens progerminat haec planta, ramoſa itidem & repens, ſed ramis laxis, longiſſimis ſeſe diffundens, caules habens rotundos, glabros, virides, ad quorum divaricationem folia ſubrotunda, glabra, oriuntur, numero utcunque quina, tria utplurimum majora, bina minima, & in exſiccata aliquando vix conſpicua, unde in *Pluknetii Figura* in plantae nempe parte ſuperiore forte ſunt omiſſa. Ad foliorum ortum pedunculi longiſſimi, ramoſi admodum flores



ALSINE *erecta pentaphylla, flore albo. Nobis.*

flores in supremo sustinentes proveniunt. Flosculi sunt parvi, pentapetali, lutei, qui clausi & per exsiccationem compressi vascula seminalia in nostra Figura referunt. Vasculum vero ipsum est turgidulum, rotundum, tenue, membranaceum, seminibus nigricantibus transparentibus repletum. Scatet enim seminibus plurimis, minutissimis, nigerrimis.

ALSINE Veronicae facie, pediculis uncialibus, & sesquiuncialibus. *Muf. Zeyl. pag.* 17. Alsine forte Veronicae affinis, Trissaginis folio & facie, Maderaspatana. *Plukn. Phyt. Tab.* 125. *Fig.* 4. HIRAMANA Zeylonensibus, quod dicitur a rota serrata, qua Cinghali nucleum ex Nuce cocco exprimunt. ob foliorum forte similitudinem.

ALSINE Zeylanica, folio capillaceo. *Muf. Zeyl. pag.* 32. an Alsine Indica, polyanthos, tenuifolia. *Plukn. Phyt. Tab.* 125. *Fig.* 5?

ALSINE Glaucis marinae folio. *Muf. Zeyl. pag.* 33. Alsine Indica, Glaucis maritimae folio, flosculis ex alis longo pedunculo innixis. *Plukn. Phyt. Tab.* 130. *Fig.* 1.

ALSINE Zeylanica, buxifolia. *Muf. Zeyl. pag.* 67. forte convenit cum Alsine Acadiensi, Buxi folio, perenni *Boerh. Ind. pl. part* 1. *pag.* 209.

ALSINE erecta, pentaphylla, flore albo. *Nobis. Tab.* 7. Alsine Zeylanica, sylvestris, erecta, flore albo. *Herb. Hertog.*
Sylvestris haec Alsines species ortum suum ducit ex radice tenui, albicante, vix fibrosa, quae quamprimum e terra progerminat, est ramosa, ternos quaternos simul attollens ramulos, qui foliis cincti sunt oblongis, glabris, amoene viridibus, quinis numero, tribus utcunque majoribus, duobus minoribus, tanquam appendicibus additis; ex quorum alis flosculi solitarii, gemini saepius, longis innixi pediculis, albicantes egrediuntur pentapetali, simili contenti calice, qui vasculum seminale dant oblongum, sulcatum, punctis protuberantibus verruculis quasi obsitum, per maturitatem facile dehiscens, & quatuor efformans apices, semina emittit rotunda, minima, fusca.

ALSINE ramosa, procumbens, quadrifolia, ad radicem polyphylla. *Nobis. Tab.* 8. *Fig.* 1. Alsine Zeylanica, sylvestris, repens, floribus albis. *Herb. Hert.* Alsine Zeylanica, repens, sylvestris, conjugato folio, flore albo. *Hert. Catal. femin.*

 Altera

Altera haec fylveftris Alfines fpecies itidem radice albicante, fed magis fibrofa & craffiore oritur, ftatim ramos e terra producens, per quam quafi repens fefe diffundit, circa quorum ortum plurima ad radicem erumpunt folia oblonga, ad bafin anguftiora, in fummo obtufa, & latiora; ad ramificationes vero quatuor foliola anguftiora, triplo fere minora progerminant, e quorum alis pedunculi longiffimi oriuntur, in fummo flores tanquam in umbella collectos gerentes: flofculi itidem funt albi, pentapetali, vafculum feminale dantes tenuiffimum, glabrum, membranaceum, femina continens minima; nigricantia.

Alsine foliis ad radicem pofitis. *Nobis. Tab.* 8. *Fig.* 2. Alfine Zeylanica, latifolia, feu platyphyllos, Capitulis oblongis turgidis. *Herb. Herm.* Alfine Zeylanica, repens, folio fucculento, flore albo. *Hert. Catal. femin.* Alfini affinis, foliis Bellidis minoris, caule nudo. *Sloan. Hift. Jam. part.* 1. *pag.* 203. *Tab.* 129. *Fig.* 2. & *Cat. Pl. Jam. pag.* 87.
Humilis haec planta inftar Bellidis e terra propullulat, folia ad radicem arcte collecta gerens, glabra, viridia, tenuia, formam Bellidis perfecte referentia. Non ramofa eft haec planta, fed pedunculos ad foliorum concurfum, aut centrum emittit longiffimos rectos, in fummo inftar Umbellae explicatos, quibus flores infident tetrapetali, quantum in ficcata apparet, fulvi coloris feu Ochroleuci, qui claufi, tumidi funt & oblongi, fefe aperientes crateriformes, aperti vero ftellati, vafcula feminalia dantes fubrotunda, membranacea, feminibus nigerrimis, rotundis, minimis repleta. Alfines characterem habet *Linnaeus in char. gener. pl. pag.* 133.

ALTHAEA Zeylanica, aquatica DYAAEPALA Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 65. convenit forte cum Alcea fruticofa aquatica, folio cordato, fcabro, flore pallide luteo. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 97.

Althaea Zeylanica incana, flore luteo parvo Abutili, foliis Ibifci; feu Althaea Indica minor, feminibus furcatis. *Muf. Zeyl. pag.* 44. an Althaea Indica, Abutili fubrotundo folio, flore luteo fpicato? *Plukn. Phyt. Tab.* 74. *Fig.* 6. Malva Americana, folio Abutili, flore luteo fpicato, foliis incanis. *Par. Bat. Pr. pag.* 349. Althaea flore luteo. *Sloan. Cat. Pl. Jam. pag.* 96. KAESURUBAE WILA. Zeylonenfibus a *Kaefuru*, quod leonem, & *Baewila*, quod collum fignificat.

Al-

ALSINE ramosa, procumbens, quadrifolia, ad radicem polyphylla. Nobis.



ALSINE foliis ad radicem positis. Nobis.

ALTHAEA Indica, minor, semine furcato. *Muſ. Zeyl. pag.* 40. Althaea Zeylanica, rotundifolia, floſculis luteis parvis, folio Bellidis. *Muſ. Zeyl. pag.* 30. an Althaea fruteſcens, orbiculari fere folio, flore luteo, Indiae Orientalis ſemine roſtrato? *Plukn. Phyt. Tab.* 132. *Fig.* 2. HINA-NODA Zeylonenſibus.

ALTHAEA Zeylanica, minor, ſeminibus bifurcatis altera. *Muſ. Zeyl. pag.* 59. forte Malva minor, ſupina, Betonicae folio, flore coccineo, ſeminibus aſperis. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 96.

ALTHAEA Indica, minima, BAEWILA Zeylonenſibus. *Muſ. Zeyl. pag.* 17. ubi habetur pro Alcea Pernambuccana, ſemine roſtro ſimplici donato, quae deſcripta reperitur apud *Moriſ. in hiſt. pl. Tom.* 2. *pag.* 528. & in *Muſ. Zeyl.* additur, quod folia gerat ſubrotunda, ſubtus glauca, flores vero hora meridiana aperiantur, matutina vero ſole oriente claudantur. Huc pertinet Malva erecta, minor, Carpini folio, flore luteo, ſeminibus ſingulis ſimplici aculeo longiore donatis. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 96. ubi vide reliqua.

ALTHAEA Indica, foliis oblongis, mollibus Betonicae forma, floſculis exiguis, racematim diſpoſitis. *Muſ. Zeyl. pag.* 30. Althaea ſpicata, Betonicae folio villoſo, ſpica breviore & latiore. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 97. Althaea Indica, floſculis parvis, folliculatim (forte faſciculatim) ramulis adfixis *Breyn. Prodr.* 1. *pag.* 2. Malva Americana, Carpini folio, floribus aureis parvis, faſciculatis. *Par. Bat. Pr. pag.* 350. *Plukn. Phyt. Tab.* 9. *Fig.* 5.

Althaeae hae minores *Hermanni* ad plantas hodie Malvindas dictas pertinent, quo a Syſthematicis ablegari poterunt, quum ipſis autem deſtituor plantis, nova illis imponere nomina arduum videbatur.

ALUPADHAWAEL. *Muſ. Zeyl. pag.* 50 & 60. ab *Alu* cinere, totus enim frutex, ut & fructus cinerei eſt coloris. *ibidem.*

AMARANTHOIDES Lychnidis folio, capitulis purpureis. *Tournef. inſt. pag.* 654. Amaranthoides Indicum monoſpermum foliis Ocymaſtri, capitulis purpureis. *Par. Bat. Pr. pag.* 309. & *Par. Bat. pag.* 14. Amarantho affinis, ſive Amaranthoides major, Indica, Ocymoidis folio & facie, flore globoſo purpureo. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 13. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 4. Amarantho affinis Indiae Orientalis, floribus conglomeratis,

meratis, Ocymoidis folio. *Breyn. Cent. pag.* 109. ubi elegans icon & defcript. nec non in *H. Amſt. tom.* 1. *pag.* 85. Caraxeron Ocymaftri-folium, capitulis majoribus purpureis. *Vaill. act. reg. Parif.* 1722. *pag.* 263. Amarantho affinis, Africanus, perennis. *H. Mauroc. pag.* 12. Gnaphalio affinis, Ocymaftri folio, flore ex purpureo violaceo. *H. L. B. pag.* 294. Ptarmica Indica, hortenfis, capitulis globofis, rigidis, interne purpureis. *Muf. Zeyl. pag.* 8. Ptarmica Indica, hortenfis, in-cana, capitulis rigidis faturate coccineis, Amaranthinis. Amaranthus globofus vulgo. *Muf. Zeyl. pag.* 27, 59 & 62. Flos globofus BONGA KNOP *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 8. *cap.* 72. ubi purpureus & albus defcribitur. Wadapu. *H. Malab. part.* 10. *Tab.* 37. WADAMBU Zey-lonenfibus, id eft, flos non marcefcens. *Fula Bouton* Malabaris.

Amaranthoides Indicum, nodiflorum, capitulis ex albo viridefcentibus. *Nobis. Tab.* 5. *Fig.* 2. Amaranthus Indicus, flore globofo herbaceo. *Muf. Zeyl. pag.* 33. Amaranthoides Indicum, globofum, ad caulium nodos floridum, foliis folitariis fummo apice barbatis. *Plukn. Phyt. Tab.* 133. *Fig.* 2. Serratula Zeylanica, erecta, folio oblongo. *Herb. Hert.* KATHUTAMPALA Zeylonenfibus.

Pufilla haec planta caule erigitur viridi, rotundo, cui folia alternatim adcrefcunt fatis remota, folitaria, glabra, oblonga, in acutum apicem definentia, utrinque viridia. Flofculi caulibus ad foliorum ortum ar-ctiffime adfixi, feu feffiles collocantur, in caput rotundum, feu fphae-ricum collecti, paleacei, coloris ftraminei, fplendentis. Amaranthoi-dis character exhibetur a *Linnaeo, in char. pl. gen. pag.* 69. qui generi huic novum indidit nomen GOMPHRENA.

AMARANTUS fpicatus, Zeylanicus, foliis obtufis, Amaranto Siculo Boccone fimilis. *Nobis. Tab.* 5. *Fig.* 3. Verbena Indica, fpicata, foliis obtufis, flore coerulefcente. *Herb. Hert.* Verbena Indica, fpicata foliis obtufis. *Muf. Zeyl. pag.* 1. Verbena Indica, obtufis foliis, fpica comofa. *ibidem pag.* 20. ubi pro Verbena Indica Bontii, (quae apud eum *pag.* 150. exprimitur,) & Amaranto fpicato Boccone habetur. Stachyarpa-gophora Bliti foliis rotundioribus. *Vaill. act. reg. Parif. ann.* 1722. *pag.* 279. qui & alteram habet Bliti foliis pubefcentibus, fubtus argenteis. Cadelari Sicula, Parietariae folio. *Petiv. act. Phil. Lond. ann.* 1713. *pag.* 181. Cadelari *H. Malab. part.* 10. *Tab.* 78. qui eft Amarantus fpicatus, Coromandel. Bliti majoris crifpato folio, radice perenni.

Plukn.

Plukn. Mantiss. vide & ejus *Phyt. Tab.* 10. *Fig.* 4. & *Tab.* 260. *Fig.* 2. & *Almag. pag.* 26. KARALHAEBO Zeylonensibus dicitur; de quo notatur in *Mus. Zeyl. pag.* 20. quod ejus succus cum Olei Sesami parte anatica sumptus curet Dysenteriam, quo cum Cadelari *H. Malab.* convenit. Puto autem hanc nostram ab Amarantho Siculo Boccone differre, ut Cadelari & Scheru-Cadelari *H. Malab.* & hanc nostram Cadelari, illam autem Boccone convenire cum Scheru-Cadelari; nostrae enim folia sunt subrotunda, & in majoribus ramis fere orbiculata, quum Amaranthi Boccone folia sint acutissima, multoque minora, ut folium solitarium Tab. nostrae quintae insculptum ostendit, & duas revera esse diversas species, ex Pluknetio & Vaillant. patet. Caeterum flores utriusque plantae in acutissimam spicam collecti sunt, & in reliquis conveniunt, ut ulterius ex descriptione *H. Malab.* constat.

AMARANTUS humilis, foliis oppositis, flosculis in alis conglomeratis. *Nobis. Tab.* 4. *Fig.* 2. An Amaranthoides Maderasp. foliis angustis ex adverso binis, floribus ad nodos verticillatis. *Plukn. Phyt. Tab.* 132. *Fig.* 6? Polygonum Indicum minus, flosculis glomeratis albis. *Mus. Zeyl. pag.* 14. Knauwel Zeylanica folio conjugato Linariae, flosculis in capitulum collectis. *Herb. Hert.* MUGHUNUWAENNA Zeylonensibus, a *Mughuni* quod oculos piscium denotat, quibus similes sunt hujus flores. *Waenna* notat illud, quod humi jacet, ac serpit, planta enim est humi repens, quae virtutis est refrigerantis, & ejus folia a Cinghalensibus comeduntur loco Bliti, ut notatur in *Mus. Zeyl. pag.* 14. *Ponnakani* Malabaris audit.

E radice fibrosa albicante provenit caulis brevis ad radicem ramosus, quadrangularis, tenuis; cui folia adcrescunt opposita, oblonga, angusta, integra, utrinque viridia. Flores in capitulum sunt congesti, saepius oblongum, in alis foliorum sessiles, albicantes, nitidi. Calix florum minimus est, quinquefidus; stamina quinque, pistillum unicum, capsula seminalis fere orbiculata, emarginata, unilocularis, condens semen unicum subrotundum nitidum, splendens, unde verus est Amaranthus.

AMARANTUS Indicus minor, folio subrotundo. *Mus. Zeyl. pag.* 1. An Amarantus verticillatus minor, Bengalensis, Serpilli foliis incanis. *Plukn. Phyt. Tab.* 10. *Fig.* 3? vel potius Amaranthi genus pusillum subrotundis foliis Indianum. *Plukn. Amalth. pag.* 12.

AMARANTUS Zeylanicus, maximus, humilis KUMATHYA Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 1.

AMARANTI fpecies, foliis Halimi maritimi noftratis. *Muf. Zeyl. pag.* 8.

AMARANTUS Zeylanicus, fpicatus, Salicis folio, flore carneo. *Hert. Catal. femin.* Amarantus Zeylanicus, Salicis folio, flore carneo. *Heifter. Ind. plant. Hort. Acad. Juliae anni* 1730. *pag.* 3.

AMARANTUS fpicatus, aureus, Zeylanicus. *Muf. Zeyl. pag.* 30. Amarantus fpicatus, aureus & igneus. *Boerh. Ind. H. L. B. part.* 2. *pag.* 98. Amaranthus aurea fpica, & ignis verficolore. *H. R. Par.* Amaranthus luteus, fpicatus. *Weinman. Phytanthoz. no.* 84. *litt. b.*

AMARANTUS Indicus, anguftifolius, fpica rigida alba. *Muf. Zeyl. pag.* 66. Amarantus fpicatus, argenteus, Americanus. *Boerh. Ind. H. L. B. part.* 2. *pag.* 98. Amaranthus Linariae folio, fpica argentea. *Weinmann. Phytanthoz: n.* 96. *litt. c.* Amarantus forte minor Indicus, folio Tripolii, flore ex aeneo & argenteo colore variegatus. *Amm. Char. pl. pag.* 155. *Breyn Prodr.* 1. *pag.* 3. KIRIHAENDA Zeylonenfibus, a *Kiri* quod lac notat & *Haenda*, quod cochlear.

AMARANTUS Indicus, fpinofus, fpica herbacea. *H. L. B. pag.* 31. ubi defcriptio & *pag.* 33. ejus Figura. Amaranthus Indicus fpinofus, fpica herbacea monofpermos, cauliculis viridantibus. *Par. Bat. Pr. pag.* 309. ubi & idem cauliculis rubentibus & fpica purpurafcente citatur, nec non a *Tournef. inft. pag.* 236. Amarantus major, Ceylanicus, fpinofus, flore viridi. *Amm. Char. pl. pag.* 105. Atriplex paniculata, Indica, fpinofa. *Muf. Zeyl. pag.* 62. Blitum fpinofum, Bajang Baduri. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 8. *cap.* 43. Blitum monofpermum Indicum aculeatum, capfula rotunda, feu Amaranthus major, fpinofus, Zeylanicus, flore viridi. *Breyn Prodr.* 1. *pag.* 18. ubi & *pag.* 19. Atriplex fpinofa Zeylanica *D. Hermans* vocatur. Blitum Americanum fpinofum. *Ray hift. pl. pag.* 199. *Sutherl. Catal. pl. Edinb. pag.* 51. *Sloan. Cat. pl. Jam. p.* 49. KATHUTAMPALA Zeylonenfibus, id eft Amaranthus fpinofus, a *Kathu*, quod fpinam notat, & *Pala*, quo omne genus Bliti & Amaranthi edulis a Cinghalenfibus fignificatur.

AMYG-



ANAGALLIS *hirsuta, foliis solitariis alternis, floribus coeruleis. &c.*

AMYGDALUS amara Indorum, putamine fungofo amicta, flore umbellato, nucibus ad unum florem plurimis SAMANDARA Bengalenfibus & COEMBURA Zeylanenfibus dicta. *Plukn. Mantiff. pag.* 12. Amygdalus amara fructu aggregato, cujus ofliculum materia craffa & fungofa cum nucleo occultatur. *Plukn. Almag. pag.* 250. ubi pro Nagam *H. Malab. part.* 6. *Tab.* 21. habetur.

ANACARDIUM Occidentale *Cajous* dictum, ofliculo reni leporis figura. *H. L. B. pag.* 30. Pomifera, feu potius Prunifera Indica, nuce reniformi, fummo pomo innafcente, *Cajous* dicta. *Ray. hift. pl. pag.* 1649. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 187. qui plurima habet fynonyma; ut & in *Hift. Jam. part.* 2. *pag.* 136. ubi Acaju arbor pomifera, fructu delectabili, rubro, nuce reflexa propendente, Anacardii ritu, *Surian* vocatur. Eleganter fatis exprimitur etiam apud *Merian. infect. Surinam. Tab.* 16. Cajous *Clus lib.* 1. *Aromat. cap.* 30. Caffuvium Cadju *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 1. *cap.* 59. *app.* Acajou *Pifonis pag.* 58. & ejus *Mantiff. aromat. pag.* 193. Cajus *Acoftae* edit Venet. *pag.* 246. ubi Figura. Anacardus Zeylanica, folio Nucis Juglandis *Cajous* vulgo. *Muf. Zeyl. pag.* 55. Acajous, five Anacardii altera fpecies *Herb. Hert.* quae quum in omnibus conveniat cum Kapa-Mava. *H. Malab. part.* 3. *Tab.* 54. ubi bene defcripta & expreffa eft, Figuram nec defcriptionem damus. Reliqua ejus fynonyma & ufum fructus vide apud *Samuel. Dale. Pharmac. pag.* 406. Characterem vero apud *Linnaeum Char. pl. gen. pag.* 129. KAGHU Zeylonice audit.

ANAGALLIS Zeylanica, minor, procumbens, *D. Hermans.* MUGUMIWENNA Zeylonenfibus. apud *Ray. tom.* 3. *pag.* 496.

ANAGALLIS Zeylanica, aquatica, foliis longis & anguftis. *Muf. Zeyl. pag.* 36.

ANAGALLIS hirfuta, foliis folitariis alternis, floribus coeruleis, petiolo articulato infidentibus. *Nobis. Tab.* 9. Anagallis Zeylanica major, flore coeruleo. *Herb. Hert.* Simili nomine invenio Anagallidis-fpeciem citatam apud *Ray. tom.* 3. *pag.* 496. quae infcripta eft. Anagallis flore coeruleo major, Lufitanica *Grislei. D. Hermans.* quae cum noftra eadem videtur. Noftrae plantae Figura, fed imperfecta, occurrit apud *Plukn. in Phyt. Tab.* 9. *Fig.* 1. quae etiam non recte infcribitur; voca-

tur enim Alfines facie Myofotis Bisnagarica frutefcens, flofculis pallide flavefcentibus. primo flofculi ibi expreffi nihil minus, quam Alfinis aut Myofotidis fpeciem referunt, Convolvuli enim funt: fecundo planta eft humillima, vix fpithamum alta, nec caulefcens, unde ergo denominatio frutefcentis? Tertio additur flofculi quidem ut Anagallidis (quod in Figura minime confpicitur) non tamen coerulei; an ergo fi effent coerulei, color characterem Anagallidis daret? Ita ut nihil certi de iis poffimus concludere. Veram itaque & meliorem hujus plantae hic dabimus figuram & defcriptionem. Quae radice oritur firma, longa, craffiufcula, cinerea, multas fibras emittente, quae paulo fupra terram varios dat ramos cauliculis & foliolis hirfutiffimis inftructos: folia autem alterne locantur, pedunculis breviffimis caulibus adfixa, feffilia fere, fubrotunda, ab utraque parte valde pilofa, fuperiore viridia, inferiore cinerea, per ejus dorfum nervo, qui pedunculi breviffimi continuatio eft, ad fummum excurrente: Ex alis vero foliorum proveniunt flores longiffimis, fed tenuiffimis pedunculis infidentes; pedunculus autem in medio duo foliola, caliculum haud male referentia habet, ubi facile frangitur, & ex quorum foliolorum juncturis alter quafi pediculus per articulationem oritur. Flores funt quadrifidi, in quatuor fegmenta divifi, in quorum medio quatuor ftamina apices flavos oblongos habentia eriguntur, calice longo, hirfuto, quadrifariam profunde diffecto, contenti, coerulei, ut Anagallidis Monelli, Vafculum feminale eft fphaericum, membranaceum, femina nigricantia, triangula continens plurima.

ANANAS fylveftris, arborefcens Acoftae. *Muf. Zeyl. pag.* 55. Ananas bravo *Acoftae edit. Ital.* in *quart. pag.* 265. ubi Figura & apud *Clus cap.* 45. Ananas fylveftris folio Aloes, fructu cupreffino. *J. B. tom.* 3. *pag.* 96. *Commel. Fl. Malab. pag.* 5. *Plukn. Amalth. pag.* 13. ubi plura fynonyma, & in *Almag. pag.* 277. Palmae affinis arbor conifera Mafcatenfis, longiffimo folio tribus ordinibus fpinarum munito, vocatur. Frutex Indicus fructu aggregato conoide KAIDA dictus. *Ray Hift. pl. pag.* 1442. Kaida Taddi. *H. Malab. part.* 2. *Tab.* 1. Nana Brava *Marcgrav. pag.* 33. Pandanus verus, Pandang. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 6. *cap.* 80. qui plurimas hujus habet fpecies. WAETHAKEIYA Zeylonenfibus, hujus generis character optime exprimitur a *Linnaeo* in *Char. gen. pl. pag.* 99. ad BROMELIAM.

AN-

ANGUINA Zeylanica, minor, fructu parvo, fubrotundo, acuminato. *D. Tilly.* quo nomine a doctiffimo illo Botanico praeterito anno transmiffum fuit femen, quod vix e terra ortum nefcio quo cafu interierit.

ANONA fylveftris *Muf. Zeyl. pag.* 59. Anona *H. Amft. tom.* 1. *pag.* 133. novem Anonae fpecies defcriptas vide apud *Ray tom.* 3. *pag.* 76, 77. & *fequent. in dendrol.* an Anona Manoa *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 1. *cap.* 39? ALUGHAS haec noftra Zeylonenfibus dicitur, cujus radice utuntur tinctores ad rubellum colorem conficiendum.

ANONA fructu virefcente. *Muf. Zeyl pag.* 62. Anona Indica, pomo viridi. *Par. Bat. Pr. pag.* 312. & *Comm. Fl. Malab. p.* 5. Anona Indica, fructu conoide, viridi, fquamis veluti aculeato. *Plukn. Phyt. Tab.* 135. *Fig.* 2. & *Almag. pag.* 32. ubi variae proponuntur fpecies, nec non apud *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 203. ubi Anona maxima, foliis latis, fplendentibus, fructu maximo, viridi, conoide, tuberculis feu fpinulis innocuis afpero, cum hac maxime convenit. quae in *Hift. Jam. part.* 2. *pag.* 166. *Tab.* 225. exhibetur. Anona tuberofa, Manoa Papannatis *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 1. *cap.* 4. cujus fructus eft viridis, fquamofus. ANON incolis dicitur.

ANONA fructu rubicundiffimo. *Muf. Zeyl. pag.* 68. Anona forte foliis fubtus ferrugineis, fructu rotundo, majore, laevi, purpureo, femine nigro, partim rugofo, partim glabro. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 206. & *Hift. Jam. part.* 2. *pag.* 170. *Tab.* 229. Cainito folio fubtus aureo, fructu maliformi. *Plum. nov. pl. gener. pag.* 10. Guanabanus fructu purpureo. *Plum. Cat. pl. Amer. p.* 43. Chryfodendros Americana *Plukn. Almag. p.* 42. &c. Anonae character defcribitur a *Linnaeo in Char. pl. gen. pag.* 158.

ANONIS Afiatica, frutefcens, floribus luteis, amplis. *Tournef. inft. pag.* 409. & *Herb. Hert.* Crotalaria Afiatica, frutefcens, floribus luteis, amplis, trifolia. *H. L. B. pag.* 197. ubi icon & defcriptio. Laburnum Zeylanicum, floribus ex luteo & rubro variegatis, filiquis bullatis, *Breyn. Prodr.* 1. *pag.* 40. Ononis natrix dicta, frutefcens, Zeylanica, Laburni folio, flore luteo, fpicato, amplo. *Ejusdem Prodr.* 2. *pag.* 78. Crotalariae trifoliatae fpecies. *Muf. Zeyl. pag.* 24.

Cytifus Zeylanicus, folio Laburni, Ammanni apud *Ray. tom.* 2. *pag.* 1893. Nella-Tandale-Cotti. *H. Malab. part.* 9. *Tab.* 27. ubi in notis Genifta trifolia, Malabarica, floribus luteis amplis, filiquis bullatis. *pag.* 49. vocatur. Vide & *Fl. Malab. pag.* 33. JACBERYA Zeylonice audit. reliquas hujus fpecies ad *Crotalarias* infra vide defcriptas.

ANTISDESMA fpicis geminis. *Nobis. Tab.* 10. Berberi dumetorum baccas fimiles ferens arbor. *Herb. Herm.* Berberis fructu arbor baccifera, racemofa, foliis integris, acuminatis, fructu rotundo, monopyreno. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 170. Cum hac convenit, ut & Nuli-Tali. *H. Malab. part.* 4. *Tab.* 56. quae Berberis Indica, Aurantii folio ibidem vocatur.

Arboris noftrae lignum eft firmum, & folidum, cortice cinereo obductum, ex trunco multos emittens ramos, quibus folia adcrefcunt folitaria, alterna, fubrotunda, acuminata, integra, glabra, obfcure viridia & fplendentia, mire & eleganter cancellata: Flores gerit in fummitate ramorum fpicatos, ex duabus inprimis fpicis tenuibus, communi pedunculo provenientibus cöalitos, qui fpicae arcte adcrefcunt, & exigui admodum funt, quorum calix quinquefolius, minimus eft, ftamina habentes tria, calice longiora, apicibus ex duobus veluti globulis compofitis, poft quos baccae fequuntur Berberi dumetorum fimiles, cylindricae, a quo floribus maxime differt, unde fingulare genus conftituimus Antidesmae, ab ἀντὶ *contra* & δέσμα *venenum*, quia contra morfus ferpentis venenatiffimi Colubrade Capello dicti, fpecificum eft. Berberidis autem character occurrit apud *Linnaeum in Char. pl. gen. pag.* 94.

ANTIRRHINUM humile, anguftifolium, flofculo gemello, ex alis foliorum producto. *Nobis. Tab.* 11. Antirrhinum Zeylanicum, fylveftre, flofculo rubello, eleganti. *Herb. Hert.* Antirrhinum minus. *Muf. Zeyl. pag.* 4. Antirrhinum Indicum, purpureum, pufillum. *Muf. Zeyl. pag.* 47.

Pufilla licet haec & fylveftris, elegans tamen Antirrhini eft fpecies, quae ramofa admodum eft, ex radice cinerea, fibrofa, longa, proveniens, variis ramificationibus fefe difpergens, folia gerit caulibus ad nodos quafi collecta, femiuncialia, bina oppofita, feu inftar Perfoliatorum folia caulem arctiffime ambiunt, & quafi ex eo prorumpunt, feffilia penitus, ad quorum connexum flofculi bini ut plurimum, in initio



ANTIDESMA *spicis geminis*. Nobis.



ANTIRRHINUM humile, angustifolium flosculo gemello, ex alis foliorum producto. Nobis.



APOCYNUM flosculis fasciculatis. Nobis. APOCYNUM arborescens, Nerii flore, minus. Nobis.

initio communi pedunculo, dein gemino fuffulti progrediuntur, in oppofita autem parte plerumque ramulus florifer oritur, quatuor, fex, prout major, vel minor eft, foliis conftans, in cujus fummo flofculi parvi, perfonati, monopetali, bilabiati, labio fuperiore bifido, infe- riore trifido locantur, coloris rubelli, calice caduco aut facile mar- cefcente contenti, in fructibus enim nullum hujus veftigium relictum eft: Fructus autem eft oblongus, angulofus, in fummo quatuor corni- cula gerens, in duos loculos perpendiculariter fiffus, unde bilocu- laris eft, & repletus feminibus minutiffimis, rotundulis, nigerrimis.

APOCYNUM flofculis fafciculatis. *Nobis. Tab.* 12. *Fig.* 1. Apocynum Zeylanicum, fruticofum, mite, *Muf. Zeyl. pag.* 71. & *Herb. Hert.* Apocyni facie fruticefcens, Zeylanica. *Ray. tom.* 3. *pag.* 538. huc fpectat Apocynum fruticofum, folio oblongo, acuminato, floribus racemofis. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 89. & *hift. Jam. tom.* 1. *pag.* 18. *Tab.* 4. *Fig.* 2. KIRIWAEL Zeylonenfibus dicitur a *Kiri* quod lac notat, tota enim planta lactefcit, ut notatur in *Muf. Zeyl. pag.* 71. unde & Pfeudo-Apocynum arborefcens, erectum, non lanigerum, lacte dulci praegnans, obtufis integris foliis, Zeylanicum, KIRINDI-WALL *Hermanni* vocatur apud *Moris. tom.* 3. *pag.* 612. KIRIDI-WAEL autem in *Muf. Zeyl. pag.* 10. ubi additur. Arbor eft foliis conjugatis, fplendentibus, floribus parvis fpicatis; pronunciatur *Ki-rindiwael.* De hac vide notas ad. *H. Malab. part.* 1. *pag.* 84. Mangle Zeylanica, folio lucido venofo, in acumen producto, KIRINDI-WAEL Zeylonenfibus D. Herman apud *Ray tom.* 3. *dendrol. pag.* 116. Mangle Zeylanica foliis acuminatis; pulchre venofis. *Petiv. hort. ficc.* apud *Ray. tom.* 3. *append. pag.* 246.

Variis hifce nominibus propofita haec arbufcula caules gerit lignofos, glabros, fufcos, quibus folia adcrefcunt, brevi innixa pediculo, bina fibi invicem oppofita, oblonga, acuta, lata, glabra, venofa, parte fuperiore faturate viridia, inferiore pallefcentia, emittens ex foliorum alis longiffimos pedunculos, quibus flores brevioribus pediculis fafci- culatim adcrefcunt, in parvis quafi fafciculis collectos, vario modo per illos difperfos, flofculi autem funt oblongi, tubulati, quinque- fidi, calicibus fuis oblongis, quinquefidis contenti, coloris purpurei. Fructum non vidimus.

APOCYNUM arborefcens, Nerii flore, minus. *Nobis. Tab.* 12. *Fig.* 2.

Apocy-

Apocynum Zeylanicum arborefcens, Caryophylli, feu Armenii flore minus. *Herb. Herm.* Nerium lactefcens, Myrti Laureae folio rugofo. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 76. Apocynum Zeylanicum Jasmini flore Hermanni. *ibidem.* Apocynum minus vocatur refpectu aliorum hujus generis, quae infra ad *Neria* propofita inveniuntur, hoc autem juxta *Hermannum* hic defcripfimus, licet *Nerii* vera habenda fit fpecies. Reliquis tenerius & multo minus eft, folia enim hujus funt triplo fere minora, quam in aliis, quae funt oblonga, acuminata, Myrthi aemula, viridia utrinque. Flores gerit in fummitate ramulorum tubulofos, pentapetaloides, decem ftaminibus gaudentes, calice rotato, quinquefariam divifo, contentos, poft quos filiquae folitariae, anguftae, erectae, minimae videntur oriri, ut in figura noftra, in qua poft lapfum florem filiquae rudimentum apparet, exprimitur. Caules hujus fruticis funt rotundi, nigricantes feu obfcure purpurei, glabri, erecti, ad genicula, e quibus folia proveniunt, protuberantes. in reliquis caeterum cum infra expreffis *Neriis* haec convenit.

Apocynum Indicum, Afclepiadis facie, efculentum. *Muf. Zeyl. pag.* 17. KIRIAGHUNA Zeylonenfibus, a *Kiri* lac, & *Ghuna* fpecies. quafi diceres, fpecies certa lactis. Herba lactefcit, & in defectu lactis vaccini aut alterius fubftituitur hoc lac; folia quoque concoquuntur cum cibis, in quibus lacte opus eft, ut annotatur in *Muf. Zeyl.* unde fufpicor, quod vera fit *Afclepiadis* aut *Vincetoxici* fpecies, fi enim in aliis Apocyni fpeciebus, lac fuum praebentibus, hoc inftitui vellet, peffimum certe fortiretur eventum, quum omnes fint venenatiffimae, ut odore ipfo virofo facile detegitur.

Apocynum Indicum, repens, folio ad bafin auriculato. *Muf. Zeyl. pag.* 44. WAELKAPPU & KIRIANGHURA Zeylonenfibus.

Apocynum Indicum maximum, floribus amplis, Janthinis, obfoletis, Beideloffar Alpini, Ericu *H. Malab. Muf. Zeyl. pag.* 34. Apocynum Beideloffar. *ibidem. pag.* 27. Apocynum erectum, incanum, latifolium, Malabaricum, floribus ex albo fuave purpurafcentibus. *Par. Bat. pag.* 28. Apocynum latifolium, Ægyptium, incanum, erectum, floribus magnis, pallide violaceis. *Par. Bat. Pr. pag.* 313. Apocynum erectum, latifolium, incanum, Zeylanicum, maximum, floribus maximis, purpurafcentibus. *Hert. Catal. femin.* Apocynum erectum, majus,

majus, latifolium, Indicum, flore concavo amplo, carneo-fuave-purpurafcente. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 14. *Commel. Fl. Malab. p.* 5. *Plukn. Almag. pag.* 35. & *Morif. tom.* 3. *pag.* 609. Ericu *H. Malab. part.* 2. *Tab.* 31. *Plukn. Phyt. Tab.* 175. *Fig.* 3. *Petiv. act. Philofoph. Lond. vol.* 22. *no.* 271. *pl.* 150. Eleganter etiam haec exprimitur in *Sebae rerum natur. thef. part.* 1. *Tab.* 26. *Fig.* 1. Ericu Americana ibidem dicta. WARA & WARAGHAHA Zeylonenfibus.

Apocynum Indicum, fylveftre, inodorum, filiquofum, feminibus papposis, floribus albis, amplis. *Muf. Zeyl. pag.* 47. Apocynum erectum, incanum, latifolium, Malabaricum, floribus omnino albis. *Par. Bat. pag.* 29. Apocynum majus, Syriacum, caule viridi, flore ex albido. *Pr. Par. pag.* 139. *Commel. Fl. Malab. p.*6. Belericu *H. Malab. part.* 2. *pag.* 56. vide & *Ray. tom.* 3. *pag.* 532. IDDA Zeylonenfibus.

Apocynum Indicum, minus Nummulariae folio. *Breyn. Ephem. Germ. ann.* 4 & 5. *obfer.* 138. & apud *Ray. tom.* 3. *pag.* 533. de quo vide *Par. Bat. pag.* 38. Apocynum fcandens, Africanum, Convolvuli minoris folio, & caule hirfutis. *Plukn. Almag. pag.* 37. & *Phyt. Tab.* 137. *Fig.* 4. *Breynii* autem Figura melior eft.

ARBOR JURIGHAS dicta. *Muf. Zeyl. pag.* 5. ubi additur, hujus materies fortis ac dura, apta eft ad aedes exftruendas.

Arbor Indica, amara, nucleis Amygdali facie, *Katappas* Lufitanis, SAMANDARA Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 5.

Arbor BIMMILILA Zeylonenfibus. *Pau de Milile* Lufitanis. *Muf. Zeyl. pag.* 5. Optimum ligni genus eft ad fabricandum. dicitur a *Bim* quod humum notat, & *Milila* quod arborem praegrandem.

Arbor NAGHAS feu Ferrea dicta. *Muf. Zeyl. pag.* 7. NAGHAHA etiam vocatur, hoc eft arbor ferrea; Ferrea enim duritie eft hujus arboris materies, unde a Belgis YSERHOUT, a Lufitanis *Pao Ferreo* nuncupatur. Floribus eft rofaceis, candidis, odore mofchato, grato; qui flores odoris gratia inter alios odoratos collo geftantur a Myfticis. Folia funt bina, oppofita, longa, octo vel duodecim digitos lata, fubtus argentea; flores proveniunt ex alis foliorum cum fquammofo globulo, pediculo brevi. *Muf. Zeyl.*

Arbor farmentofa, fabifera, KALAWAEL & WALLOURODU incolis dicta. *Muf. Zeyl. pag.* 8. 21 & 24. ubi dicitur, folia habet conjugata, terna, quina, flores papilionaceos; ramis loco funium commodiffime utuntur; hujus fuccus epotus inebriat, aquae infufus pifces itidem ebrios reddit, illosque allicit, ut manibus capiantur, interdum ipfos etiam enecat: quod idem de Coculi fructibus verum eft, & expertus fum. in *Muf. Zeyl. pag.* 24. vocatur & *Pike de Bufchio.*

Arbor BOBU dicta, *Muf. Zeyl. pag.* 9. Bombu arbor Zeylanica, cujus folia tinctoribus inferviunt, *Petiv. Muf.* 39. Foliis eft ferratis, floribus fpicis parvis ad exortum foliorum provenientibus. Pronunciatur *Bombu* & *Bohum.*

Arbor Malabarica ILLA dicta, cujus cortice vefcuntur Indi, defectu foliorum Beteles. *Muf. Zeyl. pag.* 11.

Arbor ftercoraria, Zeylanica, glandifera, MAELLAHOLA dicta. *Muf. Zeyl. pag.* 13. ubi additur, foliis utuntur Cinghalenfes in acetariis, quemadmodum Europaei Lactucâ.

Arbor GHAEDUBA dicta. *Muf. Zeyl. pag.* 14. ubi dicitur, ex hujus arboris ligno fiunt carbones, ex quibus conficitur pulvis pyrius. GHAEDUMBA pronunciatur, & dicitur a glutine, quod corticis fuccus fit vifcofus ac glutinofus. Mulierculae praegnantes utuntur hoc fucco ad fanandos nodos mammarum, earumque dolores. *ibidem.*

Arbor Zeylanica, foliis fubrotundis, crenatis WAELMINDI dicta. *Muf. Zeyl. pag.* 18 & 33. ubi notatur, quod fit arbor foliis Zinyphi alternis, fed rotundioribus & latioribus, ex alis foliorum producens baccas inftar Uvae, feminibus intus magnis. *Mindi* denotat uvas. Puto autem hanc Sambuci fylveftris fpeciem effe, quum inter fambucos infra propofitos quaedam fpecies etiam fit, quae MINDI vocatur. *Wael* fylveftre notat & farmentofum.

Arbor WAELMENDYA & MAENDYA dicta. *Muf. Zeyl. pag.* 3, 5, 13 & 27. fic dicitur, quia ad arcus conficiendos commodam praebet materiam. a Lufitanis vocatur *Jacka de Mato.* fructus enim hujus edulis eft. MENDYAE variae funt fpecies & denominationes, ut patet ex *Muf. Zeyl. pag.* 13, 17 & 19. Prioris haec forte fpecies, ni eadem.

ARBOR Zeylanica, Cuminum redolens, ANKAENDA dicta. *Muf. Zeyl. pag.* 23. ubi additur. Baccae arboris Cuminum redolent, fundentes Oleum Cumini fpirituofum. *An* denotat corium vaccinum. KAENDA filum ferreum. Materies hujus arboris apud Cinghalenfes familiariffima eft ad conficienda fcamna, aliaque.

ARBOR Zeylanica, floribus odoratis, faciem humanam quodammodo referentibus. *Muf. Zeyl. pag.* 39. Arbor Zeylanica, floribus odoratis, humana facie. *ibidem. pag.* 23. MUNAMAL & MUNCHUNAMAL Zeylonenfibus. a *Muna* quod faciem humanam notat, quam quodammodo referunt. Flores gratiofum fpirant odorem, & a mulierculis coronae in modum collo ac capite geftantur, ut notatur in *Muf. Zeyl.* MANUMAL Cinghalenfium in *act. Phil. Lond. vol.* 22. *no.* 271. *pl.* 125. jungitur cum Elengi *H. Malab. part.* 1. *Tab.* 20. fed cujus flores nihil minus quam faciem humanam repraefentant.

AN ARBOR Gummi guttam fundens, GAETHAGHORAKA Zeylonenfibus dicta. *Muf. Zeyl. pag.* 23.

ARBOR Indica *Gummi Guttam* fundens, fructu dulci, rotundo, Cerafi magnitudine, CARCAPULI Acoftae. *Muf. Zeyl. pag.* 26. ubi dicitur Carcapuli Acoftae, & Linfchoti differunt flore & fructu, reliquis conveniunt, ex utraque enim fluit Gummi Gambe &c. De his vide *Ray. tom.* 2. *pag.* 1661. & notas ad *H. Malab. part.* 1. *pag.* 42. & *Amm. Char. pl. pag.* 393. CARCAPULI figura proftat *pag.* 274. apud *Acoft. edit. Venet. in quarto*, & in editione a Clufio interpretata fecunda *pag.* 296 & 297. in 8vo. defcribitur. ut & apud *Cluf. cap.* 46. cum qua convenit Arbor Cambodienfis Guttam Gambi fundens ex dicteriis Cl. Hermanni apud *Plukn. Almag. pag.* 41. & Carcapuli forte Linfchotani fructu dulci, rotundo, Cerafi magnitudine KANNA-GHORAKA, id eft Ghoraka dulcis Cinghalenfibus dicta. in *Mantiff. pag.* 20. ubi additur, quod *Caspar. Bauh. in Pinac.*: cum Carcapuli Acoftae, fructu Mali aureae aemulo perperam confuderit; ut patet ex notis ad *H. Malab. part.* 1. *pag.* 42. de qua vide *Samuel. Dale Pharmac. pag.* 438. ad CAMBOGIUM *officin.* & notas ad *Merian. infect. Surin. pag.* 20. ut & *Commel. Fl. Malab. pag.* 6. ubi Arbor Indica, quae Gummi Guttam fundit, fructu acido fulcato, aureo, mali magnitudine vocatur. vide & ad CAMBOGIUM. *p.* 17 Gummi Gutta, quae ab incolis

D 2 KAN-

KANNAKURKA vocatur. *Grimm. laborat. Ceyl. pag.* 105. ubi fic defcribitur. Arbor ifta crefcit in Territorio civitatis *Columbo.* jucundiffima eft, mediocriter alta. Folia habet rotunda, viridia, atque pinguia; Fructum profert, qui non multum diftat a Morella quoad magnitudinem, atque continet in fe quatuor tenuia femina in quodam dulci fucco, qui cum luteis venulis intermixtus eft, qui edules funt &c. Dum cortex hujus arboris percutitur, luteus ille fuccus copiofe defluit, feque ipfum pedetentim condenfat, & maturitatem fuam a fole & aëre confequitur, & tunc lubricus, atque gummofus apparet; & non fecus ac alia vulgaria operatur, &c. Unde vomitoria & purgantia in Hydropicis fummi ufus a *Grimmio* compofita, ibi porro proponuntur. Variis gaudet haec arbor apud incolas nominibus, ut patet ex *Muf. Zeyl. pag.* 26. ubi KANNAWAKORAKA. KAEPNAYKORAKA. GHOKATHU, GHORAKA & KANNAKORAKA vocatur.

Arbor KAEKURIAGHAHA odorata, ex qua fluit *Gumm. Elemi. Muf. Zeyl. pag.* 52. huc pertinet *Paeru H. Malab. part.* 4. *Tab.* 15. ubi *pag.* 35. vide notas. Prunifera, forte Fago fimilis arbor, *Gummi Elemi* fundens, figura & magnitudine olivae ex infula Barbadenfi. *Plukn. Phyt. Tab.* 217. *Fig.* 4. Arbor, quae nobis *Gummi Elemi* exhibet, KAKUNA-GHAHA incolis dicta. GRIMM. *labor. Ceyl. pag.* 108. ubi haec habet: Tantum Gummi nobis praebet haec arbor, quantum neceffitas noftra poftulat. Maximi ufus eft in Chirurgia, quoad Emplaftra, Unguenta, & Linimenta. Cortex iftius arboris multum pinguedinis habet, & valde terebinthinus eft quoad odorem. Decoctus autem in oleo communi optimum praebet Balfamum ad ulcera carnofa & ad Linimenta. Conditur etiam, ut Emplaftris immifceatur ad contufiones, fracturas, dislocationes & plures alias infirmitates. *Grimm.*

Arbor Zeylanica ITTA dicta, refinam *Terebinthinae* fimilem fundens. *Muf. Zeyl. pag.* 50. vocatur etiam ITTAWAEL. *ibidem.*

Arbor baccifera, aromatica, Zeylanica PEROMALLA dicta. *Muf. Petiv. no.* 36.

Arbor Zeylanica, fylveftris, odore Rorismarini KARAPIDSCHA dicta. *Muf. Zeyl. pag.* 50 & 61.

Arbor

ARBOR MINDAELA & SAMMATRAPALAM incolis dicta. *Muf. Zeyl. pag.* 24. Folia habet maxima, fructus dependent pedales, fert glandes. *ibidem.*

ARBOR foliis Androfaemi latioribus, plurimas baccas in fummitate ramulorum ferens. *Muf. Zeyl. pag.* 24.

ARBOR foliis craffis, fubrotundis, capfula Euonymi. *Muf. Zeyl. pag.* 25.

ARBOR foliis latis, fubrotundis, venofis, fubtus glaucis, fpicis longis. *Muf. Zeyl. pag.* 27.

ARBOR foliis rotundis, fubtus incanis, trinerviis, flofculis parvis ad foliorum exortum. *Muf. Zeyl. pag.* 31.

ARBOR Zeylanica, fpinofa, foliis tribus nervis notatis. *Muf. Zeyl. pag.* 36.

ARBOR Zeylanica, folio Caryophylli barbati. *Muf. Zeyl. pag.* 35. Flores funt in fummitatibus Origani Virginiani inftar, aut Valerianae Indicae.

ARBOR Zeylanica MANIGLIA dicta, latifolia. *Muf. Zeyl. pag.* 35.

ARBOR Zeylanica MANIGLIA dicta, anguftifolia. *ibidem.*

ARBOR procera, cujus fructus edules ab incolis KATILIPPU vocantur. *Muf. Zeyl. pag.* 39.

ARBOR KODALIMURISCHA dicta. *Muf. Zeyl. pag.* 39. ubi additur, arboris hujus materies tanta eft duritie, ut vix ferrum admittat, quod & ejus nomen notat, id eft ferrum frangens.

ARBOR Zeylanica, religiofa, foliis perpetuo mobilibus. Arbor Daemonum Belgis. *Muf. Zeyl. pag.* 42. BOGHAS, BUDUGHAHA & BUDUGHAS incolis dicitur. *Buddu* nomen eft illius Prophetae, qui primus fub hujus arboris grata umbra docuit Cinghalos, unde & hodie hanc arborem venerantur celebrando fua facrificia in altari fub hac arbore exftructo. *Muf. Zeyl.*

ARBOR exitiofa, marina, lactefcens, Indica, TAKKADA vocata, fructu cerafi magnitudine, incarnato, ftriato, Bellamodagam. *H. Ma-*

lab. *Muf. Zeyl. pag.* 45. Takkada frutex Zeylonenfium, forte Bella-modagam *H. Malab. part.* 4. *Tab.* 59. apud *Plukn. Almag. pag.* 361. Prunifera Indica, fructu umbilicato, fulcato, Groffulariae fimili. *Ray. hift. pl. pag.* 1481. vide & *Amm. Char. plant. pag.* 290. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 56.

Arbor Indica, Anagyridis effigie, antifebrilis, ÆHAELA dicta. *Muf. Zeyl. pag.* 48.

Arbor Zeylanica, fructu acidulo GODHAPARA dicta. *Muf. Zeyl. pag.* 49. ubi additur; Cinghali loco faponis utuntur ejus fucco.

Arbor DANGHA dicta. *Muf. Zeyl. pag.* 50. ubi notatur, quod hujus fructus, dum adhuc tenelli funt, comedantur loco foliorum Beteles.

Arbor TALANGHAHA dicta. *Muf. Zeyl. pag.* 49. ubi haec fequuntur. Ex hoc ligno fiunt trabes convexae, feu rates, cum quibus flumina & mare tranfcurrere conantur Cinghali. TALANGHAHA hoc eft arbor TALAN. *Talana* notat trabem.

Arbor MAKULU & MAKULUGHAHA dicta. *Muf. Zeyl. pag.* 50. ubi notatur, quod fructus comefti ebrietatem inducant, & avide devorentur a pifcibus *Lellu* & *Pethijo* dictis, alias fatis delicatus. Eo vero tempore, quo fructus *Makuli* maturefcunt, tales pifces nequaquam comeduntur ob vomitus, aliaque fymptomata, quae ab efu horum pifcium caufantur. *Makulu* notat cinerem, quo fructus maturi funt adfperfi; alias nomine *Makuli* venit Tabaxir in arundine fpinofa, Indica, arborefcente, KUA dicta. *Muf. Zeyl.*

Arbor Fraxini folio, flore albo, WALKOHOMBA dicta. *Muf. Zeyl. pag.* 55.

Arbor Malabarica, flofculis Jasmini odore & forma, FOGLIO BURDOS vocatis. *Muf. Zeyl. pag.* 55.

Arbor ex Malabara, fructu, Caryophylli effigie, inodoro. *Muf. Zeyl. pag.* 57.

Arbor Zeylanica, fructibus niveis, dulcibus, ovis formicarum fimilibus. *Muf. Zeyl. pag.* 64.

Arbor

Arbor procera HAPUGHAHA dicta, floribus oblongis, luteis; odoratis. *Champacca* Malabaris, *Pau Fule* Lufitanis. *Muf. Zeyl. pag.* 64. Tsjampacca Indorum, five arbor Uvifera Indica, foliis Lauri Americanae. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 101. Uvifera arbor Orientalis folio oblongo. *Par. Bat. Pr. pag.* 385. *Commel. Fl. Malab. pag.* 70. Flos Indicus CHAMPACEA dictus. *Bontii. lib.* 6. *cap.* 45. *pag.* 190. *Commel. Fl. Malab. p.* 29. Sampacca, Tsjampacca, Bonga Sjampacca. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 3. *cap.* 21. ubi fylveftris, montana, & alba defcribuntur. Champacca Philippens. flore ac fructu ftellato. *Petiv. Gazoph. Tab.* 24. *Fig.* 1. Champacae defcriptio proftat in *Ray tom.* 3. *append.* Inter plantas a Camello obfervatas *pag.* 83. *no.* 2. vide & *Amm. H. Bofian. pag.* 38. qui eam pro Champaca *H. Malab. part.* 1. *Tab.* 19. habet. Ex floribus hujus arboris aqua deftillatur odorata, Lignum infervit vaginis conficiendis. *Muf. Zeyl. pag.* 64.

Arbor HINKINDAMAL dicta. *Muf. Zeyl. pag.* 64. dicunt arborem hanc emori, fi homines vilioris fortis flores ejus decerpant.

Arbor trifoliata WALUNDUGHAHA dicta. *Muf. Zeyl. pag.* 67.

Arbor Solis, Indica, foliis orbiculatis BATHAENDA dicta. *Muf. Zeyl. pag.* 68. *Bat* Oryzam denotat. *Haenda* cochlear, folia enim Cinghalenfibus inferviunt pro orbe feu cochleari, ex quo Oryzam coctam comedunt. *Muf. Zeyl.*

Arbor Zeylanica, Cotini foliis fubtus lanugine villofis, floribus albis, Cuculi modo laciniatis. *Plukn. Phyt. Tab.* 241. *Fig.* 4. ejus defcriptio habetur apud *Ray tom.* 3. *pag.* 124. *Dendrol.*

Arbor BOLANGA dicta. *Grimm. labor. Ceyl. pag.* 85. ubi fic defcribitur: Ingens arbor eft, rotundos fructus ferens cum duro putamine; intus continet acidulum liquorem, vel pulpam feminibus plenam. &c. Unde Rob fit in fluxibus ventris optimum. Quippe quod refrigerat, & optime vifcera laxata corroborat. Folia hujus arboris funt balfamica, & convenientiffima pro infufionibus & Clyfteribus ad ventris fluxus. Nafcitur adhuc ex hac arbore gummi, quod easdem virtutes habet ac Gummi Arabicum. Vide infra *Cydonia*.

Arbor

ARBOR triſtis. *Grimm. labor. Ceyl. pag.* 116. ubi haec habet: Ipſius flores aquam nobis praebent valde odoriferam, quae Cordialis, & refrigerans eſt, atque oculorum inflammationibus optime prodeſt. Arboro Triſto *Acoſtae* in *edit. Italic. pag.* 168. Figura exhibetur cum deſcriptione, quae a *Pluknetio in Almag. pag.* 46. cum Arbore triſti Myrto ſimili *C. B. P. pag.* 469. jungitur & convenit cum Manjapumeram *H. Malab. part.* 1. *Fig.* 21. ubi vide notas & *Fl. Malab. pag.* 8. & *Clus. lib.* 2. *cap.* 10. De arbore triſti. & *Acoſt.* apud *Clus. cap.* 37.

ARBUSCULA folio pyri, fructibus oblongis, lapideis, MALIKIRA dicta. *Muſ. Zeyl. pag.* 9. ubi additur; Silvis Colombenſibus eſt familiariſſima: & hanc habeo ex Jamaica foliis inſtar Pyri, fructibus quatuor, in eodem pericarpio, ni fallor, aperto.

ARBUSCULA Zeylanica, floſculis niveis, ovalibus; *Muſ. Zeyl. pag.* 58.

ARBUSCULA Zeylanica, tricapſularis, & tricoccos, KEEMBYA dicta. *Muſ. Zeyl. pag.* 69. an Frutex baccifer, Indicus, ſpinoſus, trifolius, floribus ſpicatis, fructu plano, rotundo, tricocco. *Ray. hiſt. pl. pag.* 1612. *Plukn. Phyt. Tab.* 95. *Fig.* 5. quae eſt Kaka-Toddaly *H. Malab. part.* 5. *Tab.* 41. & convenit cum *Chamaelaea* infra deſcripta & depicta.

ARBUSCULA Zeylanica, Aceris folio baccifera, foliis e directo magis anguloſis. *Plukn. Phyt. Tab.* 14. *Fig.* 3. Arbuscula Zeylanica, Aceris folio baccifera, Hermanni apud *Ray. hiſt. pl. pag.* 1801. & *tom.* 3. *dendr. pag.* 93.

ARECA Puwak, ſeu Arekeri Puwakwalla dicta. *Muſ. Zeyl. pag.* 70.

ARISTOLOCHIA longa, Indica, aromatica, odorata, *Muſ. Zeyl. pag.* 9. Ariſtolochia Clematitis Indica, odorata. *Parad. Bat. Pr. append. Commel. Fl. Malab. pag.* 9. Carelu-Vagon. *H. Malab. part.* 8. *Tab.* 25. Ariſtolochia Clematitis Indica, flore albicante, fructu majore *ibidem in notis*. Interrogatur a *Pluknetio*, an Ariſtolochia Clematitis Gangetica, foliis in aculeum abeuntibus, radice odoratiſſima, huic ſit eadem *in Almag. pag.* 49. quod ex ejus figura comparata cum illa *H. Malab.* non conſtat, quum multum differant: ab ipſo autem exhibetur in *Phytogr. Tab.* 69. *Fig.* 5. ubi inſcribitur Volubilis Gangetica, ſapore acri



ARO-ORCHIS tuberosa, platyphyllos. Nobis.

ASPARAGUS foliis falcatis, ex uno puncto numerosis. Nobis.

acri & aromatico. SASCANDA Zeylonenfibus dicitur a Luna *Sanda* vocata, quia plantae hujus radix plenilunio plurimis pollet viridibus, ut notatur in *Muf. Zeyl. pag.* 9. Ariftolochia longa SACKSANDA dicta. *Grimm. Labor. Ceyl. pag.* 121. ubi fic defcribitur: Eft planta furfum fe attollens. Radix eft intus lignofa, fed cortex eft valde aromaticus & magnam virtutem in fe continet, tam pro Medicina, quam pro Chirurgia. *Cinghalenfes* eam plurimi aeftimant, eamque cum Theriaca fua commifcent, quae contra morbos venenatos affumitur. Semen cum radice deftillatum, praeftantiffimum praebet oleum, quod valde aromaticum eft, viresque fuas fpecialiter demonftrat in morbis Matricis ex obftructione provenientibus. Ex hinc Sal volatile oleofum componitur, cujus efficacia tanta eft, ut artis amatoribus commendari mereatur.

ARISTOLOCHIA Zeylanica, flore atro-purpureo. *Hert.* in Catalogo feminum quondam transmifforum. An Ariftolochia fcandens, odoratiffima, floris labello purpureo, &c? *Sloan. Catal. Pl. Jam. pag.* 60. & *Hift. Jam. pag.* 162. *Tab.* 104. *Fig.* 1.

ARISTOLOCHIA Zeylanica, Biftortae folio breviori. D. SCHERARD. apud *Ray. tom.* 3. *pag.* 393. ubi additur, e lata bafi folium in mucronem acutum exit.

ARO-ORCHIS tuberofa, platyphyllos. *Nobis. Tab.* 13. *Fig.* 1. Arum Zeylanicum, radiculis Carlinam fapientibus, loco piftilli, florem in involucro gerens flavum. *Herb. Herm.* Colchicum Indicum, platyphyllum, radice tuberofa, Carlinae odore & fapore, flore albo, & idem flore incarnato. *Muf. Zeyl. pag.* 54. quae convenit cum Wanhom *Kaemph. Amoenit. exot. pag.* 901. ubi ample defcribitur, & ejus icon exftat. quae eft Katsjula Kelengu. *H. Malab. part.* 13. *Tab.* 41. & Calceolus Philippenfis, pumila, Plantaginis folio, radice Alexipharmaca. *Petiv. Gazophyl. natur. & artis. Tab.* 19. *Fig.* 7. HINGUNIPYALI Zeylonenfibus audit.

Pofteriores tres citatae plantae, licet folia habeant in Figuris fuis rotundiora quam noftrae, eaedem tamen cum noftra planta funt, cujus folium hic exhibetur, quod florem ipfum complectitur & eft oblongum, fenfim attenuatum, planum, in longum mucronem terminatum. Bafis autem ejus magis contracta, ubi florem ambire videtur, ad unciale

fere ſpatium, glabrum, latum, laete virens, paulo flaveſcens. Flos autem, qui in aliis Figuris ruditer, hic exactiſſime delineatus eſt, habet petala quinque obtuſe ovata; Nectarium ad unum latus inter hiatum petalorum ab altero latere ſpatium vacuum replet: Conſtat labio ſuperiore galeato petalis breviore; lateralia autem ſunt emarginata, quae laciniae ſunt floris. Labium inferius lambdoideum ungue anguſto petalis longius eſt. Unde ad Orchides proxime pertinet; quum autem flos à folio, ut videtur, amplectatur, & illud folium Ari folio reliquum florem ambienti maxime conveniat; ARO-ORCHIS planta haec convenienter vocatur.

ARUM Zeylanicum, maximum, ſpinoſum, radice longa, repente. *Muſ. Zeyl. pag.* 56 & 64. Arum Zeylanicum, ſpinoſum, Sagittae foliis. *Par. Bat. pag.* 75. ubi deſcriptio. KOHI WILA Zeylonenſibus. de Aro *Grimm. in Laborat. Ceyl. pag.* 125. haec habet: apud nos extraordinarie magnum eſt; Conficiunt ex eo farinam incolae; quae plurimum eos juvat, hinc habemus etiam noſtrum Faecul Aronis.

ARUM Zeylanicum, minus, Sagittariae folio. *Par. Bat. Pr. pag.* 315. *Commel. Fl. Malab. pag.* 9. Arum minus, Sagittariae folio ex inſula Barbados. *Plukn. Phyt. Tab.* 149. *Fig.* 2. Vide & *Sloan. Catal. pl. Jam. pag.* 63. Nelenſchena major. *H. Malab. part.* 11. *Tab.* 20. Dracunculus forte Ambonicus Anappur. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 8. *cap.* 88.

ARUM humile, Ceylanicum, latifolium, piſtillo coccineo. *H. Amſt. part.* 1. *Fig.* 51. *pag.* 97. Arum humile, Ariſarum dictum, latifolium, Ceylonicum, piſtillo longiſſimo, miniato colore. *H. Med. Amſt. Catal. pag.* 36. ubi cum Nelenſchena *H. Malab. part.* 13. nondum edit. jungitur. vide & *Fl. Malab. pag.* 9. ubi Ariſarum Indicum petraeum, humile, piſtillo rubro adhaerente, granulis purpuraſcentibus *Commelini in notis ad H. Malab. part.* 11. *pag.* 33. vocatur. An Ariſarum eſculentum Daun-Caſſiſe? *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 8. *cap.* 87.

ARUM maximum, Zeylanicum, macrorhizon. *Par. Bat. pag.* 73. ubi Figura & deſcriptio. Arum Zeylanicum, maximum, flore odorato. *Muſ. Zeyl. pag.* 63. Arum maximum, Zeylanicum, flore Moſchum redolente. *Amm. Char. pl. pag.* 345. Arum maximum, Zeylanicum, foliis

foliis nervosis. *Par. Bat. Pr. pag.* 314. & *Muf. Zeyl. pag.* 71. HA-BARA & HABARALA. Zeylonenfibus. Ari Indici fativi, & fylve-ftris defcriptio eft apud *Rumph. in Herb. Ambon. lib.* 8. *cap.* 81 & 82.

ARUNDO farmentofa, Indica, baccifera, foliis in extremo capreolatis. *Muf. Zeyl. pag.* 6. Frutex Indicus, fcandens, foliis Mendoni inftar in capreolum definentibus, fructu parvo coronato. *Plukn. Amalth. pag.* 101. Panambol-Valli *H. Malab. part.* 7. *Tab.* 53. GHOIGIWAEL Zeylonenfibus, quod pronunciatur GHOIWAEL. *Ghoigi pali* notat commodum lignum. *Wael* vimen.

ARUNDO Zeylanica, farcta, odore & fapore Calami Aromatici. PEN-GRIMAN Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 26. an Arundo farcta, Tubu Sala? *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 6. *cap.* 10. Arundo Indica, odo-rata. *Grimm. Laborat. Ceyl. pag.* 120. ubi haec habet: a parte infe-riori eft arundinacea, & a fuperiori veluti Gramen. Radix fatis eft dura, dum fcinditur, inftar ligni finditur, valde odorifera eft, con-venit aliquibus modis cum *Calamo.* in membra pariter divifa eft, no-dofa, & fatis abundanter circa civitatem noftram *Columbo* crefcit. Calefaciens eft, incidens, aperiens, & diffipans. Per deftillationem pulchrum oleum exhibet, quod in parva dofi totius plantae virtutes continet, ftomachum confortat, concoctionem adjuvat, quae ex fri-gidis, vifcofis & putridis humoribus impeditur. Optimum eft ad men-ftruorum obftructiones, eaque expulfat: Parem habet aqua virtutem. aptiffima haec planta eft ad Balnea & Thermas in *Beriberi* & in mor-bis fupra dictis.

ARUNDO Indica, arborea, maxima, cortice fpinofo, Tabaxir fundens. *Muf. Zeyl. pag.* 46. Arundo arbor. *C. B. P. pag.* 18. Mambu *Pifonis Mantiff. aromat. cap.* 10. *pag.* 186. Bambu Belgis *Muf. Zeyl. pag.* 96. Ily *H. Malab. part.* 1. *Tab.* 16. Arundo Indica, arborea, maxima, cortice fpinofo. Hermanni *ibidem in notis*, quas porro vide *pag.* 26. & *Fl. Malab. Commel. pag.* 10. Arundo Tabaxifera *Offic. Samuel. Dale. Pharmac. fupplem. pag.* 251. De Tabaxir humore vide *Cluf. aro-mat. hift. lib.* 1. *cap.* 12. & *Acoft. arom. lib. cap.* 6. Canna ingens *Mam-bu* vel *Bambu* dicta *Parkin. Theat. pag.* 1630. Arundo arborea Mambu, vel Bambu dicta. *Plukn. Almag. pag.* 53. ubi vide reliqua & *Ray tom.* 2. *pag.* 1315. UNAGHAS Zeylonenfibus dicitur, id eft arbor febrilis.

Cinghali enim afferunt illos febri corripi, qui fe in aquis lavant, in quas arboris flores decidêre. Crefcunt ut plurimum ad fluminum ripas, florent Martio, & Majo. *Muf. Zeyl.*

ARUNDO *Rotang* Zeylanica, fpinofiffima, major, fructibus rotundis, fcabris, acidis. *Muf. Zeyl. pag.* 59. Arundo nucifera, *Rotang* dicta, fructu fpadicei coloris, ftriis purpureis venufte teffulato. *Plukn. Almag. pag.* 53. ubi reliqua vide fynonyma, defcriptionem vero apud *Ray hift. pl. pag.* 1316. & *Pifonem in Mantiff. aromat. cap.* 11. *pag.* 188. hujus variae apud *Rumph. in Herbar. Ambon.* occurrunt fpecies *in lib.* 7. *a cap* 56. ad 61. ut Palmyuncus albus ROTTANG Puti, & verus latifolius ROTTANG Tumi Daun, & ROTTANG Tumi &c.

ASCLEPIAS Zeylanica, Vincetoxici radice praeftantiore. *Muf. Zeyl. pag.* 52. Apocynum Zeylanicum, fcandens, foliis Laurinis. *Par. Bat. Pr. pag.* 413. Apocynum Zeylanicum, fcandens, radice Afclepiadis. *Par. Bat. pag.* 55. ubi defcriptio, ut & apud *Ray tom.* 3. *pag.* 539. MANUGHAWAEL Zeylonenfibus. Phthificis has radices multum prodeffe a Cinghalis edocti fumus, unde Syrupis, & Decoctis expectorantibus adhibetur. *Muf. Zeyl.*

ASCLEPIAS hirfuta, Scammonii folio. *Nobis.* Apocynum fcandens Zeylanicum, Scammonii folio hirfutum. *Par. Bat. pag.* 56. ubi defcriptio, & ex hac apud *Ray tom.* 3. *pag.* 539. Apocynum hirfutum fcandens Americanum, flore amplo purpureo. *Plukn. Phyt. Tab.* 76. *Fig.* 5. Characterem genericum vide apud *Linnaeum in char. plant. pag.* 64.

ASCLEPIAS Zeylanica, inodora, WALANGHUNA Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 53. Afclepias Zeylanica, flore oblongo, tubulofo. *Hert. in Catal. femin.*

ASPARAGUS foliis falcatis, ex uno puncto numerofis. *Nobis. Tab.* 13. *Fig.* 2. Afparagus foliis falcatis, Zeylanicus. *D. Scherard.* Corruda Guinenfis, foliis aduncis. *Muf. Petiv. no.* 169. apud *Ray tom.* 3. *pag.* 359. Afparagus Africanus tenuifolius, viminalibus virgis, foliis Laricis inftar ex uno puncto numerofis, ftellatim difpofitis. *Herb. Hert.* & *Plukn. Amalth. pag.* 40. Hujus autem folia funt multo anguftiora, crebriora, & tenuiffima.

Caulis



ASTRAGALUS *spicatus, siliquis pendulis hirsutis, foliis sericeis. Nobis.*

Caulis noſtrae plantae eſt bipedalis, filiformis, laevis, cinereus, ad latera alternatim emittens ramulos fere ſpithamales obtuſos, quorum apici folia inſident linearis latitudinis, longitudinis biuncialis, integra, obtuſa, interdum leniter falcata, glabra: folia haec etiam ex caule & ramulis plurima ſimul emergunt; ad ramulos hoſce prorumpunt etiam tenuiſſimi Corymbi capillacei, flores ſuſtinentes campaniformes. Ad exortum autem ramulorum ſub baſi excreſcunt aculei minutiſſimi rigidi, acuti: hujus generis character invenitur apud *Linnaeum in char. gen. pl. p.* 93.

ASPARAGUS aculeatus, Zeylanicus, maximus, ſarmentoſus, *H. L. B. pag.* 62. ubi deſcriptio & icon plantae, & in *append. pag.* 650. ejus radices exprimuntur, vide & *Ray tom.* 2. *pag.* 1877. pro Schada-Veli-Kelangu *H. Malab. part.* 10. *Tab.* 10. a *Commelino* habetur, quod in *Ray tom.* 3. *pag.* 359. contradicitur. Corruda Zeylanica, Paeoniae radiculis Tanne-Mutanea Tunga Malabaris. *Petiv. act. phil. Lond. vol.* 22. *no.* 267. *pl.* 87. HATANARYA Zeylonenſibus dicitur, a quibus radiculae hujus plantae muria conditae avide comeduntur, ut notatur in *Muſ. Zeyl. pag.* 2 & 27.

ASPHODELUS Zeylanicus, foliis rotundis, Cepaceis, floribus luteis. *D. Tilly. H. Piſan. pag.* 17.

ASTER Zeylanicus, flore coeruleo, Tithymali foliis anguſtis, pubeſcentibus, diſco luteo, petalis reflexis. *D. Tilly. H. Piſan. pag.* 18.

ASTRAGALUS ſpicatus, ſiliquis pendulis hirſutis, foliis ſericeis. *Nobis. Tab.* 14. Aſtragalus Indicus, ſpicatus, ſiliquis copioſis, deorſum ſpectantibus, non falcatis, ſeu Polylobos. *Herb. Herm.* quo nomine ab ipſo *Hermanno* quondam etiam ex Zeylona ad *Joannem Commelinum* fuit transmiſſa, ut patet ex ejus notis ad *H. Malab. part.* 9. *pag.* 55. ubi eadem denominatio occurrit, quae *Hermanni* manu ad noſtram plantam eſt adſcripta, juxta quam Figuram hic exhibemus, quae in multis tamen differt a Katu Tagera *H. Malab. part.* 9. *Tab.* 30. eaſdem tamen eſſe certus ſum, ſed in *H. Malab.* plantam haud fideliter eſſe exſculptam ex deſcriptione facile conſtat, ubi inter alia dicitur, quod undique pilis ſit obſeſſa, caulis, folia, calix & ſiliquae, quum planta tota glabra ſit exſculpta, exceptis ſiliquis, quarum ſpicae etiam

ad dimidium funt mutilatae, ita ut Figura illa fit manca & defcriptioni neutiquam conveniens; hic vero damus plantam exactiffime delineatam & exfculptam, quae ab aliis etiam denominata eft. & a *Pluknetio* vocatur Aftragalus Indicus fpicatus, polylobos D. Hermans. in *Almag. pag.* 60. & Colutea Orientalis, plerumque heptaphyllos, hirfuta, floribus fpicatis, faturate purpureis, filiquis plurimis quadratis, valde pilofis, fummo furculorum dependentibus. *ibidem pag.* 113. Colutea lanuginofa, floribus parvis, filiquis pilofis, deorfum tendentibus. *Muf. Petiv. no.* 45. *Transact. Angl. vol.* 19. *num.* 232. *Pl.* 19. Orobus Zeylanicus, incanus, filiquis pendentibus, torofis. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 80. Vide & *Ray tom.* 3. *pag.* 455. PILAEGHAS Zeylonenfibus, quod in *Muf. Zeyl.* variis denominationibus additur. occurrit enim cum hoc Aftragalus Zeylanicus purpureus fpicatus, elegans. *Muf. Zeyl. pag.* 33. Aftragalus Zeylanicus fericans, filiquis oblongis, floribus purpureis aut carneis, *ibidem. pag.* 34. Aftragalus Indicus filiquis fufcis. *pag.* 43. & Aftragalus Indicus hirfutus, filiquis (non) falcatis fericeis, villofis, major, polylobos. *pag.* 44. quae cum hac noftra conveniunt planta, quae frutefcens videtur, caules enim ejus funt lignofi, validi, duri, ruffefcentes, pilis undique obfeffi ad fummum longiffimis, ubi e caule adfurgit rachis foliorum alternus, feptem habens folia, bina fibi mutuo oppofita, tria paria, claudente uno impari. Folia autem funt mollia, fuperiore viridia, inferiore parte incana & fericea, ab utraque vero tota lanuginofa, fubrotunda. E caule ubi foliorum rachis provenit, erigitur fpica longiffima fpithamalis fere, floribus numerofiffimis papilionaceis, feparatis, binis utcunque oppofitis onufta, qui calice longiffimo & hirfutiffimo continentur, poft quos fequuntur filiquae quadratae valde pilofae, pendulae, in apicem acutiffimum definentes, repletae feminibus parvis oblongis, albicantibus.

Siliquae hujus plantae videntur mihi unicapfulares, tenues, unde potius ad Galegam pertineret, quum Aftragali filiqua fit bicapfularis.

Astragalus Indicus, hirfutus, filiquis falcatis, Viciae facie. *Muf. Zeyl. pag.* 6. Aftragalus Zeylanicus, filiquis falcatis villofis. *ibidem pag.* 31. Aftragalus Indicus filiquis falcatis fericeis, foliis Viciae facie. *pag.* 64. Orobus fylvaticus Zeylanicus filiquis erectis, foliis fericeis candicantibus, PILAE Zeylonenfibus. D. Hermans, apud *Ray tom.* 3. *pag.* 450. quae eadem videtur cum Colutea filiquofa enneaphylla Indiae Orientalis,

talis, filiquis & foliis averfa parte pubefcentibus. *Plukn. Phyt. Tab.* 166. *Fig.* 3. PILAEGHAS & PILAEHARAL Zeylon. id eft *Pilae* arborefcens.

Astragalus minimus, repens, triphyllus, filiquis falcatis. *Muf. Zeyl. pag.* 33. An Colutea filiquofa, glabra, ternis, quinisve foliis, Madé-rasp. femine rubello? *Plukn. Phyt. Tab.* 166. *Fig.* 1.

Astragalus Zeylanicus, tenellus, Viciae foliis fubrotundis, *Muf. Zeyl. pag.* 34. Viciae arborefcentis fpecies. *Muf. Zeyl. pag.* 12 & 13. PILAE & PILAEGHAS Zeyl. quod harum fpecierum nomen genericum eft.

Astragalus Zeylanicus Asparagum olens, HAMPILLA Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 68.

AURANTIUM quae malus Aurantia, regia, dulcis, Zeylanica. *Muf. Zeyl. pag.* 68. Aurantia in Indiae infula Zeilan, cortice fuavi, & dulci. *Scalig. & Lugd. C. B. P. pag.* 437. Malus Aurantia Sinenfis. *Jonft. Dendr. Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 211. Aurantium Sinenfe, Sinefe ap-pels, Lemon manis Tsjina. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 2. *cap.* 42.

Aurantium, quae malus Aurantia Zeylanica, foliis longis anguftis, ap-pendicula longiffima donatis. *Breyn. Fafcic.* apud *Ray tom.* 3. *pag.* 80. *Dendrol.*

Aurantium, quae malus Aurantia Indica, fructu omnium maximo *Pum-pelmus* dicto, medulla pallefcente. *H. L. Bat. pag.* 405. eadem quoque eft medulla ruffefcente. *ibidem.* de qua vide notas ad *Merian. infect. Su-rin. pag.* 29. ubi etiam elegans hujus arboris ramus cum fructu expri-mitur. Malus Aurantia utriusque Indiae, fructu omnium maximo & fuaviffimo &c. *Pluknet. Almag. pag.* 239. ubi de hoc fructu varii ci-tantur auctores, & in ejus *Mantiffa* pro Arbore fcientiae, cujus fru-ctus erat Malum, in Paradifo terreftri primis parentibus interdictum proponitur, *pag.* 125. & pro pomo Adami *Casp.* & *Joh. Bauh.* in *ejus Amalth. pag.* 141. habetur, ubi vide reliqua, a *Joh. Bauh.* ejus icon datur in *hift. pl. part.* 1. *pag.* 99. Malus Aurantia fructu rotundo maxi-mo pallefcente, humanum caput excedente. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 212. & *Hift. Jam. vol.* 1. *pag.* 41. *Tab.* 112. *Fig.* 2 & 3. & *Ray. tom.* 3. *pag.* 80. *Dendr.* Limio decumanus, Pompelmoes, Lemon Cas-fomba. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 2. *cap.* 34.

AZE-

AZEDARACH fructu polypyreno, *Mangoferos* fylveftris. *Muf. Zeyl. pag.* 3. Azedarach Indica foliis non deciduis, officulo polypyreno. *Par. Bat. Pr. pag.* 316. Azedarach floribus albis femper virens. *H. L. App. pag.* 652. Azadarichta Indica, foliis ramofis minoribus, flore albo, fubcoeruleo, purpurafcente majore *Breyn Prodr.* 2. *pag.* 21. & *H. Amft. tom.* 1. *Fig.* 76. Olea Malabarica Nimbo dicta, fructu racemofo oblongo. *Ray. tom.* 2. *pag.* 1545. Olea Malabarica fraxineo folio e Maderaspatan. *Plukn. Phyt. Tab.* 257. *Fig.* 1. Arbor Indica, Fraxino fimilis, oleae fructu *C. B. P. pag.* 416. reliqua vide in *Commel. Flor. Malab. pag.* 11. qui cum Aria Bepou. *H. Malab.* & Azadirachta Indica foliis Fraxini non ramofis hanc jungit. PANUKOHUMBA Zeylonice a *Panu*, quod vermiculum feu infectum denotat, nam arboris lignum a vermibus arroditur. *Muf. Zeyl. pag.* 3.

Azedarach. *Dod. Pempt. pag.* 848. Arbor Fraxini foliis, flore coeruleo. *C. B. P. Muf. Zeyl. pag.* 67. Arbor Azadarichta Syriaca, foliis ramofis, flore coeruleo & albo majore, *Breyn Prodr.* 1. *pag.* 3. & Azadarichta foliis ramofis majoribus, Syriaca, five vulgaris flore coeruleo majore. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 21. Vide & *Amm. Char. pl. pag.* 282. Pfeudo-Scyomorus. *H. Eyft. Æftiv. arbor & Frut. Fol.* 2. *Fig.* 1. &c. KIRIKOHOMBA Zeylonenfibus.

Azedarach foliis falcato ferratis. *Nobis. Tab.* 15. Azedarach altera foliis femilunatis. *Muf. Zeyl. pag.* 48. Azedarach Zeylanica, femper-virens & florens, floribus albis. *Herb. Hert.* Arbor Azadarichta Indica foliis non ramofis, flore minore. *Breyn. Prodr.* 1. *pag.* 3. & Azadarichta Indica foliis Fraxini, five non ramofis majoribus, flore minore albo. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 21. qui eam recte pro Aria-Bepou *H. Malab. part.* 4. *Tab.* 52. habet. ita ut alii errent, qui primam citatam Azedarachtam fructu polypyreno cum Aria Bepou conjungant, quod fola *H. Malab.* tabulae infpectione, & cum *H. Amft. Fig.* 76. comparatione facile conftat, quae certe inter fe nullam habent convenientiam, ut foliatura ftatim demonftrat, fi vero noftra Figura cum illa *H. Malab.* comparetur, convenientia ipfa & fimilitudo patet, quod infuper defcriptio in *H. Malab.* cum noftra comparata evincit, quae in omnibus noftrae tam bene convenit, ut ne ovum ovo magis, unde alteram defcriptionem hic fubjungere fupervacuum eft. Unum autem illud notatum volo, quod femilunaris & irregularis illa dimidii foliorum

figura



AZEDARACH *foliis falcato serratis. Nobis.*





BALSAMINA *latifolia floris calcari longissimo. Nobis.*

BALSAMINA *angustifolia, floribus ternis communi. &c.*

figura in *noſtra Tabula* felicius ſit expreſſa, & obſervata, quam in *illa Horti Malabarici*, & quod ramorum extremum in noſtra planta non inpar claudat, ut in *Breyn. Prodr.* 1. exhibetur. hujus generis characterem dat *Linnaeus in char. pl. gen. pag.* 127. ubi novo nomine MELIA vocatur.

BADHAAMU, Leguminis ſpecies. *Muſ. Zeyl. pag.* 55. ubi additur, fructus hujus plantae decocti & cum Oryza comeſti ebrietatem pariunt.

BALSAMINA latifolia floris calcari longiſſimo. *Nobis. Tab.* 16. *Fig.* 1. Balſamina, ſeu Noli me tangere Zeylanicum, flore rubente, fructu Hirundinis facie. *Herb. Herm.* Balſamina Zeylanica, latifolia, floſculis incarnatis, fructu Hirundinis facie. *Muſ. Zeyl. pag.* 30. KUDAELUKOLA Zeylonenſibus. a *Kudaëlu* quod ſignificat hirundinem, cui ſimilia ſunt vaſcula ſeminalia hujus plantae. *Kola* folium notat. Foliatura cum noſtris Europaeis Balſaminae ſpeciebus convenit, quae unicuique notae ſunt. Floribus vero ab iis differt. Primo quod multo ſint minores, dein quod calcaria gerant quintuplo fere longiora, tertio quod pedunculis longiſſimis inſedeant. Fructus in noſtra planta tam parvus eſt, nec adeo excrevit, ut dijudicare poſſim, an hirundinem referat. Fides ſit penes illuſtrem illum *Hermannum*, qui vivis & in loco natali vegetis plantis, naturae earum conveniens nomen indidit. Errorem autem commiſit ſculptor, quod flores infra foliorum ortum produxerit, quum ex eorum alis proveniant, quem poſtea corrigere ſine figurae detrimento haud facile potuit. Hoc genus Lacca herba, ſeu Lacca Kitſyl a *Rumph. in Herbar. Ambon. lib.* 8. *cap.* 52. vocatur. ubi Lacca coccinea, purpurea & alba deſcribitur, & coccinea depingitur noſtrae conveniens, excepto floris calcare.

BALSAMINA anguſtifolia, floribus ternis communi pedunculo ortis. *Nobis. Tab.* 16. *Fig.* 2. Balſamina foemina Zeylanica, Salicis folio anguſto, ſerrato, flore magno, eleganti, rubro. *Herb. Herm.* an Noli me tangere folio anguſtiſſimo. *Muſ. Zeyl. pag.* 19.? quae KUDHUMAETHI, KUBULUBOLHIDA, & KURUBUBOLKINDA incolis vocatur. a *Kudhu* quod notat pulverem, & *Maethi* quod terram. Naſcitur enim haec planta in ſiccis arenoſisque locis, & humo pulvere plena. Folia gerit haec elegans ſpecies longiſſima, anguſtiſſima, acutiſſima, dentata, glabra, ſuperiore eorum parte laete viri-

 dia,

dia, inferiore cinerea, per dorſum coſta validiſſima albicante decurrente. Folia autem ex caule alternatim proveniunt ortu tenuiſſimo, ex quorum alis flores non ſolitarii, ſed terni ſimul ex communi pediculo proveniunt, qui poſtea in tres dividitur pedunculos, quorum quisque ſuum ſuſtinet florem magnum, amplum, elegantiſſimum, calcari longiſſimo praeditum, calice ſuo contentum.

BALSAMINA foemina anguſtifolia Zeylanica KUDALUKOLA dicta. *Muſ. Zeyl. pag.* 35. praecedentis videtur varietas.

BALSAMINAE anguſtifoliae forte ſpecies KIDHAMAEHI dicta. *Muſ. Zeyl. pag.* 25. ubi additur, naſcitur in paluſtribus: folia habet alterna, forma Epiphylloſpermi, majora tamen, flos eſt inſtar Noli me tangere.

BALSAMINA erecta, ſeu foemina Perſicae anguſto folio, Zeylanica. *Par. Bat. pag.* 105. ubi icon & deſcriptio. Lyſimachia Zeylanica, foemina, Hydropica, floribus incarnatis. *Muſ. Zeyl. pag.* 64. Balſamina foemina anguſtifolia Zeylanica. *Par. Bat. Pr. pag.* 317. Balſamina Indica anguſtifolia, flore minore rubello, elegantiſſimo. *Tournef. inſt. pag.* 419. DYAKUDALU Zeylonenſibus, id eſt KUDALU ſeu Hirundinaria aquatica.

BALSAMINA foemina anguſtis & eleganter crenatis foliis, flore albo minore. *Plukn. Almag. pag.* 62. Balſamina Indica flore albo. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 22. Tilo-Onapu ſeu Notenga. *H. Malab. part.* 9. *Tab.* 52. Poſteriores hae Balſaminae magis ſunt varietates quam quidem diverſae ſpecies, ut etiam notatur in *Parad. Batav. pag.* 105. ſicut & plures Onapu varietates in *H. Malab. part.* 9. etiam occurrunt. quae a *Commel. in Fl. Malab. pag.* 14. notantur.

BALUWANOSSA. *Muſ. Zeyl. pag.* 25.

BANDURA Zeylanica in extremo foliorum, folliculum peniformem expanſum habens. *Herb. Herm.* & *Muſ. Zeyl. pag.* 16. a nobis *Tab.* 17. exhibetur. Bandura Cinghalenſium, planta mirabilis Zeylanica in foliorum extremo folliculum peniformem expanſum habens. *D. Hermans.* apud *Breyn. Prodr.* 1. *pag.* 18. Planta Zeylanica, cujus foliorum extremus folliculus peniformis ſe expandit. *Muſ. Zeyl. pag.* 37. Priapus vegetabilis Monorchis, BANDURA Cinghalenſium. *Amm. Char. pl.*

pag.



BANDURA Zeylanica in extremo foliorum, folliculum peniformem expansum habens.

pag. 529. Bandura Cinghal. Gentianae Indicae fpecies. *ibidem pag.* 287. ubi vide notas. ut & *Mifcell. curiof. ann. prim. decur.* 2. *pag.* 58. Nepenthes Zeylanicum flore minore *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 75. ubi vide hujus notas characterifticas, & alias varietates. Planta mirabilis deftillatoria *Grimm. in Mifcell. curiof. ann. prim. decur.* 2. *obferv.* 146. *pag.* 363. Cantharifera, Kannekens-kruyd, Daun Giridi *Rumph. Herb. Amb. lib.* 7. *cap.* 61. Sed ubi folliculus peniformis inftar Canthari operculo tecti depingitur, & flores ac fructus quodammodo differunt. Utricaria vegetabilis Zeylanenfis, BANDURA Cinghalenfibus dicta. *Plukn. Phyt. Tab.* 237. *Fig.* 3. in qua folliculus peniformis mire & irregulariter exprimitur, quem nos, ut in variis fpeciminibus invenimus, accurate delineatum curavimus, qui denominationi & rei ipfi magis convenit. Peculiarem hujus plantae proprietatem ex *Grimm.* vide defcriptam apud *Ray tom.* 1. *pag.* 721. de qua infuper notatur in *Muf. Zeyl.* quod tota fit Alexipharmaca, praefertim ad morfus *Colubris* appellati. Nomen ejus eft Cinghalenfe, quod Latinis notat membrum virile, quod illis vocatur *Baka.* Crefcit abunde circa Columbum in humidis & umbrofis locis.

Adfurgit elegans haec planta caule fungofo craffo, rotundo, cui folia feffilia alterno ordine adcrefcunt, lata, oblonga, glabra, per eorum medium nervo validiffimo decurrente, qui terminatur in claviculam longam, faepius circinnatam, cui appendet folliculus vafculofus, membranaceus, glaber, concavus, facillime fefe per liquorem advectum expandens, qui a radicibus hujus plantae humida loca amantis e terra adtrahitur, atque per caulem fungofum adducitur ad folia, ubi per nervum in claviculam, per eam ad folliculi cavitatem, ubi claviculae hujus continuatio eft, deducitur, expanfus tunc hic folliculus perfecte penem virilem glande fuo inftructum refert, qui tanquam operculum amphorae in Pluknetii Figura confpicitur, in variis autem, quae fervo fpeciminibus, neutiquam mihi ita obvenit, fed eo, quo exfculptum eft, modo. Flores per caulis fummum gerit longis pediculis infidentes tetrapetalos, perpetuos feu ftabiles, fructui calicis loco infervientes, quorum piftillum prope apicem cingitur anthera annulari octo crenis notata, & ut videtur, ex quatuor apicibus bifidis conftructa. Fructus eft filiqua quadricapfularis, in fummo quatuor apicibus ornata, in qua femina tenuia, longa vermiculataque, paleacea continentur.

BANGHALA. *Muf. Zeyl. pag.* 51. ubi additur hujus radix, transfertur ex Malacca in Zeylonam.

BASELLA. *H. Malab. part.* 7. *Tab.* 24. ubi vide notas. Solanum fcandens Malabaricum folio Betae. *Cat. H. Amft. in* 8vo. *pag.* 330. Blitum Bacciferum Ceylanicum. Solanum tinctorium Ceylanicum, Hermanni *C. H. Beaum.* M. S. & *Fl. Malab. pag.* 16. Solanum peregrinum Betae folio. *Ray hift. p.* 1876. Beta baccifera, aizoides, rotundifolia, Zeylanica, *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 23. an Halicacabus baccifer Anty. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 10. *cap.* 45. Solanum tinctorium Zeylanicum minus Bafella Malabarorum. *Par. Bat. Append. p.* 12. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 63. Mirabili Peruvianae affinis tinctoria Betae folio fcandens, Cochinenfis, floribus puniceis mufcofis, ex finu foliorum fpicatis, fructu intus cochleato. *Plukn. Phyt. Tab.* 63. *Fig.* 1. vide & *Almag. pag.* 252 & 253. BINTAL Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 68. Primus omnium characterem ejus naturalem invenit *Carolus Linnaeus*, Botanicus oculatiffimus & fimul peritiffimus, qui illam Cufcutae veram effe fpeciem, quum in Horto Medico plantam vegetam florentem examinaremus, mihi afferuit: unde & in *Char. pl. gener.* Bafellam *Cufcutae* Tournefortii tribuit, cujus characterem exacte defcripfit *pag. ibidem* 32.

BATATTAS vide infra *Rizophoram.* & *Samuel. Dale. Pharmacol. fupplem. pag.* 150. qui Convolvulis annumerat. quorum *Batattae* etiam funt fpecies, ut indicant Figurae, quae apud *Merian. infect. Surinam. pag.* 41. inveniuntur, & apud *Rumph. in Herb. Ambon. lib.* 9. *cap.* 17. ubi *Batatta*, *Batattas*, & *Ubi-Caftela* vocatur, qui verus eft Convolvulus repens, ad fingulum nodum Rhizophorus & tuberofus, folio folitario, flore parvo. *Merian* autem *Figura* exprimit Convolvulum tuberofum foliis inferioribus in quinque, fuperioribus in tres lacinias divifis, flore magno coeruleo. ubi in defcriptione dicitur quod etiam repat & ad ramos radices agat &c. cujus Synonyma latius in notis fubjunctis & in *Commel. Fl. Malab.* explicantur ad Convolvulum Indicum radice tuberofa eduli, cortice rubro, *Batattas* dictum. *pag.* 22. vide & *Feuille hift. des plant. Medicin. tom.* 3. *pag.* 16. *pl.* 11.

BAUHINIA foliis fubrotundis, flore flavefcente ftriato. *Nobis. Tab.* 18*.

Senna



BAUHINIA *foliis subrotundis, flore flavescente striato. Nobis.*

Senna Zeylanica, folio fingulari, cordato, flore lutefcente magno. *Herb. Hert.* Canfchena-Pou. *H. Malab. part.* 1. *Tab.* 35. quae in notis vocatur. Arbor filiquofa, Malabar. foliis bifidis minoribus, flore albo, flavefcente, ftriato. a D. *Syen* autem in notis *pag.* 58. ad primam *H. Malab.* fpeciem annotatur, & dicit, prioris ficcatum ramulum ex infula Zeilan. transmifit *Dom. Hermans* fequenti infcriptione: Arbor Sancti Thomae. In floribus apparent fanguineae ftriae, ab effufo fanguine D. Thomae enatae. Docuiffe enim creditur D. Thomas in Malab. & Zeilan. Similis huic figura, fed floribus deftituta reperitur in *Plukn. Phyt. Tab.* 44. *Fig.* 6. ubi vocatur Mandaru Maderasp. foliis firmioribus parvis bifulcis, glabritie fplendentibus, ad furculum denfius ftipatis. Flos divi Thomae vulgo. *Commel. Hort. Amft. Cat. pag.* 34. & *Fl. Malab. pag.* 8.

Rami noftrae arbufculae funt lignofi, glabri, punctis fcabriufculi, nitidi. Folia alternatim petiolis uncialibus infidentia circumfcriptione fere orbiculari, a fuperiore parte ad medium circiter bifida, lobo fcilicet fingulo femiovato, fuperne viridia, inferne albicantia.

In media autem folii fiffura apparet fpinula, quae nervi recti majoris productio eft & ejus continuatio. quae in *H. Malab.* & *Plukn.* Figura omiffa eft.

Flores folitarii per ramulos oriuntur, petiolis infidentes, duobus foliolis linealibus inftructis. Flores hi funt maximi ad unum latus inclinantes, ut in Senae fpeciebus, decem ftaminibus inftructi, piftillum unicum ftaminibus dimidio fere longius habentes.

Siliquae funt longae, planae, rectae, compreffae, fuperficie externa lanuginofae & lenes admodum, dum tenerae adhuc funt. Fabae, quas includunt filiquae, longitudinaliter locantur, feptis diftinctae, oblongo-rotundae.

BAUHINIA foliis oblongo-acutis, nervofis, flore albo. *Nobis.* Arboris divi Thomae fpecies, foliis longioribus, MAYLA Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 8. Senae fpuriae, aut Afphalto affinis, arbor filiquofa, foliis bifidis, flore pentapetalo, vario, *Sloan. Cat. Pl. Jam. pag.* 150. & *Hift. Jam. part.* 2. *pag.* 51. Thomaea arbor, filiquofa, foliis bifidis, minor, flore candido. *Par. Bat. Pr. pag.* 380. Velutta Mandaru. *H. Malab. part.* 1. *Tab.* 34. ubi in notis Arbor filiquofa Malabarica, foliis bifidis, flore candido, ftriato vocatur a *D. Syen.* Vide porro *Ray hift. part.* 2. *pag.* 1571. *Amman. Char. pl. pag.* 366. ubi Daudan Indo-

 rum,

rum, eſt flos D. Thomae. Vide & *eundem pag.* 610. ad Velutta Mandaru & *ejus H. Boſian. pag.* 37. *Breynius in Prodr.* 2. *pag.* 19. breviter ejus characterem exhibet. qui accuratiſſime a *Linn. in Char. pl. gen. pag.* 126. deſcribitur ſequenti modo.

Cal. PERIANTHIUM oblongum, longitudinaliter dehiſcens, ad latus repulſum, deciduum.

Cor. PETALA quinque, ſubrotundo-oblonga, verſus alterum latus inclinata, calici oppoſita, inaequalia.

Stam. FILAMENTA decem, inaequalis longitudinis, declinata. ANTHERAE reflexae, aſſurgentes.

Piſt. GERMEN Cylindraceo-oblongum, STYLUS inflexus, STIGMA capitatum, emarginatum.

Per. LEGUMEN longum, ſubteres, uniloculare.


Sem. Multa, ſubrotunda, compreſſa, ſecundum longitudinem leguminis poſita.

Obſerv. Flores ſpecierum in *H. Malab.* examinavimus, a quibus immenſe differunt icones *Plumierii.* hinc ſunt diverſi generis vel peſſime a *Plumierio* depictae. *Linnaeus.*

Bauhiniae nomen primus *Plumierius in nov. pl. gen. pag* 23. *Tab.* 13. huic generi tribuit, quod maluimus hic retinere in memoriam tantorum Botanicorum *Casp.* & *Joh. Bauhinorum.* licet HYMENAEA alias convenienter vocari poſſet, metaphorice dicta, & deſumpta a foliorum figura, quae in hiſce ſpeciebus duo quaſi corda conjuncta repraeſentant. quae licet ſolitaria, in ſummo ſunt ita fiſſa, ut bina cöalita folia referant, quae noctu ſe complicant & conjungunt. HYMEN autem Deus conjugii veteribus habebatur.

BETELES ſpecies folio lato, *Siriboa Bontii. Muſ. Zeyl. pag.* 32. *Siriboa Bontii lib.* 6. *pag.* 91. exprimitur, quae Saururi habenda eſt ſpecies.

BETELE Tambul ſeu Betre *C. B. P. Muſ. Zeyl. pag.* 34. Betre apud *C. B. P. in Pinac.* occurrit *pag.* 410. ubi dicitur Betre Malaccenſium volubilis modo arbores ſcandens, fructu lacertae caudam aemulante. Tambul Avicennae, Betre Garzias. *Muſ. Zeyl. pag.* 36 & 66. Betre ſeu Betelle *J. B. tom.* 1. *lib.* 4. *pag.* 437. Betele *Acoſt. arom. cap.* 10. Betre Figuram & deſcript. vide apud *Cluſ. Aromat. lib.* 1. *cap.* 18. Betla-Codi. *H. Malab. part.* 7. *Tab.* 15. ubi *pag.* 29. *vide notas* & *Amman. Char. pl. pag.* 293. reliqua inveniuntur apud *Plukn. Almag. Botan. pag.* 67.





BLITUM annuum angustifolium spica graminea foliosa. Nobis.

67. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 15. BULATWAELA Zeylonenfibus, folia habet feptinervia, eftque Saururi fpecies, ut *Samuel Dale* eum etiam poft Piper longum ponit in *Pharmacol. pag.* 364. a Pluknetio haec cum *Siriboa Bontii* conjungitur, quod neque ex defcriptione, nec ex figura conftat, quum *Siriboa* habet folia vel profunde fecta, vel tria tenuia ex uno puncto orta; hujus autem folia funt lata, fubrotundo-acuta, Convolvulacea, & haec Saururus volubilis Convolvuli majoris folio *Betele* dictavocari poffet.

BETONICA frutefcens *Bontii*, Hormini fativi coma, Amaranthi foliis. *Muf. Zeyl. pag.* 29. Betonica frutefcens apud *Bontium* occurrit *cap.* 51. *pag.* 146.

BETULAE fpecies, conis oblongis, villofis, foliis oblongis ferratis. *Muf. Zeyl. pag.* 33.

BIDENS Zeylanica latifolia flore luteo, quafi flaccido. *Hert. Catal. fe-min.* quae ACMELLA videtur ad *Ceratocephalum* infra exhibita.

BLATTARIA Ceylanica, flore amplo coccineo. *H. Amft. part.* 1. *pag.* 11. Blattaria Zeylanica, flore coccineo. *Par. Bat. Pr. pag.* 318. Blattaria Zeylanica, flore amplo miniato. *Cat. Hort. Amft. pag.* 53. & *H. L. B. pag.* 90." in *Pluknet. Mantiff. pag.* 32. Alceis accenfendam effe hanc putatur, unde a *Breynio* vocatur Alcea Indica lucido haftato folio, flore Blattariae phoeniceo. de hac vide *Ray tom.* 3. *pag.* 523.

BLITUM fcandens fructu lappaceo. *Nobis. Tab.* 18. *Fig.* 1. Verbena Indica, farmentofa, fcandens, fpica comofa, fructibus lappaceis. *Muf. Zeyl. pag.* 47. Verbena Indica fcandens, farmentofa, fpicis comofis, feminibus lappaceis. *Herb. Herm.* Wellia Codiveli. *H. Malab. part.* 10. *Tab.* 59. ubi Betae folio Malabarica femine lappaceo vocatur. Blitum album majus fcandens. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 49? Centaurium Ciliare minus Circaeae foliis firmioribus, fpicatis floribus e Madrasp. *Plukn. Phyt. Tab.* 82. *Fig.* 2. huic maxime convenit. WAELKA-RALHAEBO Zeylonenfibus. a *Wael* quod farmentum denotat. KA-RALHAEBO eft Amaranthus fpicatus, feu Verbena Indica Bontii fupra defcripta.

Caulis hujus plantae eft bipedalis, tenuis, fimplex, ad radicem folia oppofita, oblonga, acuminata, laevia, integra, feffilia, per tres oppo-fitio-

fitiones, aut tria paria oppofita gerens, & e finu foliorum fuperiorum producens ramulos, quorum caulis fummus inftruitur flofculis fparfis, qui calicem habent quinque foliis oblongis, lanceolatis intus glabris, extus fetis rigidis armatis conftantem. Petala floris funt nulla, ftamina vero quinque capillaria, longitudine calicis, piftillum eft unicum fummitate capitatum, femen unicum nudum, unde vera Bliti fpecies. Toti fructus hujus funt echinati & aculeati, five lappacei, fub fingulo autem fructu ponitur fquammula paleacea, acuminata.

Blitum annuum anguftifolium fpica graminea foliofa. *Nobis. Tab.* 18. *Fig.* 2. Verbena Indica anguftifolia, fpica graminea foliofa. *Herb. Herm.* an Parietaria foliis ex adverfo nafcentibus Urticae racemiferae flore? *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 50. HULLUMAYAKOLA Zeylonenfibus. Radice fibrofa & filamentofa annua enafcitur haec planta, cujus caulis faepe eft pedalis, nunc rectus, faepius curvus, folia fpargens, nunc oppofita, nunc folitaria, ex foliorum alis rami nafcuntur ejusdem cum caule formae, ad radicem ftolones emittit haec planta procumbentes, tenues, plures, folia funt lanceolata, integerrima, glabra, utrinque viridia, brevibus innixa pediculis. Floris fpica deeft.

Blitum Perficum, maximum, paniculis mollibus, pendulis, fericeis. *Muf. Zeyl. pag.* 64. Bliti character invenitur apud *Linnaeum in char. plant. pag.* 20.

BOHU & BOHUMBU. *Muf. Zeyl. pag.* 60. quod pronunciatur *Bombu* h. e. exoticum.

BORRAGINOIDES anguftifolia flore pallefcente. *Hert. Catal. femin.*

BORRAGO Zeylanica maxima, floribus ex coeruleo albicantibus. *Hert. Cat. femin.*

BRYONIA folio angulofo, acuto, glabro. *Nobis. Tab.* 19. *Fig.* 1. Bryonia laevis baccis rubentibus. *Herb. Herm.* Bryonia Indica alba, baccis rotundis rubentibus. *Muf. Zeyl. pag.* 23 & 57. TELANKAEKIRI Zeylonenfibus. An Petola fylveftris, feu Petola Utan. *Rumph. Herb. Amb. lib.* 9. *cap.* 45?

Tenera haec planta caules laeves ftramineos, ut & claviculas emittit, quae ortum fuum habent ex alis foliorum, & funt mire circinnatae.

Folia



BRYONIA *foliis subrotundis, angulosis, Momordicae facie. Nobis.*

BRYONIA *folio anguloso, acuto, glabro. Nobis.*

Folia autem gerit glaberrima, tenuia, angulofa, acuta, in ambitu apicibus fpinulas haud male referentibus cincta, ex quorum oppofita parte flores proveniunt longis innixi pediculis, calice quinquefido, profunde fecto contenti; Flores autem funt monopetali, in quinque fegmenta divifi, venofi, albicantes; poft quos baccae rubentes fubfequuntur, ut *Hermanni* denominatio docet.

BRYONIA foliis fubrotundis, angulofis, Momordicae facie. *Nobis. Tab.* 19. *Fig.* 2. Bryonia laevis fructu rubente tereti, oblongo. *Herb. Herm.* Folia hujus plantae multo funt ampliora, ficut & tota planta validior, quam praecedens; angulofa funt itidem, fed forma rotunda, non acuta, ut in priore fpecie, glabra quoque & laete virentia. Flores & Claviculae eodem, ut in antecedente progerminant, & conftitutae funt modo. Fructus autem, quo deftituor, non videtur bacca, fed de pomiferorum tribu, unde Momordicis forte accenfenda. Quum autem *Clariff. Hermannus* hanc Bryoniis junxerit, arduum foret hanc a praecedente fejungere, praefertim quum fummus ille Botanicus in loco natali, ubi viguit, & perfecta fuit haec planta, hanc fedulus examinando denominationem talem ipfi dederit.

BRYONIA Zeylanica flore luteo, fructu rubro. *Par. Bat. pag.* 107. ubi ejus Figura.

BRYONIA Zeylanica, folio quinquepartito. *Muf. Zeyl. pag.* 25 & 62. HONDALA Zeylonenfibus. Quae in *Muf. Zeyl. pag.* 41. variis nominibus proponitur, vocatur enim ibi Clematis Indica folliculo aureo rotundo triangulo. Clematis Indica, purpurea, foliis profunde incifis, radice ampla tuberofa. Convolvulus Indicus capreolatus, radice tuberofa, foliis profunde incifis, feu quinquepartitis. Bryonia Zeylanica folio quinquepartito. HONDALA & ALLAHONDA Zeylonenfibus, *Honda* fignificat Probofcidem Elephantis, cui adaequat caulis hujus plantae a parte inferiore prope radicem. *Muf. Zeyl.* apud *Grimm. in Labor. Ceyl. pag.* 125. Vocatur Balfamina Momordica, a nonnullis Halicacabus peregrina, & a Cinghalenfibus HUNDULE vocata. ubi haec addit: Exhinc cum Oleo vulgari Balfamum quoddam elicitur, quod in Chirurgia magni eft ufus, tam ad vulnera & contufiones, quam ad alia accidentia. Dubito autem, an omnia haec fynonyma uni competant huic plantae. Quaedam enim pro Bryonia, quae-

dam pro Momordica, & alia pro Alkekengi forte poſſent haberi: in re hac incerta certiſſimum ſecuti ſumus auctorem, Clariſſ. nempe *Hermannum*, qui in tribus locis Bryoniae nomine hanc denominavit.

BRYONIA Zeylanica, foliis profunde laciniatis, *H. L. Bat. pag.* 95. ubi icon & deſcriptio. Balſamina ſcandens, ſeu Momordica Indica, Bryonioides, fructu laevi minori, rubro, albis lineis variegato. *Par. Bat. pag.* 103. Momordica minor, Indiae Orientalis, Bryoniae facie, fructu glabro, molli, Uvae criſpae magnitudine & effigie, ſuave purpuraſcente, lineis niveis ſtriato. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 74. Bryonia Zeylanica, foliis in profundas lacinias diviſis, fructu minore. *Tournef. inſt. pag.* 102. Balſamina cucumerina, Malabarica, fructu minore, oblongo, rotundo, glabro. *Commel. Cat. H. Amſt. p.* 47. & *Fl. Malab. pag.* 14. Nehoemeka *H. Malab. part.* 8. *Tab.* 19. ubi vide notas ſubjectas, & *Plukn. Phyt. Tab.* 25. *Fig.* 3. BASNAGILLI Zeylonenſibus.

BRYONIA Zeylanica, foetida, flore luteo majore, fructu rubro oblongo, KOPALAM Zeylonenſibus. *Par. Bat. Pr. pag.* 318. Balſamina ſcandens, ſeu Momordica Indica foetida Bryonioides fructu laevi majore rubro, *Par. Bat. pag.* 103. ubi deſcriptio. Bryonia Zeylanica foliis in profundas lacinias diviſis, fructu majore. *Tournef. inſt. pag.* 102. KOPALAM Zeylonenſibus. *Muſ. Zeyl. pag.* 69.
De Bryonia Zeyl. in genere haec habet *Grimm. in Labor. Ceyl. pag.* 126. Praebet nobis Faecul Bryonia, cujus praeſtantia ſpecialis eſt ad morbos Matricis & ad Hydropem.

BUPILAE. *Muſ. Zeyl. pag.* 14. a *Bu* quod notat capillos; folia enim parum hirſuta ſunt. *ibidem.*

BURMANNIA ſpica gemina *Linnaei*: quae exprimitur in *noſtra Tab.* 20. *Fig.* 1. Ephemerum Zeylanicum, foliis gramineis, flore coeruleo. *Herb. Hert.* Hyacinthus Zeylanicus, paludoſus, floſculis trigonis, coeruleis, oblongis, tribus in ſummo luteſcentibus foliolis ſtellatim coronatis. *Herb. Herm.* JAWAEL floribus oblongis, coeruleis, triangulis, tribus in ſummo luteſcentibus foliolis ſtellatim coronatis. *Muſ. Zeyl. pag.* 7. Planta Zeylanica, aquatica, lato & brevi gramineo folio, floribus coeruleis minimis, capſulis ventricoſis, an Siſyrinchii ſpecies? *Ray tom.* 3. *pag.* 559.

Planta



BURMANNIA *spica gemina Linnaei*. GALEOPSIS *Zeyl: folio oblongo, flore albo*.



Planta eft Spithami magnitudine, radiculis fibrofis, foliis gramineis, flofculis ex atro coeruleis, trigonis, oblongis, tribus in fummo lutefcentibus foliolis ftellatim coronatis, incolens prata uliginofa & aquofa. Brevis haec defcriptio defumpta eft ex *Muf. Zeyl. pag.* 52. Cui ex *Ray* citato loco addimus, quod fummus caulis in duo velut cornua dividatur florifera & feminifera, quae ad fe invicem incurvantur, fructus feu filiquae ad interiorem cornu partem vergunt fimplici ordine, ut etiam diftincte in noftra Figura confpicitur. JAWUL & DYAJAWUL id eft *Jawul aquaticum* Zeylonice audit.

Nos fequenti modo eam defcribimus: Radix fibrofa eft, tota capillacea, ratione magnitudinis plantae minima, e qua exeunt folia fex, octo, vel novem biuncialia, lanceolata, culmiferorum fimilia, integerrima, radicalia omnia. Caulis in planta adulta eft fpithamalis vel fesquifpithamalis, rectus, fimplex, folia fex, feptemve alterno fitu caulem inveftiunt, inferius vaginantia, fuperius libera, uncialia, vix a caule remota, fere amplectentia. Caulem terminant fpicae duae e recto patentes, floribus novem paucioribus vel pluribus ornatae, in fingula fpica homomale pofita furfum vergente infident flores coerulei, non decidui, elegantiffimi, quorum Calix eft tubulatus, trialatus, apice trifido, tribus luteis laciniis in diffepimentis inftructus, ftamina funt fex breviffima, piftillum unicum; fructus filiqua oblonga triangularis, feminibus plurimis minutiffimis repleta. accuratiffimum hujus charactérem dedit *Carol. Linnaeus in Char. pl. gen. pag.* 100. fequenti modo.

CAL: *Perianthium* longum, monophyllum, cylindraceum, coloratum, alâ membranacea, triplici, longitudinali inftructum, *ore* trifido parvo.

COR: minima. *Petala* tria, ovata, oblonga, in ore calycis pofita, minutiffima.

STAM: *Filamenta* fex, vix notabilia. *Antherae* totidem, in ore calycis, breviffimae, binae ubique fimul, mucrone reflexo diftinctae.

PIST: *Germen* cylindraceum, calyce dimidio brevius. *Stylus* filiformis, longitudine corollae. *Stigmata* tria, obtufa, concava.

PER: *Capfula* involuta, cylindraceo-trigona, trilocularis, trivalvis, angulis dehifcens.

SEM: numerofa, minima.

Duae hujus generis fpecies auctori notae funt, noftra, quam vocat, fpica gemina, feu duplici, & altera eft fcapo biflore, quae ex apice

 caulis

caulis duos tantummodo profert flores, quae in India Orientali occurrit, eſtque planta minima, itidem graminifolia, quam in Herbario ſuo ſervat *Joh. Fred. Gronovius.*

CACALIA foliis auriculatis, ſerratis, ſupra nigricantibus, infra lanugine alba obductis. *Nobis. Tab.* 21. Cacalia Indica odorata. *Muſ. Zeyl. pag.* 5. Cacalia Zeylanica odorata, quae Baccharidis forte ſpecies. *Herb. Herm.* Conyza Zeylanica odorata, foliis ſubtus lanugi-noſis. *Muſ. Zeyl. pag.* 35. Conyza Zeylanica odorata. *ibidem pag.* 51. Eupatorium Zeylanicum, foliis dentatis ad pediculos breves auriculatis. *Moris. Hiſt. pl. Tom.* 3. *pag.* 99. quem vide, & ibi etiam citatur nomine Jacobaeae Senecionis flore Zeylanicae, odoratae PUPULA Zeylonenſibus dictae HERMANNI, & ex hoc apud *Ray tom.* 3. *pag.* 188. PUPULA dicitur a *Pupulathi* quod loca praerupta & inculta notat, quibus naſci gaudet planta. Quae caule adſurgit lignoſo rotundo, purpureo, villis albicantibus obſeſſo, folia gerens ſolitaria, firmis & breviſſimis pediculis innixa, auriculata, oblonga, profunde dentata, ſuperiore parte nigricantia, inferiore alba, & tomentoſa. Flores in ſummo caulium gerit collectos, in parvis quaſi umbellis diſpoſitos, qui floſculi calice oblongo dentato ſuſtinentur, ſemina plumoſa, longa, tenuia, nigricantia dantes.

CALAMINTHA Zeylanica *Grimm. Labor. Ceyl. pag.* 128. ubi haec habet: Copioſiſſime creſcit apud nos; utiliſſimi uſus eſt in Medicina & Chirurgia pro Clyſteribus, Decoctis, Catapl. Fomentis & pluribus aliis. Oleum largiſſime praebet, cujus virtutes admiratione dignae ſunt pro ſtomacho, capite & morbis Matricis. Aqua ipſius eosdem habet uſus ad hujusmodi morbos. Praeterea conficimus exinde Syrupum, ſicut & Salem ex cineribus.

CALTHA flore ſolitario, ex alis foliorum longiſſimo pedunculo prodeunte. *Nobis. Tab.* 22. *Fig.* 1. Eupatoriophalacron foliis anguſtis, rarius dentatis, flore radiato. *Vaill. act. reg. Paris. ann.* 1720. *pag.* 920. Chryſanthemum Zeylanicum foliis anguſtis, rarius dentatis, aſperis, KIRINDYA Zeylanenſium. D. SCHERARD apud *Ray Hiſt. pl. tom.* 3. *pag.* 212. Chryſanthemum ſeminibus in capitulum congeſtis recurvis. *Muſ. Zeyl. pag.* 38. Chryſanthemum Indicum longiſſimis pediculis, folio Bellidis. *Herb. Herm.* KIRINDYA Zeylonenſibus.

Vera



CACALIA foliis auriculatis, serratis, supra nigricantibus, infra lanugine alba obductis. Nobis.



CHRYSANTHEMOIDES *hirsutum, foliis scabris, oblongis, acutis. Nobis.*

CALTHA *flore solitario, ex alis foliorum longissimo pedunculo prodeunte. Nobis.*

Vera haec Calthae fpecies eft, quod non folum ex floris radiis dentatis, fed infuper ex *Hermanni* denominatióne conftat, ubi ipfi tribuit femina recurva in capitulum congefta, ita ut a Chryfanthemo differat; nec ad Bidentem, cujus flores parum radiati, plerumque vero nudi funt, cum *Scherardo* referri poffit. Unde & *Vaill.* novum inde compofuit genus. Singulari itaque modo florem fuum gerit haec planta longiffimo pediculo ex foliorum alis productum, qui folitarius provenit radiatus, coloris aurei, calice fcabro fquammofo contentus, & ut videtur, tubulofo. Folia gerit oblonga, fcabra & hirta, breviffimis pediculis infidentia, integra, oppofita, forma Bellidis; Caulis eft hirfutus, fubrotundus, ad foliorum ortum protuberans: tota denique planta eft fcabra & hirfuta admodum.

CAMPANULA Ceilanica, Senecionis folio, flore purpureo. *Alb. Sebae rerum natur. thef. part.* 1. *Tab.* 22. *Fig.* 12.

CANNACORUS latifolius vulgaris. *Tournef. inft. pag.* 367. Cannacorus Daun-Taffibek. *Rumph. Herbar. Ambon. lib.* 8. *cap.* 22. Canna Indica, feu Arundo latifolia maxima. *Muf. Zeyl. pag.* 66. Canna Indica *Rivini p.* 20. & *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 121. ubi plurima habet fynonyma. Hujus characterem vide accuratiffime datum a *Linnaeo Charact. plant. pag.* 1. ad CANNAM Katu-Bala. *H. Malab. part.* 11. *Tab.* 43. PUKSARNA PUSSARNA & PUKSARANA Zeylonenfibus.

CAPPARIS fpinofa, foliis oblongis. *Muf. Zeyl. pag.* 7. Capparis Indica, fpinofa, anguftiore Salicis folio. *Plukn. Mantiff. pag.* 36. Capparis Zeylanica, duplicatis fpinis, folio acuto. *Muf. Petiv. no.* 625. huc fpectat Cara-Schulli. *H. Malab. part.* 2. *Tab.* 47.

CAPSICUM Indicum. *Muf. Zeyl. pag.* 61. Capficum Indicum. Tfchili *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 8. *cap.* 50. ubi majus rubrum, minus rubrum, & minus flavum depingitur, & defcribitur. Piper Indicum, vulgatiffimum *C. B. P. pag.* 132. Solanum mordens, fructu propendente oblongo, craffo & obtufo. *Plukn. Almag. pag.* 353. ubi plurimae hujus enumerantur fpecies, ut & apud *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 111. & *fequent.* & *Hift. Jam. part.* 1. *pag.* 290. Vallia-Capo-Molago. *H. Malab. part.* 9. *Tab.* 35. RATHAMIRIS Zeylonenfibus. ejus ufum vide apud *Samuel. Dale. Pharmacol. p.* 245. & characterem apud *Linnaeum in Char. pl. pag.* 51.

CARDAMOMUM Zeylanicum, fructu rotundo nigro, in caulium summitate. *Par. Bat. Pr. pag.* 320. & *H. Beaum. pag.* 12. Grana Paradisi Zeylanica. *Muf. Zeyl. pag.* 40. Cardamomum fructu nigro rotundo Zeylanicum. *Par. Bat. Pr. App.* Cardamomum rotundum, Cardamom. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 8. *cap.* 12. an Cardamomum maximum *Ger. emac. pag.* 1542? Cardamomum maximum, & Grana Paradisi. *Park. Theat. pag.* 1576. Grana Paradisi officinarum, cujus folia sub Melleguеta in Prodromo descripsimus. *C. B. P. pag.* 413. Characterem & usum vide apud *Samuel. Dale Pharmacol. pag.* 324. & *sequent.* ALUGHAS Zeylonensibus.

CARDAMOMUM Zeylanicum, sylvestre, aquaticum, acre, sapore Calami aromatici. *Muf. Zeyl. pag.* 96. Cardamomum Zeylanicum sylvestre aquaticum, *ibidem. pag.* 48. Cardamomum sylvestre, quod ab incolis ALAGHAKU dicitur. *Grimm. Labor. Ceyl. pag.* 117. ubi haec habet: Fertiliter crescit haec planta extra civitatem aulicam *Columbo.* Planta est, quae ad visum *Galangam magnam* repraesentat. Flores habet jucundos ac odoriferos, ex quibus Conserva conficitur, quae valde cordialis est, atque stomachum & caput corroborans &c. Fructus & semen magnam Olei abundantiam emittunt ad varios usus in Medicina, eandemque virtutem obtinent, ac Oleum *Cardam* ALUGHAHAS, ALUGHAHA & ALU Zeylonice dicitur, id est Arbor Cineris, quia fructus videntur saepe cinere quasi adspersi. Semina sapiunt Cardamomum cum pauxillo piperis conjunctum, crescit copiose in paludosis locis, ut ELATTERI *H. Malab.* quae eleganter exhibetur *Part.* 11. *Tab.* 4, 5, & 6. & sequenti convenit.

CARDAMOMUM ENSAL dictum. *Muf. Zeyl. pag.* 66. quod Cardamomum minus & vulgare; de quo vide *Cluf. lib.* 1. *Aromat. cap.* 24. & *Bont. pag.* 126. ut & *Commel. Fl. Malab. pag.* 18 &c.

CARPINUS Zeylanica, siliculosa, seu arbuscula Zeylanica siliculosa Carpino similis. *Muf. Zeyl. pag.* 53. Aceri vel Paliuro forte affinis arbor, caudice non ramoso, foliis Sorbi Sylvestris, floribus pentapetalis, racemosis, purpureis &c. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 138. HAMPINNA Zeylonensibus.

CAR-



CARPINUS viscosa, Salicis folio integro, oblongo. Nobis.

CARPINUS forte viſcoſa, Salicis folio integro, oblongo, *Nobis. Tab.* 23. Carpino ſeu Oſtryae adfinis, anguſto folio non ſerrato Zeylanica. *Par. Bat. Pr. pag.* 360. Arbuſcula Zeylanica, pannoſa, Salicis folio viſcoſo, ſeu Chamaerodendri capſulis inſtar Ulmi foliaceis. *Muſ. Zeyl. pag.* 32. Arbuſcula pannoſa Zeylanica, viſcoſo Salicis folio. *Herb. Herm.* Acer minus fructu orbiculari, Salicis folio Zeylanicum, ſive foliis & fructibus minoribus. *Breyn Prodr.* 2. *pag.* 8. Arbuſcula pannoſa, Zeylanica HERMANNI *ibidem*. Male huic pro ſynonymo additur Fagi foliis alterno poſitu alatis arbuſcula Bisnagarica a *Plukn. in Almag. pag.* 143. Cujus Figura exhibetur in *Phytogr. Tab.* 89. *Fig.* 10. quae Carpino antecedenti magis ſimilis eſt; ſed *Fig.* 1. *Tab.* 141. huic noſtrae quadrat, quae inſcribitur Arbuſcula viſcoſa Elaeagni foliis laete virentibus tricoccos, Americana, alias Ricini fructu Arbuſcula Bermudienſis, foliis longioribus viſcoſis &c. An Saponaria tricoccos, minor Americana, in *Almag. pag.* 43.? Aceri vel Paliuro adfinis anguſto, oblongo Liguſtri folio, flore tetrapetalo herbaceo. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 138. ubi vide reliqua: & *Hiſt. Jam. vol.* 2. *pag.* 27. *pl.* 20. *Tab.* 162. *Fig.* 3. ubi jungitur arbuſculae, quae a *Pluknetio* vocatur Triopteris Indiae Orientalis, ſeu Arbuſcula Amygdalae nanae folio, diſpermos, ſiliqua Thlaspeos Dioſcoridis, ternis amplioribus extantibus alis donata, WAENELLA Zeylonenſibus dicta in *Almag. pag.* 377. Triopteris Jamaicenſis anguſto Salicis folio, fructu minore fuſco. *ibidem.* &c. Mi-ror quod in *Ray tom.* 3. *pag.* 93. *Dendr.* male huic jungatur. Acer minus fructu orbiculari, Salicis folio Braſilianum, ſeu foliis & fructibus majoribus BREYNII, quum a *Breynio* ipſo Acer minus fructu minore (ut ex prioribus patet) arbuſculae noſtrae Zeylanicae jungatur in ſuo *Prodr.* 2. dein in *Ray tom.* 3. *pag.* 6. *Dendr.* haec eadem iterum jungitur Fagi foliis, alterno poſitu alatis, arbuſcula &c. *Pluknetii.* quod ſaepius in illo tomo occurrit, quod ſcilicet una eademque planta bis citetur, & diverſis jungatur ſynonymis.

Quum itaque haec arbuſcula tantis in hac ſcientia viris non bene cognita vel perſpecta fuerit, malui hanc, licet floribus & fructu viduam, juxta *Hermanni* exemplar ex ſuo ipſius Herbario depromptum proponere; quae WAERELLAGHAS Zeylonenſibus audit, & caules vimineos laeves habet, quibus folia oblonga, integra, glabra, ſplendentia, viſco quaſi ſeu glutine obducta, alternatim proveniunt, Salicis formam aemulantia: Facies alias hujus arbuſculae cum Chamaelea haud male convenit, quod per *Pluknetii* denominationem, ubi hanc vocat tri-

coccam,

coccam, magis adſtruitur, ſed quum flores nec fructus viderim, nihil certi concludere hactenus audeo, quum aliorum auctorum nomina cum hac opinione non ita conſentiant.

CASSIA Fiſtula, Zeylanica. *Muſ. Zeyl. pag.* 21, 28, & 32. quae eſt Caſſia nigra, ſeu fiſtuloſa prima, ſive Caſſia fiſtula, Alexandrina *C. B. P. pag.* 403. & *Fl. Malab. pag.* 19. & *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 145. qui innumera fere habet hujus ſynonyma. & *Hiſt. part.* 2. *pag.* 42. Caſſia Fiſtula. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 2. *cap.* 30. Caſſia fiſtula vulgaris flore luteo. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* Conna. *H. Malab. part.* 1. *Tab.* 22. ubi vide notas ſubjectas. & *Samuel. Dale Pharmac. pag.* 458. & *Cluſ. aromat. lib.* 1. *cap.* 29. De Arbore Caſſia Zeyl. *Grimm. in Labor. Ceyl. pag.* 119. haec habet: Ex floribus ipſius Conſervam extrahimus, quae ab obſtructionibus renum & Uretherum liberat, & in ipſa Gonorrhaea optimum producit effectum. AEHAELAGHAS, AETTAELAGHAS & AEHALA Zeylonenſibus.

Cassia ſiliqua quadrangulari. *H. Elth. pag.* 72. *Tab.* 63. quae eſt Senna Orientalis hexaphylla. TALA Zeylonenſibus *H. L. Bat. pag.* 557. ubi deſcriptio & *Muſ. Zeyl. pag.* 58 & 69. Senna Orientalis hexaphylla ſiliquis longis, incurvis, *Tora* Indorum vulgo & *Tachara* Malabarorum. *Plukn. Almag. pag.* 342. & *Mantiſſ. pag.* 170. Galega Indica hexaphyllos, quae Senna herbacea Ceylanica minor hexaphylla. *Amman. H. Boſian. pag.* 15. & *Char. plant. pag.* 402. an Senna minor herbacea plerumque hexaphylla folio obtuſo? *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 148. & *Hiſt. Jam. vol.* 2. *pag.* 47. *pl.* 21. *Tab.* 180. *Fig.* 5. &c. Taheara Malabarorum Paiomirioba hexaphylla, Glycyrrhizae foliis. *Petiv. act. Phil. Lond. vol.* 22. *no.* 271. *pl.* 94. TALA & TALAGHAS Zeylonenſium. & *Amm. H. Boſian. pag.* 35. ubi ad Galegam Indicam majorem demandatur. ita ut hujus duae ſint varietates, ſeu, ut alii volunt, ſpecies, major nempe & minor, quod patet ex *Amm. Char. Plant. pag.* 136. ubi Senna Ceylanica hexaphyllos major & minor occurrit. &c. hujus generis characterem exhibet *Linnaeus in char. gener. pl. pag.* 129. Cui ex florum conſenſu, Caſſia, Senna, Chamaecriſta, & Poinciana idem genus eſt.

CAUCALIS Zeylanica, repens, floſculis ſuaverubentibus, *Muſ. Zeyl. pag.* 58. cum qua forte eadem eſt Caucalis, PITTAGHUDDU Zeylonice dicta. *Muſ. Zeyl. pag.* 67.

CEN-

CENTAURIUM minus, Zeylanicum, flore luteo. *Muf. Zeyl. pag.* 36. an Centaurium minus, aureum, flofculis numerofis, Æthiopicum. *Plukn. Almag. p.* 94. *Phyt. Tab.* 275. *Fig.* 3?

CERASUS Zeylanica, farmentofa, amara, capreolata, feu cornigera, cortice odore Cofti, feu violaceo. *Muf. Zeyl. pag.* 9. Cerafi fructu arbor Zeylanica, aegoceratos, cortice Coftum olente HERMANNI apud *Ray tom.* 3. *Dendr. pag.* 45. BUGAETHYAWAEL Zeylonenfibus. Cortex recens Violae Martiae, aut Iridis Florentinae fpirat odorem, & Cofti Indici loco ufurpatur. *Muf. Zeyl.* Ab aliis facile diftinguitur, quod infra furculos floriferos duo habeat cornicula tenuia, deorfum reflexa, & revoluta inftar cornuum arietinorum. *Ray l. cit.*

CERASUS humilis, umbellata, flofculis incarnatis, fructu MORTINGHOS dicto. *Muf. Zeyl. pag.* 3. Cerafus humilis, umbellata, flofculis floccofis, incarnatis, fructu nigro MORTINGHOS dicto. *Muf. Zeyl. pag.* 14. Cerafus Zeylanica, fructu MORTINGHOS dicto maximo, *ibidem. pag.* 53. DAM & DANIGHAS Zeylonenfibus. hujus fructus comeduntur.

CERASUS Zeylanica, fylveftris, fructu nigro MORTINGHOS dicto major. MAHAMADAN Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 65.

CERASUS Zeylanica, fylveftris, fructu nigro MORTINGHOS dicto minor. DANGHEDDI Zeylonenfibus; *Muf. Zeyl. pag.* 65. an Tinûs infra propofitae fpecies hae?

CERATOCEPHALOIDES fubrotundo folio. *Vaill. act. reg. Parif. ann.* 1720. *pag.* 425. quae eft Bidens Indica, Hieracii folio, caule alato. *Tournef. inft. rei herb. pag.* 462. Bellis Zeylanica, aphyllos, foliis crenatis affurgens. *Muf. Zeyl. pag.* 18. an Chryfanthemum caule alato, flore aurantio *ibidem*? & *Parad. Bat. pag.* 125. & in *H. Amft. tom.* 1. *pag.* 5. ubi icones & defcriptiones. Vide & *Plukn. Phyt. Tab.* 84. *Fig.* 3. & *Sloan. Cat. Pl. Jam. pag.* 126. ad Chryfanthemum Cannabinum, Americ. alatum, flore aphyllo globofo, Baccharidis folio. *Breyn Prodr.* 2. *pag.* 32. &c. MUDHAMANA Zeylonenfibus. de cujus fignificatione vide *Muf. Zeyl. pag.* 18.

CERATOCEPHALUS Ballotes foliis, ACMELLA dictus. *Vaill. act. reg. Parif. ann.* 1720. *pag.* 422. ACMELLA & AHAMELLA. *Muf. Zeyl. pag.* 17. Chryfanthemum bidens Zeylanicum, flore luteo, Lamii folio. *Breyn.* Filii in *differt.* de hac planta. Bidens Urticae folio, Lithontriptica, Zeylanica D. *Petr. Hotton Act. Phil. Lond. n.* 268. *pag.* 760. & apud *Ray tom.* 3. *pag.* 226. ubi ejus defcriptio, & ufus ad Calculum & Nephritidem egregius indicatur. Bidens Ceilanica, flore luteo, Meliffae folio, ACMELLA dicta. *Alb. Sebae rerum nat. thef. part.* 1. *Tab.* 10. & *Tab.* 11. alteram ejus vide fpeciem. Senecio Indiae Orientalis Ocymi majoris folio profunde crenato. *Plukn. Phyt. Tab.* 315. *Fig.* 2. *Almag. pag.* 343. Chryfanthemum Orientale bidens, feu bicorne, Ocymi majoris folio profunde crenato, floribus parvis bullalatis aureis. *Plukn. Amalth. pag.* 57. ubi vide reliqua. AKMELLA Zeylonenfibus vocatur ab *Aka*, quo fignificatur illud, quod in extremo pofitum eft, & *Mella* quod morti vicinum eft. Hujus enim flores & femina femper quafi femimortua, flaccida, & emarcida apparent, ut explicatur in *Muf. Zeyl. pag.* 17.

CEREUS fcandens, arboreus, trigonus, fpinis inermibus. *Nobis.* Tithymalus Orientalis arborefcens, triquetrus fpinofus ESULA INDICA BONTII. *Muf. Zeyl. pag.* 56. Efula Indica apud *Bontium* occurrit defcripta & expreffa *lib.* 6. *cap.* 57. *pag.* 153. an Ficoides triangulare articulatum, amplexicaule fpinis brevibus obfitum. *Plukn. Almag. pag.* 148? qui Cereus Peruvianus amplexicaulis articulatus, fructu rotundo maximo, coccineo. *Par. Bat. Pr. pag.* 322. TALUKGHAHA Zeylonenfibus. Cerei charact. invenitur apud *Linnaeum in char. pl. gen. p.* 139. ad CACTUM.

CHAMAELAEA trifolia, aculeata, floribus fpicatis. *Nobis. Tab.* 24. Chamaelaea Zeylanica, trifolia, fpinofa, fructu parvo, tripartito, croceo, fapore dulci & acri *Herb. Hert.* Arbufcula Zeylanica, trifolia, fpinofa, fructu tripartito, parvo croceo, fapore dulci & acri. *Muf. Zeyl. pag.* 22 & 36. Chamaelaea trifolia, fpinofa, & Piper fylveftre *ibidem pag.* 22. Chamaelaea trifolia, fpinofa, Malabarica. *Muf. Petiv. Centur. pag.* 8. *Plukn. Tab.* 95. *Fig.* 5. Kaka-Toddaly *H. Malab. part.* 5. *Tab.* 41. cujus folia in ambitu funt crenata, unde noftrae quodammodo varietas eft. Frutex baccifer, Indicus, fpinofus, trifolius, floribus fpicatis, fructu plano, rotundo, tricocco. *Ray hift. plant. pag.* 1612.

Plukn.



CHAMAELAEA *trifolia, aculeata, floribus spicatis. Nobis.*





CHAMAELAEA *foliis linearibus, flosculis spicatis, echinato fructu. Nobis.*

Plukn. Almag. pag. 202. *Commel. Fl. Malab. pag.* 30. KUDHUMIRIS Zeylonice dicitur, a *Kudhu* ſpina & *Miris* quod Piper denotat, fructus enim Piperis habet acrimoniam, qui vermes enecat & expellit. *Muſ. Zeyl.*

Habet haec arbuſcula caulem viridem, rotundum, aculeis undique obſeſſum, lata baſi albicante provenientibus, & in apicem acutiſſimum reflexum nigrum deſinentibus, e quo folia alternatim eriguntur, longo & valido pediculo, quandoque etiam aculeato innixa, tria numero, bina inferiora ſibi oppoſita; claudente inpari ſummum; quae ſunt ovalia, lanceolata, integra, glabra, ſuperiore laete viridia, inferiore parte pallidiora & fere cinerea. Flores longiſſimis & validiſſimis pediculis, aculeatis quoque proveniunt ſpicati, pentapetali, ſtaminoſi, roſacei, qui fructum dant communiter tricoccum, ſingulo cocco continente ſemen unicum oblongum reniforme. Ludit autem in hiſce aliquando natura, transverſim diſſectis fructibus; inveni quadricapſularem, immo & pentacoccum, ut in *Tabula* etiam *noſtra* notatur. Fructus autem coloris eſt crocei, maculis nigris interpoſitis; ſaporis acerrimi cum quadam dulcedine juncti. Semen colorem habet griſeum, vel cinereum.

CHAMAELAEA foliis linearibus, floſculis ſpicatis, echinato fructu. *Nobis. Tab.* 25. Chamaelaea Zeylanica Eſulae folio anguſto, flore parvo, fructu tripartito. *Herb. Hert.* Tithymalus tenellus, Indicus foliis, Linariae raris. *Muſ. Zeyl. pag.* 32. Ricinoides forte fruteſcens, Linariae foliis obtuſis. *Plumier Catal. pl. Amer. pag.* 20. Cadi-Avanacu. *H. Malab. part.* 2. *Tab.* 34.

Oritur haec planta radice tenuiſſima, fibroſa, nigricante, caulem emittente rotundum, obſcure viridem, cui folia adcreſcunt alterna, ſolitaria, ex tenui & brevi pedunculo orta, glabra, longa, obtuſa, linearia perfecte, ſuperiore parte viridia, inferiore pallentia, in ambitu leviſſimis & tenuiſſimis dentibus ſeu crenulis ſerrata, quae in *H. Malab.* majores exprimuntur. Floſculi ex foliorum alis, interdum ex ipſo ramo, in ortu proveniunt, ſpicati, minimi, examen in ſiccata fugientes planta, arctiſſime cohaerentes. Poſt hos ſequitur fructus rotundo-triangularis, & tricoccos, echinatus, ſeu ſpinulis undique obſeſſus inermibus, continens, tria ſemina oblonga, cinerea, in ſingulo loculo unicum.

CHENOPODIUM incanum, racemofum, folio majore, minori oppofito. *Nobis. Tab.* 26. *Fig.* 1. Atriplex Indica, tomentofa, incana, Majoranae Venetae foliis. *Muf. Zeyl. pag.* 2. Atriplex Indica, tomentofa, racemofa, Vulvariae folio. *ibidem pag.* 33. Atriplex Indica, tomentofa, Majoranae Venetae folio. *Herb. Hert.* an Amaranthus Indiae Orientalis minimus, fupinus, Portulacae folio, floribus in capitulum collectis. *Tournef. inft. pag.* 236.? Amaranthus Alopecuroides Indicus herbaceus Atriplicis folio. *Breyn Prodr.* 2. *pag.* 13. Scheru-Bula. *H. Malab. part.* 10. *Tab.* 29. ubi pro Herniariae fpecie habetur. POLKUDUPALA Zeylonenfibus; a *Polkudu* quo trita medulla, feu nucleus Nucis Indicae *Coccos* dictae defignatur, cui flores nonnihil fimiles funt. *Pala* Blitum feu Amaranthum fignificat.

Cefpitofa haec planta ramos undique per terram difpergit femipedales, flexuofos, tenaces, nec facile fragiles, ad fingula folia floribus fuis ubique ornatos. Folia autem alternatim e caulibus egrediuntur breviffimo innixa pediculo, fere feffilia, oblonga, integra, acuminata, fuperne viridia & glabra, inferne incana & valde lanuginofa, quibus in inferiore ramulorum parte foliolum ut plurimum eft oppofitum, quod in fuperiore ramorum parte definit & quafi evanefcit; Ex ortu foliorum proveniunt flofculi plurimi in racemum oblongum duplicem, aut geminum utcunque collecti, albiffimi, molles & tomento feu lanugine leviffima obducti, tam arcte fibi juncti, ut unum capitulum videantur, qui minimi funt, apetali, caliculis mollibus contenti, piftillum fimplex habentes, qui femen dant unicum, orbiculatum, depreffum, nigrum, fplendens, tenuiffima membranula involutum, unde ad Chenopodium proxime pertinet.

CHENOPODIUM viride, vulgare, Alfines folio. *Nobis. Tab.* 26. *Fig.* 2. Parietaria Zeylanica, vulgaris, Alfines folio. *Herb. Hert.* Parietaria Zeylanica. *Muf. Zeyl. pag.* 30. Blitum forte polygonoides, viride, polyanthos. *Sloan. Cat. pl. Jam. p.* 99. & *Hift. Jam. part.* 1. *p.* 144. *Tab.* 92. *Fig.* 2. vel Blitum vulgare, minus, furrectum. *ibidem Tab.* 3. *Fig.* 2. Caulis hujus plantae eft latus, fimplex, fucculentus, cui folia variae magnitudinis fine ordine adcrefcunt, fubrotunda, integra, viridia utrinque, fubtus venofa; plurima autem minora circa caulem ponuntur, majus inpar claudit reliqua. Flores ex alis foliorum proveniunt fpicatim, fpicis breviffimis, confertim nafcentibus, horum flofculo-

rum



Fig. 1.

Fig. 2.

CHENOPODIUM incanum, racemosum, folio majore, minori opposito. Nobis.

CHENOPODIUM viride, vulgare, Alsines folio. Nobis.

rum calix eſt quinquefidus, ſtamina quinque, piſtillum ſimplex, ſemen dantes unicum globoſum, depreſſum, nitidum, nigrum. unde & haec ad Chenopodia pertinet. Quorum character invenitur ap. *Linnaeum in char. pl. pag.* 67.

CHONDRILLA Zeylanica, minor, marina, folio Sinapios. *Muſ. Zeyl. pag.* 22. KADHUPARA Zeylonenſibus. a *Kadu* quod enſem ſeu gladium notat, cui folia ſunt ſimilia, & *Para* quod verbera, alias viam publicam notat. *ibidem.*

CHRISTOPHORIANA Zeylanica, racemoſa, baccis luteſcentibus. *Hart. in Catal. ſemin.*

CHRYSANTHEMOIDES hirſutum, foliis ſcabris, oblongis, acutis. *Nobis. Tab.* 22. *Fig.* 2. Chryſanthemoides Oſteoſpermon, Zeylanicum, folio rigido, flore luteo. *Herb. Hert.* Monilifera hoc genus a *Vaill.* vocatur in *act. reg. Paris.* 1720. *pag.* 373. ubi notas ejus vide characteriſticas. Elegans hic frutex e trunco ſuo firmo, ſcabro, emittit caules rotundos, leviter ſulcatos, ſcabros & villoſos, quibus folia adcreſcunt brevi ex pedunculo, ſcabra, oblonga, acuminata, bina ſibi invicem oppoſita, ſuperiore parte obſcura, inferiore glauca, nervoſa; flores in ſummitate ramorum gerit elegantes, luteos radiatos, diſco ſulphureo, calice ſquammoſo, diſſecto, contentos, poſt quos ſequuntur ſemina oblonga, lapidea; reliqua vide apud *Vaill.* loco citato. cum hac forte convenit

CHRYSANTHEMI ſeu Bellidis ſpecies folio integro, oblongo. *Muſ. Zeyl. pag.* 12. quae RANWANKIKIRINDI Zeylonice audit a *Ran* quod aurum, *Wan* ſimile notat. Flores enim aurei ſunt coloris.

CHRYSANTHEMUM, quae planta humilis, ramoſa, foliis anguſtis, leviter ſerratis, capitulis aphyllis, capitatis. *Muſ. Zeyl. pag.* 26. an Chryſanthemum parvum, ramoſiſſimum, membranaceo caule Maderaſpatanum *Plukn. Phyt. Tab.* 160. *Fig.* 5. MUDHAMANA Zeylonenſibus.

CHRYSANTHEMUM Indicum minus, *Muſ. Zeyl. pag.* 32. Chryſanthemi ſpecies RANAWAELLA dicta. *ibidem. pag.* 26. *Waiſſunae* Malabaris.

CHRYSANTHEMUM Zeylanicum, foliis guttatis, incisis. *Petiv. hort. sicc.* apud *Ray tom.* 3. *append. pag.* 243. Chrysanthemum Americanum, frutescens, Balsaminae luteae foliis, nigris maculis punctatis. *Plukn. Phyt. Tab.* 161. *Fig.* 1. Chrysanthemum Curassavicum, frutescens, Hyperici foliis, nigris punctis notatis. *Par. Bat. Pr. pag.* 323.

CINNAMOMUM foliis latis, ovatis, frugiferum, *Nobis. Tab.* 27. Cinnamomum, seu Canella Zeylanica *C. B. P. pag.* 408. & *Herb. Herm.* Laurus Zeylanica, glandifera, folio trinervio, optimum & legitimum Cinnamomum ferens. *Mus. Zeyl. pag.* 12. Canella Zeylanica cum fructibus nondum maturis. *ibidem pag.* 37. Pianta della Canella *Acostae edit. Ital. pag.* 2. Cuurudo *Pisonis Mantiss. aromat. pag.* 165. Cassia Cinnanomea *H. L. Bat. pag.* 129. *& in append. pag.* 655. ejus Figura. Arbor Canellifera Zeylanica, cortice acerrimo seu praestantissimo, qui Cinnamomum officinarum *Breyn Prodr.* 2. *pag.* 17. Canella seu Cinnamomum vulgare. *J. B. part.* 1. *lib.* 4. *pag.* 440. vide porro notas ad *H. Malab. part.* 1. *pag.* 110. & *Ray hist. pl. tom.* 2. *pag.* 1559 & 1561. *Samuel Dale Pharmacol. pag.* 385 *& seq.* Canella a *Garzia* vocatur *lib.* 1. *aromat. cap.* 15. *pag.* 55 & *seq.* ubi folii icon pessime exhibetur. &c. KURUDU quod Zeylonice pronunciatur KURUNDU *Mus. Zeyl.* ubi dicitur: Ex radicis cortice destillatur Camphora, ejusque Oleum; Ex trunci cortice, Oleum Cinnamomi, ex foliis, Oleum Caryophyllorum; Ex fructibus Oleum Junipero simile.

Quum Cinnamomi descriptio in *H. Malab.* tam accurata & egregia exhibeatur, & apud alios citatos auctores ejus usus, & modus colligendi abunde inveniatur, de iis, ne nimis exspatier, hic nihil dico, contentus primo exactissimam Zeylonensis dedisse Figuram; notatum autem illud volo, quod haec nostra a Malabarica illa tantum loco natali differat, & multo praestantior sit, ut notat etiam *Clus. in lib.* 1. *Aromat. cap.* 15. ad Canellam & *Acost. arom. lib. cap.* 8. hujus varietates certe multae in India occurrunt, ut etiam notat Clar. *Hermannus* in *H. L. B.* ita ut licet haec nostra *H. Malab.* figurae non respondeat, ipsum tamen & legitimum sit Cinnamomum. *Novem Cinnamomi diversitates* ex sola Zeylona transmissas servo, quae foliatura maxime differunt, quas non exhibeo, quia jam delineatae & descriptae sunt *in appendice ad acta Physico-Medica Acad. Caesar. Leopold. natur. curios. volum.* 1. *ann.* 1727. *pag. in append. quarta*, & *sequentibus.* Sequenti modo ibi distinguuntur & denominantur.

Prima



CINNAMOMUM *foliis latis, ovatis frugiferum. Nobis.*



CINNAMOMUM perpetuo florens, folio tenuiore, acuto. Nobis.

Prima ſpecies vocatur *Raſſe Coronde* ab indigenis, quaſi dicas, acre, ſuave ac dulce Cinnamomum, quod verum & praeſtantiſſimum habetur Cinnamomum a *Nobis. Tab.* 27. expreſſum. *Altera* ſpecies Cinghalenſibus dicitur *Cahette Coronde*, ſive amarum & adſtringens Cinnamomum, quod numero ſecundo in *actis Medicis* delineatum eſt. *Tertiae* ſpeciei Ceilanenſes nomen imponunt *Cappare Coronde*; quod Caphuratum Cinnamomum notat, quia Caphurae ſaporem, odoremque potentiſſimum reddit.

Quarta ſpecies incolis audit *Welle Coronde*, ſive Cinnamomum arenoſum, quia in eo demorſo & manſo quaedam veluti arenulae percipiuntur, etiamſi revera harum penitus ſit expers.

Quintam ſpeciem vocant *Sewel Coronde*. SEWEL autem Ceilanica lingua idem valet, ac ſi diceres mucilaginoſum aut glutinoſum Cinnamomum.

Sextae ſpeciei Ceilanenſes nomen indunt *Nieke Coronde*, quia haec arbor illi, quam *Niekegas* vocant, ſimilis eſt.

Septimae ſpeciei cognomen eſt *Dawel Coronde*, ſive Tympani Cinnamomum, Belg. *Trommel-Caneel.* lignum enim hujus arboris leve, atque tenax ad vaſa & tympana, quae *Dawel* vocant, conficienda adhibetur.

Octava ſpecies inſignitur nomine *Catte Coronde*, CATTE vero Zeylanenſibus idem ſignificat quod SPINA Latinis; truncus enim hujus arboris multis ſpinis horret, unde CINNAMOMUM SPINOSUM dictum.

Nonam ſpeciem appellant *Mael Coronde*, ſive floridum Cinnamomum; quia haec arbor perpetua florum amoenitate viget, & haec proxime accedit illi primae, optimaeque ſpeciei *Raſſe Coronde* dictae, ſed nulli hujus fructus proveniunt, contra atque in laudata prima ſpecie fieri ſolet; cujus ramus florifer ſequenti *noſtrae Tabulae* 28. exhibetur. Commemoratarum autem ſpecierum folia in dictis actis Medicis proponuntur, cum brevi earum deſcriptione. *Cinnamomi* character apud *Linnaeum in char. pl. gener. p.* 120. occurrit. ubi LAURUM, CINNAMOMUM & CAMPHORAM ad idem genus reducit ex florum conſenſu.

CINNAMOMUM perpetuo florens, folio tenuiore, acuto. *Nobis. Tab.* 28. Canella Zeylanica ſylveſtris odore & ſapore Myrrhae, floſculis verticillatis. *Muſ. Zeyl. pag.* 26. ſeu Laurus Zeylanica glandifera, folio trinervio, pallido, Canellae ſimili, odore & ſapore Myrrhae *ibidem*. Caſſia Cinnamomea, Myrrhae odore, folio trinervi ſubtus caeſio, NICA-

DUWALA

DUWALA Cinghalenſibus dicta. *Plukn. Almag. pag.* 89. Arbor Canellifera, ſylveſtris, Zeylanica, odore & ſapore Lauri vel Myrrhae *Breyn Prodr.* 2. *pag.* 18. Canella ſylveſtris, Malabarica. *Ray H. p.* 1562. & *Fl. Malab. pag.* 17. Canella ſive Cinnamomum vulgare, craſſiore cortice. *J. B. tom.* 1. *lib.* 4. *pag.* 451 &c. Katou Karua *H. Malab. part.* 5. *Tab.* 53. quae loco natali tantum a noſtra differt, DAWALKURUNDU & NIKADAWALU Zeylonenſibus. Quum in *Hermanni Herbario* nulla diſtinctio inter hanc & primam quoad nomen occurrebat, anceps haeſi, quodnam legitimum eſſet Cinnamomum. Auctorum vero denominationes & deſcriptiones, ut & Figuras *H. L. Bat.* & *Malab.* accurate perpendens, prius Cinnamomum legitimum & optimum, hoc vilius & ſylveſtre eſſe puto. quod autem huic in *Muſ. Zeyl.* floſculi verticillati adſcribantur, non communi ſenſu Botanico eſt accipiendum, ſcilicet quod flores circa caules in verticillos collectos gerat, ſed verticillatos id eſt in ſummo caulium vel vertice poſitos, ad differentiam primi, quod flores per caules inter folia diſperſos etiam habeat. An bene an male ominatus fuerim, an vero ſit mas & foemina, ſive florifera & frugifera, ut in Lauris quarum hae ſunt proprie ſpecies, obtinet, peritioribus, & qui vivas eas in loco natali aliquando examinabunt, judicandum relinquo. Quidquid ſit; hoc etiam legitimum eſt Cinnamomum, (licet forte non ita praeſtans ac primum,) ut odor ejus aromaticus, gratus, in foliis contritis teſtatur. A Primo hoc differt, quod folia gerat multo minora, anguſtiora, magis acuta, ſubtus caeſia, bina fere ſemper oppoſita. Flores deinde non per caules ſparſos, ſed in ſummo plurimos collectos, qui ſequenti modo proveniunt. E calice tubuloſo, oblongo, unifolio, lappaceo, ore quinquefido oritur petalum unicum, infundibiliforme, quinquefidum, cum ſtaminibus quinque longitudine petali, & piſtillo unico capitato; Fructus dein infra calicem provenit umbilicatus, bacca monoſperma, ſubrotunda. hujus character etiam invenitur apud *Amman. char. pl. pag.* 320.

Praeter memoratas jam ſpecies, aliae inſuper Cinnamomi diverſitates in Zeylona obſervantur, ut patet ex *Muſ. Zeyl. pag.* 12. ubi KURUDU-PAELA occurrit, quod parvum Cinnamomum notat, & KURUDU-AETHA quod Cinnamomum frugiferum ſignificat, forte quod hujus ſint mares & foeminae. Sic a *Grimm. in Laborat. Ceyl. pag.* 84. etiam memoratur Arbor Cinnamomi ſylveſtris a Cinghalenſibus WALKU-RUNDU vocata, a Portugallis *Canell de Matte.* cujus radicis cortex prae-

praeftantiffimum eft Alexipharmacum, attenuans, difcutiens, putrefactioni refiftens, fermentum febrile (ut loquitur) praecipitans, & virtutem fudoriferam poffidens. Cortex hic praebet Sal quoddam volatile Oleofum, quod Myrrhae faporem & odorem habet, & potentius adhuc eft in fupra dictis affectibus. &c. In genere autem de Cinnamomo haec habet: *in Labor. Ceyl. pag.* 56. Arbor Cinnamomi jure merito Regina omnium arborum vocari meretur &c. Ex floribus enim Aqua, Oleum, Spiritus & Conferva penetrantiffima & fummi ufus in arte Medica, producuntur. Folia nihil fere quoad figuram a Laurinis foliis differunt, ex quibus Pulvis Carminativus in Colicae paffionibus, Tympanitide, ad tormina inteftinorum &c. Ex illis etiam aqua, Oleum ftillat. Syrupus, Ol. coct. ad externos ufus optimum praeparatur. Vires dofis, & ufus ad innumeros morbos ibi latius explicantur. Fructus etiam dant aquam & Oleum fortiff. deftil. & coctum, unde Emplaftra, & linimenta penetrantiffima. Spiritus autem harum partium tanquam Balfamum vitae veriffimum ab eo agnofcitur, qui morbis capitis, ftomachi & matricis inprimis infervit, &c. De cortice hujus arboris nil dico, quum apud plures alios auctores, & ipfum vulgum de ejus incomparabilibus virtutibus fatis conftet. Sed praeter haec omnia radix inprimis hujus arboris plurimas offert medicinas, cujus cortex excellentiffimum eft Alexipharmacum, & fudoriferum in morbis venenatis, & malignis efficaciffimum, quae per deftillationem, & praeparationem exhibet aquam, & Oleum Camphorae, immo veram Camphoram. Unde Syrupus Camphor. Sp. Vini Camphor. Balf. fulph. compl. Tinct. Sulphur. Camphor. & Extractum ex radice optimum in fluxu ventris, & fimilibus affectibus proficuum; cujus & Electuarium aliis nempe additis inftar Diafcordii agit, & Diafcordium fpagyricum ab auctore vocatur. Tot tantaeque variae res, & Medicamina ex una hac arbore procedunt, ut jufta fit occafio demirandi, qui fit, ut una haec arbor omnigenas nobis medicinas exhibeat. Quaelibet enim pars fuam profert, & talis eft omnium inter eas differentia, ut qui earum ignarus fuerit, juramentum praeftare facile velit, eas fcilicet ex unica hac arbore provenire non poffe, ut loquitur egregius ille auctor *pag.* 56. ubi ejus praeparationes incipiunt & definunt hujus arboris cum *pag.* 84. Vide & *Philip. Baldeum Hiftor. Ceylon. cap.* 49.

Ignofcite Lectores *B.* quod a fcopo Botanico parum declinaverim, fed eximia nimis, & magis admiranda videbantur, quam ut ficco ita pede haec tranfirem. praefertim cum laudatus hic auctor, & aureus li-

bellus non multis forte notus, & in paucorum manibus verſetur. hujus verus eſt auctor *Grimm*. Suecus, qui diu in Zeylona fuit, licet *Barth. Pielat.* qui latinitate eum, (ut loquitur,) donavit, ejus nomen reticuerit. de quo vide *Act. Lipſiens. ann.* 1682. *pag.* 39.

CLEMATIS Zeylanica HERMANNI. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 46. Flammula, ſive Atragene Zeylanica, ſylveſtris, latifoliae ſimilis. *Breynii ibidem.* & *Sloan. Catal. pl. Jam. pag.* 222. ubi inquiritur, an ſit Clematis latifolia, ſylveſtris, ſive prima *C. B. P.* &c. quae apud *Sloan.* in *Hiſt. Jam. part.* 1. *pag.* 199. *Tab.* 128. *Fig.* 1. & cum reliquis ſuis ſynonymis proponitur *pag.* 84. *Cat. pl. Jam.* ubi ad finem dicitur, in ſylvis vicinas arbores ſcandens, & operiens reperitur. Numero foliorum ſolum ab Europaea differt, quae in Jamaica ſemper terna obſervavi, ideoque, ſi pro diſtincta planta habeatur, per me licebit, quamvis tota facies plantae eadem cum ſuperiori videatur.

Clematis Zeylanica, floribus obſoletis parvis. *Muſ. Zeyl. pag.* 35. Forte eſt Liguſtrum foliis ad internodia ternis, infra deſcriptum & expreſſum.

Clematitis ſpecies radice ampla bulboſa, URULA Zeylonenſibus. *Muſ. Zeyl. pag.* 57.

CLERODENDRON folio lato & acuminato. *Nobis. Tab.* 29. Viburnum Zeylanicum, maximum, conjugato oblongo folio, flore albo. *Herb. Hert.* Arbor Zeylanica, *fortunata* quibusdam dicta. *Muſ. Petiv. no.* 870. Planta fortunata PINNA Zeylonenſibus. *Muſ. Zeyl. pag.* 59. ubi & alia ſpecies proponitur, quae planta infelix, infortunata, ſeu PINNAKOLA Zeylonenſibus dicitur. *Muſ. Zeyl. pag.* 25 & 59. quam in *Herb. Herman.* ſub nomine PINNAKOLA ſeu *infortunata* etiam inveni, ſed ut verum fatear, quae a priori nil niſi folii rotundiore & magis cordata figura differt, caeterum in omnibus eadem. Quaeque foliatura, ſed majore, ut & toto habitu maxime convenit cum *Pluknetii Tab.* 211. *Fig.* 4. ubi vocatur Periclymeni ſimilis, Myrtifolia arbor Maderaspatana. huc & forte ſpectat Arbor Baccifera, flore luteo, monopetalo, difformi, fructu ſphaerico, nigricante, monopyreno. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 170. huc pertinet Peragu *H. Malab. part.* 2. *Tab.* 25. Qui eſt frutex baccifer, Malabaricus, floribus pentapetalis, binis, una bacca nigra in calice ſtelliformiter expanſo. *Ray. hiſt. pag.* 1571. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 31.

Noſtrae



CLERODENDRON *folio lato & acuminato. Nobis.*

Noſtrae plantae rami ſunt obtuſi, tetragoni, ſcabri, folia oppoſita, petiolis longis inſidentia, cordata, venoſa, ſcabra, per marginem integra, inferiora lata, leviter acuminata, ſuperiora prope caulem floriferum anguſtiora, & acutiora.

Florum racemus caulem terminat, qui conſtat ramulo recto cum lateralibus per Dycotomiam diviſis, quibus inſident flores, quorum calix eſt patens, ampliatus, erectus, ſemiquinquefidus, laciniis acuminatis, perpetuus, ad maturitatem fructus excreſcens. Petalum floris eſt unicum, tubo longiſſimo tereti erecto, limbis bilabiatis, galea bifida, reflexa, barba trifida, pendula, ſtamina ſunt quatuor petalo longiora, capillacea, reflexa, & pendula apicibus lateralibus.

Piſtillum floris eſt unicum petalo longius, etiam pendulum & reflexum.

Fructus fit bacca, nucleum continens ſolitarium. Flos hujus plantae cum perſonatis *Tourneforții*, & monopetalis irregularibus *Rivini* convenit, ſed ab omnibus aliis mihi hactenus cognitis plantis differt, unde novum vocabulum graeca denominatione deſumptum, quod latinis *Arborem fortunatam* notat, ipſi indimus, & re vera novum eſt genus. Cujus characterem *Linnaeus in Char. pl. gen. pag.* 186. ſequenti modo definit.

CAL: *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum, laciniis ovato-acutis, tubo corollae latioribus, perſiſtentibus.

COR: Monopetala ringens. *Tubus* tenuis, longus, labium ſuperius concavum, erectum, bifidum, obtuſum. Labium inferius ejusdem longitudinis, tripartitum, reflexum, obtuſum, laciniis omnibus aequalibus.

STAM: *Filamenta* quatuor filiformia, corolla multo longiora, quorum duo breviora; *Antherae* ſimplices.

PIST: *Germen* ſubrotundum. *Stylus* figura, longitudine & ſitu ſtaminum. *Stigma* ſimplex.

PER. *Drupa* ſubrotunda, calici magno inpoſita.

SEM: unicum, ſubrotundum.

COLCHICUM Zeylanicum, flore Violae odore & colore ephemero. *Par. Bat. Pr. pag.* 324. Colchicum Zeylanicum HERMANNI *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 25. Colchicum Zeylanicum, flore ephemero, violaceo, odorato. *Amm H. Boſian pag.* 9. Zedoaria radice rotunda *H. Beaum. pag.* 14. Zedoaria radice rotunda officin. *Breynii* apud *Ray tom.* 3. *pag.* 648. ubi pro Malan-Kua *H. Malab. part.* 11. *Tab.* 9. habetur. quae

apud *Plukn. Almag. pag.* 397. cum Zedoaria rotunda *C. B. P. pag.* 36. jungitur. quae eſt Zedoaria, tuberoſa, nigricans *ejusdem ibidem.* de qua *Samuel Dale in Pharmac. pag.* 328. dicit: Zedoaria longa & rotunda non aliter inter ſeſe differre nobis videntur, quam quod ejusdem radicis partes ſint diverſae. & apud *Ray tom.* 3. *pag.* 561. ex Boccone obſervatione legitur, Colchici radicem ſeu bulbum recentem collo alligatam, ita ut ſupra pectus dependeret, & carnem nudam tangeret, efficax, & ſalutare remedium fuiſſe adverſus peſtem anno 1680. in Germania ſaevientem &c. MAHA-KALUWA Zeylonenſibus. BLOK-ZEDOAR Belgis.

COLOCASIAE ſeu Fabae Ægyptiae, veterum flos *C. B. P. Muſ. Zeyl. pag.* 37. quae eſt Colocaſia, ſeu Faba Ægyptia veterum, Dioſcor. *C. B. Pin. pag.* 196. &c.

COLOCASIA, quod Arum Indicum COLOCASIA dictum, pediculis atris. *Muſ. Zeyl. pag.* 56. Arum Zeylanicum, minus, Colocaſiae facie, pediculis punicantibus. *Par. Bat. Pr. pag.* 314. & *Par. Bat. pag.* 77. Arum Ceylonicum, minus, cauliculis nigricantibus, foliis Colocaſiae ſimilibus. *Cat. Hort. Med. Amſt. pag.* 37. GHAHALA Zeylonenſibus.

COLOCASIA, quod Arum Zeylanicum, minus, cauliculis viridantibus. *Par. Bat. pag.* 77. Arum Ceylonicum, minus, cauliculis viridantibus, foliis Colocaſiae ſimilibus. *J. Commel. Cat. Hort. Med. Amſt. pag.* 37. Arum minus, Nymphaeae foliis eſculentum. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 62. & *Tournef. inſt. pag.* 159.

COLOCASIA, quod Arum maximum, Ceylonicum, radice craſſa, longa, rotunda, geniculata Colocaſiae folio, Wela-Ila. *H. Malab. part.* 13. *nondum edit. in Catal. Hort. Med. Amſt. pag.* 37. & *Fl. Malab. pag.* 9. ubi Arum paluſtre, Malabaricum, folio Nymphaeae, radice arundinacea, vocatur, & in notis ad *H. Malab. part.* 11. *pag.* 43.

COLOCASIA ſtrongylorrhiza, Zeylanica, pediculis & foliorum limbis atro puniceis. *Par. Bat. pag.* 85. Arum maximum, Ceylonicum, cauliculis nigricantibus. *J. Commel. Cat. Hort. Med. Amſt. pag.* 37. Arum maximum, Ægyptiacum, quod vulgo Colocaſia, cauliculis nigricantibus Zeylanicum. *H. L. B. pag.* 60.

COLO-

COLOCASIA WALGHAHALA dicta. *Muf. Zeyl. pag.* 66. an Arum maximum, Ægyptiacum, quod vulgo Colocafia *C. B. P. pag.* 195? cujus in *Sloan. Catal. pl. Jam. pag.* 61. plurima enumerantur fynonyma, & quae a prima citata Colocafia feparatur a *C. B. P. in pag.* 195. Arum Ægyptiacum, Caladium fativum, Kelady. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 8. *cap.* 84.

COLUTEA Indica, humilis, ex qua Indigo folio viridi, *Muf. Zeyl. pag.* 32. & *Par. Bat. Pr. pag.* 325. Colutea Indica, herbacea, ex qua Indigo. *H. L. Bat. pag.* 168. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 21. ubi plura fynonyma. Polygala Indica, ex qua Indigo minor HIN-AWARU Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 93. Ameri *H. Malab. part.* 1. *Tab.* 54. ubi vide notas fubjectas. Anil five Indigo Indica. *Moris hift. part.* 2. *pag.* 202. Anil five Nil Indorum color. *J. B. tom.* 2. *lib.* 22. *pag.* 945. Coachera prima *Pifonis lib.* 4. *pag.* 198. Indicum Tawon Anyl. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 8. *cap.* 29. Sesban Aniliferum, Indicum, Coronillae foliis vel Indigo Indica *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 91. ubi notas vide hujus characterifticas. Coronilla Indica, ex qua Indigo. *Flor. Norimb. p.* 124. vide & *Ray hift. pl. part.* 1. *pag.* 926. & *Act. Phil. Lond. vol.* 22. *no.* 267. *pl.* 57. Ornithopodium Indicum, herbaceum, Coronillae foliis ex qua Indigo. *Hert. Catal. feminum.* Coluteae affinis fruticofa, floribus fpicatis, purpurafcentibus, filiquis incurvis, e cujus tinctura Indigo conficitur. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 141. qui & alia habet fynonyma. AVARU & AWARU Zeylonenfibus, & minor fpecies HIN-AWARU dicitur, quae faepius pro diverfo coelo, & folo differunt, licet revera eaedem fint plantae.

COLUTEA Zeylanica, maxima, filiquofa, tota incana, grano rotundo, globofo, *Muf. Zeyl. pag.* 54. Colutea Zeylanica, marina, foliis argenteis, floribus luteis, filiquis teretibus, articulatis, feminibus globofis, fpadiceis, *Amm. H. Bofian. pag.* 9. vide infra ad CORONILLAM.

COMMELINA paludofa, latifolia. *Nobis. Tab.* 20. *Fig.* 2. Gramen Zeylanicum, latifolium, flore coeruleo, ftellato. *Herb. Herm.* Gramen paludofum, flore coeruleo. *Muf. Zeyl. pag.* 16. & Gramen flore coeruleo, *ibidem pag.* 25. hujus etiam mentio fit in *H. L. Bat. pag.* 232. a *Plumier* in *novis plantar. gener. pag.* 48. novo proponitur nomine in memoriam Clariffimor. COMMELINORUM COMMELINA hoc ge-

 nus.

nus. ubi inter notas characteriſticas dicit, quod flores gerat dipetalos, quum tripetali obſerventur, ut a Clariſſ. *Dillenio* etiam bene notatur in *H. Elth. pag.* 91. ubi tres *Commelinae* ſpecies eleganter delineatae, & depictae habentur. DIAMENERYA haec noſtra Zeylonice dicitur, & a Medicis inter aquea, & refrigerantia numeratur, & ejus ſuccus cum lacte vaccino datus movet urinam, ut notatur in *Muſ. Zeyl. pag.* 16.

Uliginoſa amat haec planta loca, caule innitens fungoſo, glabro, herbaceo, ubi folia emittit, nodoſo, ſeu potius, ubi folia erumpunt, folliculus membranaceus ei circumcreſcit, qui folio pro pediculo inſervit, ex quo illud continuatur, & erigitur, quod ſcabrum eſt, latum & acutum, alternatim proveniens.

Flores in ſummitate proveniunt ex folio lato, concavo, tanquam in concha primo occluſi, aperti dein tenui pediculo ex illo eriguntur coerulei, ſtellati, tripetali, calice tripetalo inſidentes, e cujus medio ſurgit piſtillum, quod deinde abit in fructum membranaceum, triloculare, ſingulo loculo ſemen ſubrotundum continentem.

COMMELINA repens, folio ſubrotundo, obtuſo. *Nobis.* an Commelina procumbens, annua, Saponariae folio. *Dillen. H. Elth. pag.* 93. *Tab.* 78. *Fig.* 89? Ephemerum Indicum, bipetalum, procumbens, obtuſo folio, pediculo alato. *Par. Bat. pag.* 150. & *Ray tom.* 3. *pag.* 566. Ephemerum Benghalenſe, ſerpens, folio ſubrotundo, brevi, phalangoides. *Plukn. Phyt. Tab.* 27. *Fig.* 3. Arundinella, Sayor Bubu *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 10. *cap.* 17. Hujus generis character exacte exhibetur a *Linnaeo in Char. gener. plant. pag.* 11.

CONVOLVULUS Zeylanicus, hirſutus, foliis Pedis Tigridis in modum, ſeu quinque profundas lacinias diviſis. *Muſ. Zeyl. pag.* 12. Convolvulus Indicus, Pes Tigrinus dictus, minor, & hirſutus. *Par. Bat. Pr. pag.* 326. Convolvulus Zeylanicus, villoſus, pentaphyllus, & heptaphyllus, minor, Pes Tigrinus dictus. *H. L. Bat. pag.* 184. ubi ejus deſcriptio, & *pag.* 187. ejus Figura. quae etiam proſtat in *Ephemer. curioſ. anni* 4 & 5ti *pag.* 136. Convolvulus heptaphyllus, Indicus, villoſus. *Breyn. Prodr.* 1 *pag.* 33. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 22. Convolvulus pentaphyllus, hirſutus. *Plumier. Catal. pl. Amer. pag.* 1. Volubilis Zeylanica, Pes Tigrinus dicta *H. Elth. pag.* 429. *Tab.* 318. *Fig.* 411. Pulli-Schovadi. *H. Malab. part.* 11. *Tab.* 59. DUVIPAHURU

&

& DUVIPASSURI Zeylonenfibus, a *Duvi*, quod Tigrim, & *Pail*, quod pedem notat. Folia enim Tigridis pedem referunt.

CONVOLVULUS Indicus, Pes Tigrinus dictus, major, & glaber. *Par. Bat. Pr. pag.* 327. an Convolvulus quinquefolius, glaber, Americanus *Plukn. Phyt. Tab.* 167. *Fig.* 6? qui eft Convolvulus, pentaphyllus, folio glabro, dentato, viticulis hirfutis. *Plum. Cat. pl. Amer. pag.* 1. varias Convolvuli fpecies habet *Rumph. in Herb. Ambon. lib.* 9. *cap.* 55. ad 60.

CONVOLVULUS Zeylanicus, alatus, maximus, foliis Ibifco non nihil fimilibus, angulofis. *H. L. Bat. pag.* 177. & *feq.* ubi defcriptio, & elegans Figura. Turbith Arabum legitimum, & officinarum, *Muf. Zeyl. pag.* 26. Turpethum repens folio Althaeae, vel Indicum *C. B. P. pag.* 109. Turbith Officinarum & Garciae atque Acoftae apud *Breyn Prodr.* 2. *pag.* 101. Turpetum verum, feu album Cleyeri *ibidem* & apud *Plukn. Mantiff. pag.* 53. ubi inquiritur, an veteribus Graecis notum & variae de hujus radice opiniones proponuntur. Convolvulus Indicus, ampliffimo fubrotundo folio, caule alato, Turbith feu Tiguar Garciae quibusdam putatus. *Ray tom.* 3. *pag.* 373. vide & *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 56. ad Convolvulum Althaeae folio Clufii &c.
Turbith TIRASTAWALU *Grimm. Labor. Ceyl. pag.* 122. ubi haec habet: Colligitur etiam extra Columbo, crefcit non fecus ac CONVOLVULUS. Folia ipfius Malvae funt fimilia, fubtusque contacta lenia fentiuntur. Semen etiam veluti arbor Belgice WINDE, Gallice *Lifet* dicta, continet, eft rotundum atque nigrum, inftar grani Piperis in certis quibusdam loculis inclufum jacens. Radix mediocriter eft longa, contorta, & refinofa, de cujus virtutibus vide *Samuel Dale Pharmacol. pag.* 257. & *Cluf. exot. cap.* 36. *lib.* 1. *pag.* 206. TIRASTAWALU Zeylonice audit.

CONVOLVULUS lactefcens, KIRIMANDI dictus. *Muf. Zeyl. pag.* 45.

CONVOLVULUS maritimus, Zeylanicus, folio craffo, cordiformi. *H. L. Bat. pag.* 174. ubi icon & defcriptio. *Commel. Fl. Malab. pag.* 22. & *Par. Bat. Pr. pag.* 325. Convolvulus maritimus, Zeylanicus, folio craffo, cordiformi, flore rofeo. *Muf. Zeyl. pag.* 55. Convolvulus maritimus, Zeylanicus, folio craffo, bifido, feu cordato. *Herm. Flor. Lugd. Bat. pag.* 75. Convolvulus, marinus, catharticus, folio rotundo, *Plum. Sloan.*

Cat.

Cat. pl. Jam. pag. 57. & *Hist. Jam. part.* 1. *pag.* 155. *Plumier. Catal. pl. Amer. pag.* 1. Soldanella Malabarica, cordato folio. *Petiv. Muf. no.* 98. Schovanna-Adamboe. *H. Malab. part.* 11. *Tab.* 57. vide porro *Ray tom.* 2. *pag.* 188. & *tom.* 3. *pag.* 371. ut & *Plukn. Phyt. Tab.* 24. *Fig.* 4. BINTAMBURU Zeylonenfibus.

Convolvulus marinus, Indicus, repens, macrorizos, folio bifido, craffo, flore rofeo, amplo, BINTAMBURUWAEL Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 39. Convolvulus Zeylanicus, terreftris, flore amplo, radice Salfaeparillae fimili, gummofa. *Muf. Zeyl. pag.* 61. varietas haec eft Convolvuli maritimi folio craffo cordiformi &c. ut patet, fi hujus defcriptio in *H. L. Bat.* facta, cum illa comparetur.

Convolvulus Zeylanicus, gracilis, tenuifolius APAS & APATHUAETHA Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 39.

Convolvulus Indicus, Cantabricae folio latiori, floribus albis. *Muf. Zeyl. pag.* 43. Phafeolus fylvaticus, paludofus. *ibidem.* APAHU Zeylonice.

Convolvuli latifolii fpecies PATIPALAE dicti *Muf. Zeyl. pag.* 44 & 60.

Convolvulus Zeylanicus, medius, femine hirfuto GHIRITILLA Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 52. Convolvulus fructu carnofo GHIRITILLA dictus. *ibidem pag.* 53.

Convolvulus Zeylanicus, idem, major, femine glabro. *Muf. Zeyl. pag.* 52.

Convolvulus Zeyl. idem, maximus, femine hirfuto. *ibidem.*

Convolvulus Zeyl. maximus, femine hirfuto, alato. *ibidem.*

Convolvulus Zeyl. idem, minimus, femine hirfuto. *ibidem.*

Convolvulus Zeyl. idem, major, femine hirfuto. *ibidem pag.* 53.

Convolvulus Zeyl. idem, medius, hirfutiffimus. *ibidem.*

Convolvulus Indicus, maximus, capreolatus, tuberofus, foliis profunde incifis feu tripartitis. *Muf. Zeyl. pag.* 63. Modecca. *H. Malab. part.* 8. *Tab.* 20. Flos paffionis fpurius, Malabaricus, quinquefido folio primus,

mus, five fpinofus, fructu rotundo. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 48. ubi vide notas characterifticas. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 29. Modecca fructu majore, flore ex albo flavefcente. *Par. Bat. Pr. pag.* 354.

CONVOLVULUS Indicus, capreolis donatus, foliis Bryoniae albae divifuris, Sandaracae colorem referentibus, floribus ftriatis, per limbum flavis, & in collo ex viridi albicantibus, Kindici-Valli. *H. Malab. part.* 8. *Tab.* 27. TODWALLEWEL Zeylonenfibus dictus. *Plukn. Mantiff. pag.* 55.

CONVOLVULUS Zeylanicus, folio fagittato. *Muf. Zeyl. pag.* 64. Convolvulus Sagittariae folio, flore purpureo. *Plukn. Phyt. Tab.* 85. *Fig.* 3. Tala-Neli *H. Malab. part.* 11. *Tab.* 55. ubi in notis, Convolvulus Malabaricus, angufto folio, flore variegato, vocatur. vide & *Fl. Malab. pag.* 22. an Convolvulus minimus, angufto, auriculato folio. *Boccon. Muf. Tab.* 33? qui eft Convolvulus Graecus, Sagittae foliis, flore albo *Tournef. Cor. pag.* 1.

CONVOLVULUS Zeylanicus, hirfutus, folio Hepaticae trilobatae, floribus pluribus in capitulo junctis. *Par. Bat. Pr. pag.* 327. Convolvulus Zeylanicus, hirfutus, folio Hepaticae nobilis. *Muf. Zeyl. pag.* 65. & *Par. Bat. App. pag.* 6. Convolvulus Indicus, villofus, Hederae folio tripartito, flore coeruleo. *H. L. Bat. pag.* 182. ubi ejus defcriptio. Convolvulus folio hederaceo, angulofo, lanuginofo, flore magno, coeruleo, patulo. *Sloan. Catal. pl. Jam. pag.* 56. ubi plurima habet fynonyma.

CONVOLVULUS folio pilofo, BOMI Zeylonenfibus dictus. *Muf. Zeyl. pag.* 26. an Convolvulus Jamaïcenfis, trilobatus, foliis tomentofa lanugine denfiori & leviffima utrinque obductis, flore peramoene purpureo? *Pluknet. Phyt. Tab.* 167. *Fig.* 4. qui eft Convolvulus folio lanato, in tres lacinias divifo, flore oblongo purpureo. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 55.

CONVOLVULUS Zeylanicus, major, folio fubrotundo, cauliculis fpinulis inermibus obfeffis. *Nobis.* ex feminibus Ceylon: nobis ante duos annos progerminavit. Folia funt inftar Convolvuli vulgaris majoris, caules fpinulis albicantibus hinc inde obfiti, flores non dedit. a *Pluknetio* in omnibus huic conveniens, & ut puto, idem exprimitur in *Phyt. Tab.* 276. *Fig.* 3. qui eft Convolvulus Americanus, fubrotundis foliis,

viticulis ſpinoſis in *Almag. pag.* 115. ubi reliqua ejus inveniuntur ſynonyma & ſingularis virtus ad Luem Veneream. in *Mantiſſ.* vero vocatur Convolvulus maximus, caule ſpinulis obtuſis obſito, flore albo, folio hederaceo, anguloſo. *pag.* 54.

Convolvulus flore minore, lacteo, fundo atro rubente. *Dillen. H. Elth. pag.* 98. *Tab:* 83. Convolvulus Zeylanicus, folio Aſari, flore albo, macula purpurea notato. *ibidem.* Convolvulus Scammonii folio, ſubrotundo, flore albo, umbone nigro, Curaſſavicus. *Par. Bat. App. pag.* 6.

Convolvulus Zeylanicus, folio ſerrato, flore parvo, albo, macula purpurea notato. *Hert. Catal. ſemin.* Convolvuli characterem vide apud *Linnaeum in Char. gen. pl. pag.* 47.

An Convolvuli ſpecies alia? *Muſ. Zeyl. pag.* 27. quae eſt planta ſcandens, folio Convolvuli obtuſo, umbilicato. *ibidem. pag.* 21. KAHIPISSAN Zeylonenſibus. *Kahi* tuſſim notat, *Piſſan* fatuum. ſuccus enim foliorum aquae inſtillatus facit eam quaſi molliter concreſcere ad formam Ficus Indicae *Piſſan* vocatae. *Muſ. Zeyl. pag.* 21. quod optimum ſine dubio ad tuſſim eſt remedium, unde & dubito, an non haec ſit illa Smilacis ſpecies, cujus radix *Hermanno* per excellentiam Aſthmatica vocatur, quam vide infra ad Smilacem.

CONYZA arbor Zeylonenſis, ſubrotundo folio, maxime tomentoſo. *Plukn. Amalth. pag.* 64. an Conyza arbor, Helenoides, ſive Inſulae St. Helenae, Salviae crenatis foliis, prona parte alba lanugine incanis, Balſamifera? *Plukn. Mantiſſ. pag.* 56.

Conyza Indica, villoſa, mollis, odorata, acris, flore purpureo pappoſo, DADHAKAEHAEL Zeylonenſibus. *Muſ. Zeyl. pag.* 41.

CORALLODENDRON triphyllum, Americanum, ſpinoſum, flore ruberrimo. *Tourneſ. inſt. pag.* 661. Siliqua ſylveſtris, ſpinoſa, Arbor Indica, CORALL dicta, fructu rubicundo. *Muſ. Zeyl. pag.* 49. & *C. B. P. pag.* 402. Coral arbor ſpinoſa, Orientalis, fructu obſcure rubente. *Par. Bat. Pr. pag.* 327. *Commel. Fl. Malab. pag.* 23. Arbor Corall *H. Amſt. part.* 1. *pag.* 211. quem vide, ut & notas ad *H. Malab. part.* 6. *Tab.* 7. ubi Mouricu vocatur. Arbor fabifera, *Boa Tincking*

dicta

dicta *Bontii pag.* 134. & *H. Beaum. pag.* 14. Gelala littorea, Gelala-pantey. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 3. *cap.* 33. Phaseolis accedens *Corall* arbor, spinosa, Orientalis, fructu obscure rubente. *Plukn. Almag. pag.* 293. ubi vide reliqua ejus synonyma; nec non apud *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 142. ad Corall arbor *Clusii hist. rar. pl. append. pag.* 253. ERABUDU & ERABUDUGHAHA Zeylonensibus. Haec species est spinis ex albo virentibus, & seminibus rubentibus. quae Corallina Ceylanica, & Javanica vocatur ab *Amman. in Hort. Bosian. pag.* 9. ubi haec addit. Sunt arbores peregrinae, spinosae, semina in siliquis oblongo-rotunda ferentes, quae habent colorem quodammodo Corallorum, quem *Clusius pag.* 253. cum *Ferrario* in *cultur. pag.* 380. ob denegatam autopsiam floribus perperam tribuit. Caeterum Figura Clusii cum arbore nostra Ceylanica exacte convenit. *Amm.*

Corallodendron triphyllum, Americanum, minus, spinis, & seminibus nigricantibus. *Tournef. inst. pag.* 661. Corall arbor spinosa, seminibus & spinis nigricantibus. *Par. Bat. Pr. pag.* 327. Corall arbor, siliquosa, minor, spinis, & seminibus nigricantibus. *H. L. Bat. pag.* 189. Gelala Itam *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 3. *cap.* 35. Phaseolis accedens utriusque Indiae, *Corall* angustifolia, spinosissima, fructu tenuiore, atro-nitente. *Plukn. Almag. pag.* 293. ubi vide reliqua ut & *Ray. hist. pag.* 1736. JACERABUDU haec Zeylonensibus dicitur.

CORCHORUS, quod Erysimum latifolium, Sesami siliquis. *Mus. Zeyl. pag.* 31.

Corchorus folio auriculato, rotundiore, Zeylanicus. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 36. Alceae cibariae affinis, Orientalis, brevioribus foliis, flore flavo, fructu caryophylloide, longiori. *Plukn. Almag. pag.* 18.

COR INDUM, sive Halicacabum peregrinum, minus. *H. L. Bat. pag.* 190. Corindum folio & fructu minore. *Tournef. inst. pag.* 431. Pisum vesicarium, fructu nigro macula alba notato, Indicum. *Mus. Zeyl. pag.* 5. & *Herb. Herm.* Pisum Cordatum. *H. Eyst. Æst. ord.* 13. *Fol.* 11. *Fig.* 1. Halicacabus peregrinus Utta Malu. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 10. *cap.* 44. Halicacabum Indicum, tricoccon, fructu nigro, minore, Lunula alba signato. *Plukn. Almag. pag.* 120. Pisum decimum, sive vesicarium fructu nigro, alba macula notato. *C. B. P. pag.* 343. & *Sloan. Cat. pl. Jam.*

pag. 110. ubi plurima hujus occurrunt fynonyma. vide & *Hift. Jam. part.* 1. *pag.* 238. PENALA Zeylonenfibus. Ex hujus foliis incolae lavamen conficiunt, quo capitis dolorem, ac ardorem fedare contendunt. *Muf. Zeyl. pag.* 5.

Cor Indum, ampliore folio, fructu majore. *Tournef. inft. pag.* 431. & *Fl. Malab. pag.* 23. Cor Indum, five Halicacabum, peregrinum, fructu majore. *Plukn. Almag. pag.* 120. Pifum veficarium, fructu nigro, macula alba notato, majus. *Muf. Zeyl. pag.* 42. Ulinja *H. Malab. part.* 8. *Tab.* 28. MAHAPENALA Zeylonenfibus. *Maha* majus notat. Characterem hujus generis vide apud *Amm. Ch. pl. pag.* 518 & 519. *Tournef. pag.* 431. & *Linnaeum in char. gen. pl. pag.* 117. ubi *Cardiofpermum* optime vocatur.

CORNUS Zeylanica, KIRIWALLA dicta. *Muf. Zeyl. pag.* 65.

Cornus fylveftris, foliis croceum colorem tingentibus, flofculis ad foliorum alas globofis. *Nobis. Tab.* 30. Rhamnus Zeylanicus, baccifer, foliis conjugatis, floribus coeruleis, WALIKAHA Cinghalenfibus. *Herb. Hert.* Crocus Zeylanicus, fylvaticus, feu arbor WALIKAHU *Muf. Zeyl. pag.* 7. Arbufcula Zeylanica, baccifera, cujus folia Croci vires fupplent. *ibidem pag.* 4. WALIKAHA Zeylonice dicitur a *Wali*, quod arenam notat, & *Kaha* quod Crocum, quafi Crocus arenofus. Crefcunt autem hae arbufculae locis arenofis, quarum folia ficcata ex viridi in croceum transmutantur colorem, vicemque Croci incolis fupplent. *Muf. Zeyl. pag.* 4.

Caulis hujus arbufculae eft teres, anguftus, fecundum annos genicula gerens, flexilis, albicans, folia dans oppofita, ovata, integerrima, utrinque glabra, petiolis bilinealibus affixa; in fingula ala prodit petiolus femiuncialis, flores plurimos fuftentans; quorum calix eft minutiffimus, femiquadrifidus, obtufus, patulus; petala florum quatuor minima; ftamina itidem quatuor, & piftillum unicum. Fructus, qui bacca eft, deeft noftrae plantae.

Cornus Zeylanica, fylveftris, altera KORAKAHA dicta. *Nobis. Tab.* 31. Crocus Zeylanica, arbor fylveftris, KORAKAHA dicta. *Herb. Herm.* Crocus Zeylanicus, alter, fylvaticus, feu arbor KORRAKAHU. *Muf. Zeyl. pag.* 40.

Ex trunco hujus arboris rami provenientes cortice cinereo in validioribus,



CORNUS sylvestris, foliis croceum colorem tingentibus flosculis ad foliorum alas globosis. Nobis.



CORNUS *Zeylanica*, *sylvestris*, *altera* KORAKAHA *dicta. Nobis*.



CORONILLA *Zeylanica, herbacea, flore purpuraſcente.*

ribus, in tenerioribus albicante teguntur, qui in infima parte, ubi nulla locantur folia, flores fuos gerunt collectos, in umbellas parvas quafi difpofitos, ex uno centro fingula umbellula proveniente. Flores tenuiffimis oriuntur pediculis, calicibus quadrifoliis contenti, dum claufi; fphaerica forma, aperti vero ftellati, ex quatuor foliolis cum quatuor longiffimis ftaminibus, in fummo apices flavos habentibus, conftant, quid porro de fructibus fit, qui defunt, nihil determino. Ad medium circiter ramorum, ubi hi flofculi definunt, ramificationes duae foliofae proveniunt, e quibus folia proveniunt bina femper oppofita, ovalia, glabra, viridia, brevibus, nigricantibus pediculis innixa, quae an croceum etiam tingant colorem, & ejus loco ufurpentur, ut in antecedenti fpecie, dubito, quum nulla hujus fiat mentio, & aquae ferventi infufa colorem fuum retinent, nec aquam tingunt. Crocus tamen fylveftris arbor ab *Hermanno* vocatur, ob fimilitudinem forte, quam cum altera habet fpecie, hujus generis characterem vide apud *Linnaeum in charact. gener. plant. pag.* 29.

CORONILLA Zeylanica, argentea, tota. *Boerh. Ind. H. L. B. tom.* 2. *pag.* 50. Colutea Zeylanica, argentea, tota. *H. L. Bat. pag.* 169. ubi icon & defcriptio. Colutea Zeylanica, argentea, latifolia. *Par. Bat. Pr. pag.* 325. *Muf. Zeyl. pag.* 11 & 31. *Amm. Char. pl. pag.* 137. Ervum, five Orobus arborefcens, incanus, Glycyrrhizae folio, flore luteo, fpicato. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 43. MUNDAMURUNGHOS, quae Colutea Indica, marina, tota argentea, filiquis teretibus, articulatis, feminibus globofis. *Amm. Char. plant. pag.* 480. MUNDUMURUNGHU Zeylonenfibus. a *Mundu* quod notat mare. *Murunghu* eft alia arbor, ut notatur in *Muf. Zeyl. pag.* 11.

CORONILLA Zeylanica, herbacea, flore purpurafcente. *Herb. Hert. Tab.* 32. cum qua convenire videtur Coronilla Cretica, herbacea, flore parvo, purpurafcente. *Tournef. Corolar. pag.* 44.
Ramofa haec admodum eft planta, caules gerens rotundos, virides, lignofos, glabros, quibus folia brevibus innixa pediculis adcrefcunt, glabra, oblonga, integra, viridia, eleganter cancellata, bina oppofita, in impar definentia: Flores ex adverfo, ubi foliorum rachis provenit, oriuntur fpicati, longiffimo pedunculo adunati, ex brevi autem dependentes, bini utcunque ex uno puncto provenientes, qui parvi funt, purpurei, papilionacei, calice fat magno, quinquefido con-

 tenti,

tenti, poſt quos ſiliquae propullulant glabrae, tenues, teretes, in apices acutiſſimos deſinentes, ſemina parva, reniformia, oblonga, fuſca, continentes.

Coronilla Zeylanica, ſiliquis fuſcis, hirſutis, piloſis, flore albo. *Herb. Hert. Tab.* 33. Colutea Indica, platycarpos, flore albo, amplo. *Muſ. Zeyl. pag.* 54. PETAN Zeylonenſibus.

Singularis haec Coronillae ſpecies, itidem ramoſa eſt, caules emittens rotundos, lignoſos, virides, & hirſutos, quibus foliorum raches vario modo & ordine adcreſcunt, quae folia gerunt bina ſibi oppoſita, inpare claudente, ſeſſilia fere, glabra, oblonga, obtuſa, ſuperiore parte viridia, inferiore pallida, ſtriata, per dorſum coſta validiſſima decurrente. Ramorum ſummum terminant flores, qui hinc inde in longiſſima ſpica, interpoſito aliquando folioſo rachi, proveniunt, in ſummo autem collecti frequentiores progerminant; ſunt autem ſatis ampli & plani, albicantes, calicibus magnis, profunde diſſectis, hirſutiſſimis contenti, qui totum fere florem ambiunt, ſeu complectuntur, unde ejus figura non ita clare in tabula conſpici poteſt. Poſt flores ſequuntur ſiliquae planae, latae, incurvae, ſeu carinatae, & articulatae, fuſcae, ſericeae, piloſiſſimae, in ſingula diſtincta ſua thecula, ſeu in ſingulo loculo ſemen oblongum, glabrum continentes.

Coronilla Zeylanica, ſiliquis fuſcis, hirſutis, piloſis, flore purpuraſcente. *Nobis.* ſeu Colutea Zeylanica, flore purpuraſcente, ſiliqua hirſuta. *Herb. Herm.* Prioris haec varietas videtur.

COSTUS Indicus, Violae Martiae odore. *Muſ. Zeyl. pag.* 58. qui eſt Coſtus *Linnaei* in tractatu de *Muſa Cliffort. pag.* 14. & eſt Tsjana-Kua *H. Malab part.* 11. *Tab.* 8. cujus character a Linnaeo loco cit. exacte recenſetur. De Coſto autem vide *Cluſii lib.* 1. *aromat. cap.* 35. & *Samuel Dale in Pharmacol. pag.* 329. haec habet, ubi tres enumerat ſpecies. Arabicum, Amarum & Dulcem, ſed juxta *Bontium* monet, unam eandemque eſſe radicem, ſolummodo loco, aetate, aut corruptione differentem, recentem ſcilicet & incorruptam eſſe dulcem, & candidam; corruptam vero amaram, & nigricantem &c. Synonyma itaque Coſti facit, Coſtus Arabicus Dioſcoridis *C. B. P. pag.* 36. & Coſtus Iridem redolens *ejusdem.* Coſtus amarus Officinarum, ſeu Helenium, & CumageniumDioſcoridis *C. B. P. pag.* 37.

Coſtus



CORONILLA *Zeylanica, siliquis fuscis, hirsutis, pilosis, flore albo.*

Coftus dulcis officinar. Centaurio magno cognatus *ejusdem. in Theat. Botan. p.* 670. Coftus Helenii facie officinarum. *J. B. tom.* 1. *lib.* 19. *pag.* 751. Coftus dulcis officinarum *ejusdem.* Coftus Indicus, odoratus. *Ger.* & Coftus Indicus Clufii *Park. Theat. pag.* 1582. Tsjanakua *H. Malab.* &c. ubi porro radicis defcriptionem & ufum addit. Vide & *Commel. Fl. Malab. pag.* 23.

CRISTA PAVONIS flore elegantiffimo, variegato. *Nobis.* Frutex Pavoninus, five Crifta Pavonis, *Breynii Cent. pag.* 61. ubi defcriptio, & elegans Figura. vide & ejus *Prodr.* 1. *pag.* 35. Crifta Pavonis, Bonga Merak. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 6. *cap.* 25. Crifta Pavonis, Coronillae folio, prima, five floribus fpicatis, ampliffimis, ex aureo & coccineo variegatis, filiqua Pifi. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 37. hujus elegans Figura exhibetur a *Merian. infect. Surin. Tab.* 45. Quae eft Crifta Pavonis, flore albo ex Surinama. *Amm. H. Bofian. pag.* 9. ubi male dicitur, quod ob floris fimilitudinem caudae, (fed criftae) pavoninae, a Ceylonenfibus MONARAKUDHUMBYA vocetur. Poinciana flore pulcherrimo. *Tournef. inft. pag.* 619. Sena fpuria, arborea, fpinofa, foliis alatis, ramofis, feu decompofitis, flore ex luteo & rubro, fpeciofo. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 149. & *Hift. Jam. part.* 2. *pag.* 49. Colutea Indica, platycarpos, flore pavonino, feu flos Indicus, pavoninus. *Muf. Zeyl. pag.* 39. Planta tricapfularis, floribus criftatis. MONARAPAHUA, & MONARAHUDHIBBYA Zeylonenfibus. *ibidem. pag.* 12. Acacia Orientalis, gloriofa, Coluteae foliis, rachi medio ad genicula folummodo fpinis gemellis aculeata. *Plukn. Almag. pag* 5. Erythroxylum Indicum, minus fpinofum, Coluteae foliis, filiquis anguftioribus, flore ex luteo & rubro eleganter variegato. *Par. Bat. Pr. pag.* 333. Tsjetti Mandaru *H. Malab. part.* 6. *Tab.* 1. Sed quae fpinis, (incuria forte omiffis,) vidua eft. MONARAMAL Zeylonenfibus, quod dicitur a *Monara* quod Pavonem, & *Mal* quod florem notat. MONARAKUDHUMBYA etiam vocatur, a *Monara* Pavone, & *Kudhumbya* quod criftam, quam in capite gerunt, denotat, quia florum ftamina hanc repraefentant, ut notatur in *Muf. Zeyl. pag.* 39. *Foula de Pavan.* feu flos pavoninus Lufitanis audit. Hujus in *Herbario Hermanni* elegans fervo fpecimen, quod infculpi non curavi, quum faepius jam bene expreffum fit, & a *Breynio* optime etiam defcriptum.

CRISTA PAVONIS arbor, foliis fubrotundis, alternis, flore fpicato, pentape-

tapetalo, flavo, lobis longis, fructu orbiculato, coccineo. *Nobis.* Crista Pavonis Glycyrrhizae folio, maxima, Indica, flore subluteo, minimo, spicato, siliquis angustis, longissimis, ubi semina occultantur, protuberantibus, semine orbiculato, compresso, sanguineo, *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 38. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 24. Phaseolus alatus arboreus, fructu orbiculato, compresso, coccineo. *H. L. Bat. pag.* 495. MANDATHYA Cinghalensium, qui Phaseolus arboreus, alatus, fructu prorsus coccineo, orbiculato, compresso. *Amm. H. Bosian. pag.* 21. Arbor siliquosa, Indica, flore spicato, pentapetalo, siliquis longis, nodosis, fabis coccineis. *Ray. hist. p.* 1752. Arbor Indica, pisa rotunda, compressa, coccinea, in lobis fuscis, parvis, articulatis, gerens. *Mus. Zeyl. pag.* 21. Phaseolus alatus, arbor Indica, fructu coccineo fere orbiculari, medio utrinque tumido. *Plukn. Almag. pag.* 294. Mandsjadi *H. Malab. part.* 6. *Tab.* 14. ubi vide notas. MANDATHYA seu MARA ut & MANGILI Zeylonensibus, quod vulgo *Madathya*, quo certa ponderis species, *Mangili* vocata, denotatur, quod arboris hujus fructus supplent: hinc aurifices his utuntur loco ponderum, semina quoque tota comeduntur, ut Castaneae in Europa. *Mus. Zeyl. pag.* 21. *Breynius* recte hanc ex Phaseolis exclusit, cum flores, folia, immo tota plantae forma ab illis differant, notas autem character. quas huic generi Cristae Pavonis tribuit, vide in ejus *Prodr.* 2. *pag.* 38. Licet hae arbores juxta *Breynium Cristae Pavonis* dictae, non ita accurate in omnibus sibi conveniant, ad unum tamen genus, & ultimum quod *Hermannus Phaseolum alatum* vocavit, hic retinuimus; quum alios *Phaseolos* infra ad *Lentes* locatos ab his *Cristae Pavonis* speciebus *Breynii* separavimus: quae vero a summis Botanicis, *Hermanno*, *Boerhavio*, *Pluknetio* & aliis ad ACACIAS relatae fuerint, quorum vestigia premens, & illas ad ACACIAS supra memoravi: licet juxta *Tournefort.* ad POINCIANAM, vel hic melius locatae fuissent, quum hujus videantur species.

CROTALARIA Asiatica, floribus luteis, folio singulari, cordiformi. *H. L. Bat. pag.* 200. ubi icon & descriptio *Plukn. Almag. pag.* 122. Crotalaria major, prima species, Kering Keringam. *Rumph. Herb. Ambon lib.* 8. *cap.* 65. Genista Indica, folio simplici, glabro, cordato, siliquis glabris, flore luteo. *Mus. Zeyl. pag.* 20. Genistella Indica, major, Salicis folio, glabro, obtuso, cordiformi, flore luteo, minore. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 50. Tandale-Cotti. *H. Malab. part.* 9. *Tab.*



CROTALARIA *foliis solitariis, ovato-acutis, caule sulcato. Nobis.*

Tab. 25. Genifta Malabarica, folio fingulari, floribus luteis, filiquis bullatis. *Commel. ibid. in notis pag.* 46. & *Fl. Malab. p.* 33. JACBE-RYA & ANDANAHIRYA Zeylonenfibus. *Jacca* Diaboli nomen eft. *Berya* fonitum edere aut fibilum. Herba Daemonica eft, cujus filiquarum ope Cinghalenfes credunt diabolum ad interrogata refpondere: Nam hae per maturitatem ficcatae, & induratae leviffimo etiam vento commoventur, ac ob femina leviffima petiolis quafi in bilance dependentia, filiquarum parietes ferientia, crepant, ac fonitum edunt, ut notatur in *Muf. Zeyl. pag.* 20.

Crotalaria Afiatica, folio fingulari, verrucofo, floribus coeruleis. *H. L. Bat. pag.* 198. ubi icon & defcriptio. & *Herb. Herm.* cujus figuram daremus, fi non optime & accuratiffime in *H. Malab.* effet expreffa, illa autem *H. L. Bat.* minime valet, folia enim funt nimis acuta, & auriculae foliorum etiam vitiofe exprimuntur; fed illa *H. Malab.* in omnibus plantae noftrae exacte convenit, infculpta autem eft *Tab.* 29. *part.* 9. vocata Pee-Tandale-Cotti. & a *Commel.* in notis; Genifta Indica, Alni folio, floribus coeruleis, filiquis bullatis. *ibidem. pag.* 53. & *Fl. Malab. pag.* 32. Geniftella major, Indica, Alni folio, flore coeruleo, fpicato, *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 50. &c.

Crotalaria foliis folitariis, ovato-acutis, caule fulcato. *Nobis. Tab.* 34. Crotalaria Afiatica, folio fingulari, floribus coeruleis. *Herb. Hert.* Genifta Indica, rotundifolia, fpicata, coerulea, filiquis hirfutis, bullatis, JAKWANOSSA Zeylonenfibus. *Herb. Herm.* Genifta Indica, folio fimplici, crifpo, floribus coeruleis, filiquis bullatis. *Muf. Zeyl. pag.* 65. ubi JACBERYA Zeylonice vocatur, quod nomen genericum *Crotalariae* eft. Ab illa *H. L. Bat.* & *Malab.* haec planta multum differt, folia gerens acutiora, minora, ut & flores multo minores, ut & tota forma minor, & tenerior; ut ambae, quas fervo, plantae inter fe comparatae liquido oftendunt. Caule haec itidem fulcato provenit, quadrangulari, leviter hirfuto, viridi, e quo folia folitaria, dilute viridia, oblonga, acuta, tenui fuftentata pediculo, alternatim proveniunt, ad quorum ortum foliola auriculata utcunque ponuntur, non ita conftanter, nec tanta, ut in antecedente fpecie. Flores in fpica magna, & firma eleganter eriguntur, alternatim, folitarii provenientes, papilionacei, coerulei, lati, qui calice magno, quinquefido, & petiolo fubhirfuto, cum fpinula paleacea, fuftinentur,

qui filiquas dant latas, breves, tumidas, hirfutas, feu pilofas, femi-nibus reniformibus repletas.


CROTALARIA Afiatica, folio fingulari, floribus luteis. *Hert. Catal. femin.* Katou-Tandale-Cotti, *H. Malab. part.* 9. *Tab.* 26. quae in notis, Crotalaria Malabarica, fylveftris, foliis fingularibus, majoribus, floribus luteis, vocatur. ut & Genifta Malabarica, folio fingulari, oblongo, flore flavo, dilutiore, filiquis bullatis. *Commel.* & *Fl. Malab. pag.* 33. quae eft Crotalaria Bengalenfis, foliis Geniftae fubhirfutis, Katou-Tandale-Cotti. *H. Malab. Plukn. Phyt. Tab.* 169. *Fig.* 5.

CROTALARIA Zeylanica, frutefcens, argentea, flore luteo parvo. *Hert. Catal. femin.* an Crotalaria Afiatica, folio argenteo, villofo, flore luteo, filiquis pendulis in fpica *Boerh. Ind. pl. part.* 2. *pag.* 25?

CROTALARIA Zeylanica, repens, folio hirfuto &c. *Hert. ibidem.* Crotalaria forte hirfuta, major, Americana herbacea, caule ad fummum fagittato. *H. L. Bat. Plukn. Phyt. Tab.* 169. *Fig.* 6. &c.

CROTALARIA arborefcens, trifoliata, glabra, & viridis. *Nobis. Tab.* 35. Cytifus glaber, arborefcens, filiquis bullatis. *Herb. Herm.* Anonis Zeylanica, arborefcens, flore luteo, filiquis bullatis, Cytifi habitu. *Hert. Catal. femin.* Cytifus Zeylanicus, arborefcens, glaber, flore luteo, filiquis bullatis. *Muf. Zeyl. pag.* 40. Cytifus Zeylanicus, filiquis bullatis, pediculis longiffimis. *ibidem. pag.* 49. Cytifus pediculis longiffimis, filiquis pendentibus. *ibidem. pag.* 59. JAKBERYA Zeylonenfibus. Quoad faciem externam, quam diu flores nec filiquas perfecit haec arbufcula, Cytifum perfecte imitatur, inprimis Alpinum illum latifolium. Folia autem gerit terna, glabra, utrinque laete viridia, longiffimis fuftentata pediculis, qui ex cortice flavo, glabro, lignum albicans tegente, oriuntur. Flores in longiffimis, validiffimisque fpicis erigun-tur multiplices, magni, elegantes, coloris ex luteo purpurei, papilionacei, brevi fulphureo vexillo, alis minimis conftantes, carina exiftente lata, longiffima, reflexa, intenfe purpurea.

Siliquae inflatae & tumidae funt, ut in prioribus etiam fpeciebus. quo a *Genifta* & *Cytifo* differunt, hoc tamen convenit cum *Anonide*, ut & foliatura trifoliata, unde & ad *Anonidem* ablegari poffet, ut eo *Tournefortius* alteram hujus fpeciem, quam ad *Anonidem* ideo recenfui, revo-



CROTALARIA arborescens, trifoliata, glabra, & viridis. Nobis.

revocavit. cum qua haec noftra in multis etiam convenit, quaeque facile inter fe confundi poffunt, unde & hujus exactiffimam dedi figuram. ab *Anonide* autem illa *Tournefortii* in eo differt, quod illa *Tournef.* folia habeat acutiora, in parte fuperiore obfcure virentia, in inferiore vero incana, & hirfuta, quum noftrae folia fint glaberrima, utrinque viridia, rotundiora: caules itidem funt glaberrimi, pallidiores, nec ita lignofi, quum in altera fint hirfuti, purpurafcentes & penitus lignofi. Flores noftrae plantae in quadruplo fere longioribus fpicis, nec foliaceis proveniunt copiofiores, forma tamen proxime inter fefe convenientes. Ex utrisque, quas fervo, plantis differentiam hanc notare neceffe duxi, quum externa figura quam maxime fimiles fint, & fi quis hanc noftram ad *Anonidem* ablegare velit, ad diftinctionem alterius haec, Anonis trifolia, glabra, viridis, arborefcens, Zeylanica vocari poffet. Crotalariae characterem vide apud *Amm. Char. pl. pag.* 356.

CURCUMA radice longa. *H. L. Bat. pag.* 208. ubi ejus icon, & defcriptio. *Commel. Fl. Malab. pag.* 25. Curcumae flos. *Muf. Zeyl. pag.* 30. Crocus Indicus, Arabibus *Curcum*, officinis noftris radix *Curcumae* dicta. *J. Bontii Hift. nat. lib.* 6. *cap.* 30. *pag.* 116. Sed ubi loco Curcumae, Canna Indica delineata eft. qui error certe, ut videtur, *Tournefortio* impofuit, qui inde hanc ad *Cannacori* fpecies redegit, quum alius certe generis fit planta Curcuma, vocatur ab ipfo Cannacorus, radice crocea, five *Curcuma* Officinarum *inftit. pag.* 367. Curcuma five Crocus Indicus, fubterreftris, Lufitanis *Saffranda Tierra* dictus. Amman. *H. Bofian. pag.* 10. Saffrano Dell' Indie *Acoft. edit. Ital. pag.* 193. Manyella-Koua. *H. Malab. part.* 11. *Tab.* 11. ubi notas vide fubjectas. Curcuma foliis longioribus & anguftioribus. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 40. vide & *Morif. hift. tom.* 3. *pag.* 253. & *Ray. tom.* 3. *pag.* 649. Cyperus Indicus *Diofcoridis Matth. pag.* 27. Zinziberis facie radix longa, intus flava, Malaice Kunhet *Linfchot. part.* 3. *Ind. Orient. cap.* 14. apud *Plukn. Almag. pag.* 397. notas hujus characterifticas ut & ufum Medicum invenies apud *Samuel. Dale Pharmacol. pag.* 324. KAHA Zeylonenfibus dicitur, quod Crocum notat. & apud Indos hujus radix *Borri*, *Borri* vulgo dicitur. Curcumae Figuram & defcriptionem exactiffimam habet *Rumph. in Herb. Amb. lib.* 8. *cap.* 16. ubi Curcuma major, Cuning vel Cunyet vocatur.

Curcuma radice rotunda. *Par. Bat. Pr. pag.* 330. Curcuma foliis latioribus & rotundioribus. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 40. Manya-Kua. *H. Malab. part.* 11. *Tab.* 10. quae eſt Curcuma *Linnaeo in tractat. de Muſa Cliffort. pag.* 15. ubi exactiſſime nota hujus characteriſtica explicatur. Zinziberis facie radix intus flava, rotunda *Plukn. Almag. pag.* 397. qui eſt Crocus Indicus, ſeu *Curcuma* radice rotunda. *ibidem*. Curcumae characterem habet etiam *Amm. in Char. plant. pag.* 360.

CUSCUTA Indica, floribus albis, ſtellatis. *Muſ. Zeyl. pag.* 67. an Acatsja-Valli *H. Malab. part.* 7. *Tab.* 44? quae Cuſcutae ſpecies ſupra arbores & plantas naſcens. *Commel. in notis* & *Fl. Malab. pag.* 25.

Cuscuta Zeylanica, floſculis incarnatis. *Muſ. Zeyl. pag.* 42. an Cuſſutha Rambut, Putri *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 9. *cap.* 91?

CYCLAMINIS ſpecies, URULU Zeylonenſibus. *Muſ. Zeyl. pag.* 57. dicitur ab *Uru*, quod porcum notat.

CYDONIA arbor BALANGHAS dicta *Nobis*. Balanghas ad Cydoniam referenda quae convenit cum Cavalam *H. Malab. part.* 1. *pag.* 89. vel cum Marmelos Garciae ab Horto. juxta *Amm. Hort. Boſian. pag.* 6. ubi dicitur: ſed BALANGHAS fructum fert majorem, pulpamque acidiorem. Deſcribitur etiam haec arbor BOLANGA a *Grimm. in Labor. Ceyl. pag.* 85. cujus deſcriptio ſupra *pag.* 31. ad arborem BOLANGA invenitur.

Cydonia exotica, quae MARMELOS arbor. *Muſ. Zeyl. pag.* 60. Cydonia malus Indica, ſpinoſa, trifolia, putamine oſſeo duriſſimo, pulpa Meſpili *Par. Bat. Pr. pag.* 330. quae & Meſpilus Indica, ſpinoſa, trifolia, putamine oſſeo duro *ibidem* vocatur. Meſpilus Indica, trifolia, ſpinoſa, odore roſeo, fructu Mali magnitudine, cortice duro, obtecto, *Marmelos* vocata. *Muſ. Zeyl. pag.* 46. Bilacus Madja, Bilac Tyloor. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 1. *cap.* 68. ubi cum Malo Cydonio Indico *Bontii lib.* 6. *c.* 8. jungitur & *Cluſ.* vocantur Cydonia exotica. *lib.* 2. *c.* 14. Covalam ſeu Cydonia exotica. *C. B. Pin. pag.* 435. *H. Malab. part.* 3. *Tab.* 37. Ville Vittre Malab. *Petiv. act. Phil. Lond. vol.* 22. *no.* 271. *pl.* 108. Cucurbitifera trifolia, ſpinoſa, Indica, fructus pulpa Cydonii aemula. *Plukn. Phyt. Tab.* 170. *Fig.* 5. & in *Almàg. pag.* 125. reliqua vide Synonyma & adlegatos auctores, ut & *Commel. Fl. Malab. pag.* 25. BELI & BELIGHAS Zeylonenſibus. *Muſ. Zeyl. pag.* 46. ubi dicitur, quod



CYTICYSTUS, foliis inferioribus confertis, superioribus oppositis. Nobis.

quod *Garcias ab Horto* huic arbori male tribuat folia Urticae, & quod ex flofculis hujus aqua deftilletur odore aquam Rofarum aemulans. Arbor haec MARMELLE vocatur a *Grimm. in Labor. Ceyl. pag.* 88. & fequenti modo defcribitur: Haec arbor fimiliter eft altiffima, fructus oblongos producit cum duro putamine. *Clufius* eos vocat *Cydonia Bengalica.* easdem aeque ac Cydonia vires poffident, & ex eorum pulpis res omnes confici poffunt, ad quas Cydonia funt in ufu. Flores, qui jucundiffime olent, per Balneum Mariae deftillati, aquam exhibent odoriferam valde, quae cor & fpiritus vivificat; Componuntur ex pulpa horum fructuum praeter ea omnia, quae ex Cydoniis vulgaribus in Europa fiunt, variae adhuc Marmeladae, quae excellentiffimae funt pro Magnatibus & Nobilibus, & quae ad remotas regiones transferri poffunt. Sic ex hifce fiunt Marmelada Cordialis, Cephalica, Stomachica, Pectoralis, Hepatica, Splenetica, Nephritica, Laxativa, Hydropica cum Gummi Gotti, quarum formulae defcriptae funt in *Labor. illo Ceylon.* a *pag.* 88. ad 95.

CYTICYSTUS, foliis inferioribus confertis, fuperioribus oppofitis. *Nobis. Tab.* 36. Cytifus floribus luteis, minimis, filiqua glabra, brevi. *Herb. Hert.* Cytifus Zeylanicus, fruticofus, humilis, filiquis anguftis, Ericae folio. *Muf. Zeyl. pag.* 34. RATHOHOMBA & RATHIHOBA Zeylonenfibus.

Elegans hic fruticulus cortice fcabro, antequam ramos producit, gaudet, caules dein emittens molles, albicantes, laeviffima lanugine tectos, quos folia verticillatim ambiunt inferius plurima fimul collecta, incana, Lavendulae folia perfecte referentia, fuperius ad caulis floriferi ortum bina tantum oppofita collocantur.

Flores in eorum fummitate eriguntur fpicati, minimi, tribus ex petalis communiter conftantes, magnum calicem, qui veficam haud male repraefentat, referentibus, qui trifariam divifus, pilis tenuiffimis, albicantibus obducitur, petala autem haec floris calicis dein vicem gerunt; ex fundo autem ejus ftamina novem, minima, proveniunt, & ejus piftillum abit in fructum unicapfularem, in tres valvas dehifcentem, feminibus foetum plurimis, angulofis.

Ita ut peculiaris fit ftructurae haec planta & novi plane generis, quum vero florem fructumque gerat tanquam in cifta aut vefica abfconditos, ut in *Tabula noftra* apparet, & Cytifi nomen ab inventoribus ipfi fuerit, nefcio qua ratione, inpofitum, Cyticyftum per contractionem pro Cytifo-Cyftum ipfam vocavimus.

CYTISUS folio molli, incano, filiquis Orobi contortis, & acutis. *Nobis. Tab.* 37. Cytifus Zeylanicus, folio molli, incano, flore ex luteo purpurafcente. *Herb. Hert.* Phafeolus arbor, Indica, incana, filiquis torofis *Kayan* dicta. *H. L. Bat. App. pag.* 694. & *Muf. Zeyl. pag.* 4. Arbor Indica, trifoliata, leguminofa, fructu eduli, *Kayan* dicto. *ibidem. pag.* 34. Anagyris Indica, leguminofa, filiquis torofis. *Par. Bat. Pr. pag.* 311. Phafeolus erectus, incanus, filiquis torofis, *Kayan* dictus. *Plukn. Phyt. Tab.* 213. *Fig.* 3. Thora-Paeru *H. Malab. part.* 6. *Tab.* 13. ubi vide notas. Cajan arbor, Indica, foliis Trifolii Bituminofi, filiquis Orobi. *Breyn. Prodr.* 1. *pag.* 20. Laburnum humilius, filiqua inter grana & grana juncta, femine efculento. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 139. & *Hiftor. vol.* 2. *pag.* 31. Arbor trifolia, Indica. *J. B. tom.* 2. *lib.* 17. *pag.* 386. & *Ray tom.* 3. *pag.* 102. reliqua porro vide in *Plukn. Almag. pag.* 293. &c.

RATHATORA & WITTRAWINANSA Zeylonenfibus.

Inftar plurimarum Cytifi fpecierum gerit haec arbufcula folia terna, communi primo, dein trifariam divifo pediculo infidentia, quae funt mollia, averfa parte maxime incana & tomentofa, plurimis nervis donata, & alternatim ad caules albicantes, tomentofos proveniunt: in fumma ramorum parte ad foliorum exortum pediculi longiffimi eriguntur, in quorum faftigio flores fuftinentur plurimi, fimul collecti, papilionacei, coloris obfcure lutei, feu purpurafcentis, calicibus oblongis, rotundis, in quinque partes diffectis, contenti.

Siliquae fubfequentes funt longae, acutae, torofae, articulatae, & divifae, in fingulo nempe loculo fuo fuum continentes femen; quod eft fubrotundum, glabrum, ftriatum, fpadiceum, in inferiore parte, ubi filiquae jungitur, protuberans, & grifeum.

Seminibus hifce Columbae vefcuntur in Indiis utrisque, & homines faepius in navibus. Quae hoc anno nomine WANDOE & WANDOUW ex India Occidentali etiam accepi.

DAWATHA. *Muf. Zeyl. pag.* 70.

DENTILLARIA Zeylanica, flore minimo, Antirrhini folio, WISSADULI Zeylonenfibus. *D. Herman* apud *Ray. tom.* 3. *pag.* 246. WISSADULI maximum, ex arboribus proceris, putredine infectis, collectum. *Muf. Zeyl. pag.* 42. an Dentillaria fcandens, fylvatica,

Lych-



CYTISUS folio molli, incano, filiquis Orobi contortis, & acutis. Nobis.

Lychnoides flore albo. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 91. & *Hist. part.* 1. *pag.* 211. *Tab.* 133. *Fig.* 1?

DIGITALIS Zeylanica, flore albo, variegato. *Herb. Hert.* quae convenit cum Valli-Upu-Dali *H. Malab. part.* 9. *Tab.* 45. fed in eo differt, quod hujus folia fint bina oppofita, noftrae autem folia alterna, majora, duobus minoribus ad eundem exortum provenientibus. Glaberrima funt, viridia, inftar Ocymaftri, feu Plumbaginis Ceylonenfis, cum qua totus plantae habitus externe etiam convenit. Flore fructuque quum mutila fit, quam fervo, planta, de iis nihil certi dicere poffum.

Digitalis Orientalis SESAMUM dicta. *Tournef. inftit. pag.* 165. Sefamum veterum *C. B. P. p.* 27. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 59. & *Hift. vol.* 1. *pag.* 161. Sefamum *Rivini ord. pl. irreg monop.* qui elegantem habet Figuram, & in *H. Malab. part.* 9. *Tab.* 54. Schit-Elu vocatur. Sefamum femine fufco. *H. L. B. pag.* 559. Sefamum Indicum, Widyn *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 8. *cap.* 33. Sempfen *Pr. Alp. de plant. Ægypt. pag.* 37. reliqua vide apud *Ray. in hift. pl. pag.* 1327. *Plukn. Almag. pag.* 344. & *Phyt. Tab.* 109. *Fig.* 4. TALA Zeylonenfibus dicitur. Quum auctorum Figurae adeo variant, & huic plantae in inferiore parte Trifoliatura etiam tribuatur, noftrae quam fervo, plantae folium ex infima parte defumptum etiam depingendum curavimus, quod unicum tantum femper inveni alteri oppofitum, caeterae partes noftrae plantae cum aliis exhibitis figuris funt convenientes. Infculptum autem eft noftrae Folium. *Tab.* 38. *Fig.* 1. quod ad diftinctionem fubfequentis Digitalis etiam additum eft. Tota autem planta, ut & folium eft fcabrum, integrum, fuperius viride, inferius pallidum, oblongum, anguftatum, acutum &c. Apud adlegatos auctores uberior hujus defcriptio inveniri poteft, & aliorum auctorum fynonyma. *Grimm. in Laborat. fuo Ceylan. pag.* 131. ad caput de SESAMO haec habet: Oleum exhibet per decoctionem, quod commodiffimi ufus eft in Chirurgia, peculiariter in ardentibus, atque calidis capitis doloribus. Emolliens eft, dolores mitigans, & aliquatenus refolvens. Ufum familiariffimum habet apud Cinghalenfes, a quibus *Oleum* illud *Schinfchilli* nomen obtinet. vide & *Samuel Dale Pharmac. pag.* 345. qui pro charact. filiquas habet breves, erectas, quadrangulares. &c.

Digi-

Digitalis Zeylanica, hirfuta, foliis Sefami anguftioribus. *Nobis. Tab.* 38. *Fig.* 2. Sideritis Zeylanica, anguftifolia, hirfuta. *Herb. Hert.* Sideritis Zeylanica, afpera, major, ASWAENNA Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 46. & Sideritis Echioïdes, Indica, foliis oblongis. *ibidem. pag.* 59 & 62. Sefamum forte Zeylanicum, folio fingulari, oblongo, flore luteo. *Hert. Catal. femin.* Florem gerit haec planta tubulofum, calici infedentem, qui quinis foliis, anguftiffimis, erectis, fcabris, & acutis conftat, poft quem fructus fubfequitur, qui eft capfula membranacea, ex ovali oblonga, compreffa, bilocularis, bivalvis, femina ovata mire excavata condens. Planta vero ipfa caulem habet fimplicem, quadragonum, hirfutum, ad foliorum exortum protuberantem, aut quafi geniculatum, ex quo folia progerminant oblonga, feffilia, integerrima, bina oppofita, unciali fpatio remota. Ex fingula autem ala flores proveniunt calice fuftentati tenuiffimo, hirfuto, jam defcripto. Tota porro planta fcabra, & hirfuta eft. Digitalis characterem habet. *Linnaeus Char. pl. gen. p.* 179.

Digitalis forte afpera, repens, rotundifolia. *Nobis.* Sideritis Zeylanica, afpera, repens, rotundifolia, minor, flofculis minimis, pallide coeruleis. *Muf. Zeyl. pag.* 3. Sideritis Echioïdes, Indica, minor. *ibidem. pag.* 57. ASWANNA Zeylonenfibus haec etiam dicitur, ab *As* quod equum fignificat. *Wanna* Caudam; Caudam enim equinam videtur exprimere radix multis nigris capillata fibrillis. Vocatur a Malabaris *Kuddurawalli*, id eft Cauda equina eandem ob rationem. an forte haec planta ad Gymnotetrafpermas afperifolias, ad *Afperuginem* nempe *Tournefortii*, *Heliotropium*, *Lithofpermum* vel fimile genus pertinet? Suadet fic *Hermanni* denominatio in *Muf. Zeyl. pag.* 3. Quum vero iisdem in *Muf. Zeyl.* gaudet denominationibus ac planta antecedens, ab ea feparare non aufus fui, licet *Breynius in Ephemer. German.* talem ad Bugloffum retuliffe videatur. ut fupra ad *Bugloffum* notavimus. nos vero in planta noftra femina non nuda, fed capfula inclufa, ut juxta accuratiffimum examen in antecedente planta defcripfimus, invenimus, unde & ad Digitalem, cum qua penitus convenit illa planta, eam reduximus: Floris vero compreffi forma non ita certam conclufionem exhibet, quam integra capfula feminalis.

Digitali fimilis, planta bicapfularis, flore tubulofo, galea trifida, & labio integro, obtufo conftante. *Nobis.* Euphrafiae affinis, Indica, Echioï-

DIGITALIS Orientalis SESAMUM dicta Tournef.



Fig. 1.

Fig. 2.

DIGITALIS Zeylanica, hirsuta, foliis Sesami angustioribus. Nobis.

Echioïdes. *H. L. Append. pag.* 668. ubi icon & defcriptio. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 28. Gratiolae affinis, Echioïdes, Zeylanica, major. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 54. *Petiv. Act. Phil. Lond. num.* 244. *pl.* 36. Bugloffum Echioïdes, Zeylanicum, foliis Convolvuli Indici minoris, coerulei. *Breyn. Ephemer. German. ann.* 4 & 5. *obferv.* 159. & *Ray. tom.* 1. *pag.* 498. Bugloffum forte Zeylanicum, anguftifolium, majus, flore ex coeruleo albido. *Hart. Catal. femin.* Pee-Tumba *H. Malab. part.* 9. *Tab.* 46. KAWATUWA & KAWATUMBA. *Muf. Zeyl. pag.* 13.

DIWUL, & GIWUL. *Muf. Zeyl. pag.* 13 & 17. Bolangos Lufitanis. *ibidem.* ubi additur, *Diwul* notat adftrictionem gutturis, quae faepe cauffatur a fructibus inmaturis. Hujus autem arboris fructus adftringunt, unde in Dyfenteria valde commendatur. Folia habet Foeni Graeci, majora tamen, fpica longa ad foliorum alam internam donata. vide fupra ad *Cydonia pag.* 84. & ad arborem Bolanga, cum qua haec forte eadem.

DODHAMPANA. *Muf. Zeyl. pag.* 67. a *Pana.* quod pectinem fignificat.

DORYCNIUM Zeylanicum, folio minutiffimo. *Hertog in Catal. femin.* an Dorycnium Indicum, floribus fingularibus, rubris, in pedicillis oblongis, filiquis perexiguis. *Ray. tom.* 3. *pag.* 471. & Manelli *H. Malab. part.* 9. *Tab.* 37.

DRACUNCULUS Indicus, folio trifido. *Tournef. inft. pag.* 161. Dracontium Indicum, folio tripartito. *Muf. Zeyl. pag.* 33. Arum trilobato folio, humilius, & minus, Zeylanicum. *Par. Bat. pag.* 78. ubi icon & defcriptio. Arum Zeylanicum tuberofum, folio tripartito. *Muf. Zeyl. pag.* 63. Serpentaria Zeylanica, triphylla. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 90. Arifarum Ambonicum, Bora Kitfyl. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 8. *cap.* 86. PANUWALA Zeylonenfibus, a *Panuwa* quod vermiculos notat quofcunque ulceribus inhabitantes, quos hujus radicis fuccus enecat. *Ala* radix eft. *Muf. Zeyl.*

Dracunculus non fpinofus, efculentus. *Nobis.* Dracontium Zeylanicum, non fpinofum, efculentum. *Muf. Zeyl. pag.* 21. Ari fpecies, an Arum quinquefolium, Indicum *Clufii Muf. Zeyl. pag.* 58? an Arum

amplis foliis, virentibus, efculentum. *Plum. Cat. pl. Amer. pag.* 4: KIDARAM Zeylonenfibus.

Dracunculus Zeylanicus, polyphyllus, maximus, caule trifido. *Tournef. inft. pag.* 161. Dracontium Zeylanicum, ramofo folio, maximum. *Par. Bat. pag.* 89. ubi vide defcriptionem. Dracontium Indicum, multifidum. *Muf. Zeyl. pag.* 33.

Dracunculus Zeylanicus, polyphyllus, caule afpero, ex flavo & viridi variegato. *Tournef. inftit. pag.* 160. Dracontium Zeylanicum, ramofo folio, caule ex viridi & flavo variegato, afpero, KIDARAN Zeylonenfibus. *Par. Bat. pag.* 89. Serpentaria polyphylla, Indica, caule maculato, afpero. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 90. Serpentariae fpecies. *Muf. Zeyl. pag.* 33. Arum polyphyllum, *Dracontium* & *Serpentaria* dictum, folio ramofo, Poeoniae inftar, caule afpero, Zeylanicum. *Par. Bat. Pr. pag.* 315. KIDARAM Zeylonenfibus.

Dracunculus Zeylanicus, polyphyllus, caule afpero, virefcente, maculis albicantibus notato. *Tournef. inftit. pag.* 160. Arum polyphyllum, Ceylanicum, caule fcabro, viridi diluto, maculis albicantibus notato. *H. Amft. part.* 1. *pag.* 99. ubi elegans Figura, & defcriptio.

Dracunculus Zeylanicus, polyphyllus, caule afpero, maculis viridifufcis, viridi-dilutis, & albicantibus pulchre notato. *Tournef. inftit. pag.* 160. Arum Ceylanicum, polyphyllum, caule afpero, maculis viridi-fufcis, viridi-dilutis, & albicantibus pulchre notato. *H. Amft. part.* 1. *pag.* 101. ubi icon & defcriptio. Arum polyphyllum, *Dracunculus* & *Serpentaria* dictum, Ceylanicum, caule afpero cum maculis viridi-fufcis, & viridi-dilutis, albicantibus pulchre notatum, majus, & elatius. *Commel. Cat. Hort. Med. Amft. pag.* 38. & *Fl. Malab. pag.* 9. Serpentaria polyphylla, Indica, caule maculato, afpero. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 90. Mullu-Schena *H. Malab. part.* 11. *Tab.* 19.

Dracunculus Zeylanicus, polyphyllus, caule laevi, ex viridi & albo variegato. *Tournef. inftit. pag.* 161. Dracontium Zeylanicum, ramofo folio, caule ex viridi & albo variegato, laevi. *Par. Bat. pag.* 90. Serpentaria polyphylla, Indica, caule maculato, laevi. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 90. Arum polyphyllum, *Dracontium* & *Serpentaria* dictum, folio ramofo, Poeoniae inftar, caule laevi. *Par. Bat. Pr. pag.* 315.

Arum

Arum polyphyllum *Dracunculus* & *Serpentaria* dictum, Ceylonicum, caule glabro, viridi diluto, maculis albicantibus notato, majus & elatius. *Commel. Cat. Hort. Med. Amſt. pag.* 38. & *Fl. Malab. pag.* 49. Schena *H. Malab. part.* 11. *Tab.* 18. Serpentaria major, ſeu Dracunculus major, polyphyllus, *Markgrav. pag.* 27. *edit.* 1648. huc ſpectat Arum polyphyllum, *Dracunculus* & *Serpentaria* dictum, Surinamenſe, caule atro rubente, glabro, & eleganter variegato. *H. Beaum. Plukn. Phyt. Tab.* 149. *Fig.* 1.

DRACUNCULUS Zeylanicus, ſpinoſus, Polypodii foliis, radice repente. *Tournef. inſtit. pag.* 161. Dracontium Zeylanicum, ſpinoſum, foliis profunde inciſis, Filicis in modum, radice longa, repente. *Muſ. Zeyl. pag.* 64. Dracontium Zeylanicum, ſpinoſum, Polypodii foliis, radice repente. *Par. Bat. pag.* 94. ubi ejus deſcriptio.

DRYPIS Theophraſti. *Muſ. Zeyl. pag.* 62. RAWANAKOFFA Zeylonenſibus. RAWANA olim Cinghalorum rex fuit decem capitibus & viginti manibus, (ut fabulantur) ex cujus ſanguine nata haec planta creditur. *Koffa* denotat ſcopulam, qua quaevis res purgatur. &c. *Muſ. Zeyl.*

DYALABU. *Muſ. Zeyl. pag.* 70.

EBENUS arbor Indiae Orientalis, Fagi amplioribus foliis; Anonae dulcis fructu, magno, coronato, eduli. TUMBAMARUM & CARPAMARAM Malabar. *Plukn. Mantiſſ. pag.* 66. Ebenum vel Hebenus. Caju Arang. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 4. *cap.* 1. Lignum Ebenum. *Grimm. Labor. Ceyl. pag.* 98. ubi de eo dicitur. Tantum abeſt, ut lignum iſtud nobis deficiat in Ceylona, ut ipſius rami decidentes nobis ſufficiant. Quis autem negare poteſt, Lignum iſtud eandem habere virtutem, quam *Lignum Guajacum* &c. Ego quidem auſim munus hoc ſuſcipere, me ſcilicet paraturum ex iſto, quidquid ex alio poteſt fieri. Caeterum praeterquam quod omnis generis concoctiones (decocta) ingredi posſit, praebet etiam ſpiritum, qui praeſtantiſſimum eſt Medicamentum, ſudorem promovens, contra quasvis inpuritates, Lues, Scabies. &c. ubi porro hujus ſpiritus praeparatio, uſus, doſis, & alia, quae ex hoc ligno parari poſſunt, indicantur. de Ligno porro Ebeno vide *Samuel Dale Pharmacol. ſupplem. pag.* 259 & 295. ubi Ebenum ſive Lignum

 Indicum

Indicum Camelli vocatur. Cujus defcriptionem etiam habet: *Hiftor. Lugd. pag.* 1751.

ELAEACHNUS foliis oblongis, acuminatis, maculatis. *Nobis. Tab.* 39. *Fig.* 1. Olea Zeylanica, fylveftris, folio oblongo, fubtus incano. *Herb. Hert.* an Olea fylveftris, feu Zizyphus Cheufanenfis, non fpinofa, folio fubtus argenteo, molli, fructu rotundo, rubente, punctulis notato? *Plukn. Amalth. pag.* 160. ubi brevis ejus defcriptio cum noftra maxime conveniens, quae caulem habet laeviter fcabrum, qui folia ad gemmas alternatim emittit, adfixa petiolis femiuncialibus, teretibus, fuperius fulcatis; Folia autem ipfa funt oblonga, fuperius laevia, maculis purpurafcentibus adfperfa, inferius argentea. Flores ad gemmas feffiles fere progerminant, qui conftant calice colorato, tubulato, ore quadrifido, infiftente Embryoni fuo oblongo, fcabro & argenteo, ut ipfi flores; Ergo quum fructus infra calicem gerat, non ad *Oleas* fed ad *Elaeachnos* juxta *Tournefortium* pertinet. Elaeachni autem character apud mox citatum auctorem, & *Linnaeum* latius explicatur *in char. plant. gener. pag.* 31.

ELAEACHNUS foliis rotundis, maculatis. *Nobis. Tab.* 39. *Fig.* 2. Zizyphus Indica, argentea tota, Caryophylli aromatici flore. *Herb. Herm.* Zizyphus Zeylanica, argentea, fpinis carens. *Par. Bat. Pr. pag.* 386. *Amm. Char. pl. pag.* 618. Zizyphus Indica, & Zeylanica, argentea tota. *Par. Bat. Pr. Muf. Zeyl. pag.* 8 & 37. Zizyphus alba, argentea, Zeylanica *Hermanni. Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 105. Zizyphus Zeylanica, argentea, Mali Cotoneae folio, WAELEMBILLA indigenis *Hermanni. Ray. tom.* 3. *Dendr. pag.* 44. Olea fylveftris, argenteo folio. *Plukn. Almag. pag.* 269. & *Ray. tom.* 3. *Dendr. pag.* 47. WAELEMBILLA Zeylonenfibus, id eft *Æmbilla* farmentofa, *Wael* enim farmentum eft. *Muf. Zeyl. pag.* 8. ubi porro dicitur, flos eft argenteus, tubulofus, plures fimul ad foliorum exortus. & in *Ray. citato loco* dicitur. Flores cum fructibus, quibus infident, e foliorum alis exeunt in pediculis mediae longitudinis, argenteo exterius colore, dum adhuc in gemma funt. Fructus oblongus, fulcatus, argenteus, nucleum includens, fubruffum, molliculum; pellicula nucleum involvens, vifcofo humore pauco madet. *D. Scherard.* Foliis tantum rotundis a priori differt, in omnibus caeterum idem. De WAELEMBILLA in notis ad *H. Malab. part.* 4. *Tab.* 41. *pag.* 86. legitur, quod Perim Toddali eadem



ELAEACHNUS foliis oblongis, acuminatis, maculatis. Nobis.

ELAEACHNUS foliis rotundis, maculatis. Nobis.



EMERUS *siliquis geminatis longissimis. Nobis.*



ELAIOCARPOS *folio Lauri serrato, floribus spicatis. Nobis.*

eadem fit planta, cum qua tamen minime haec noftra convenit, ut ex collatis figuris & defcriptione facile patet; & potius ad *Jujubas* pertinet juxta *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 60. cum qua a *Commel.* in *Fl. Malab. pag.* 38. illa jungitur, ubi vide reliqua, & infra ad *Jujubam.*

ELAIOCARPOS folio Lauri ferrato, floribus fpicatis. *Nobis. Tab.* 40. Laurus Indica, ferratifolia, inodora, fructu Olivae magnitudine, & forma, nucleis crispis, lapideis, Lauro-Cerafo Clufii congener. *Muf. Zeyl. pag.* 9. Laurus Indica, ferratifolia, inodora, fructibus Olivae magnitudine & forma, nucleis lapideis, crispis. *Herb. Herm.* Perun-Kara *H. Malab. part.* 4. *Tab.* 24. an Arbor Laurifolia, Indica, fructu ad caulem racemofo, Oleae magnitudine, & forma, villofo, feminibus Anonae nucleorum aemulis referto? *Plukn. Mantiff. pag.* 21. huc fpectat Baccifera arbor, calyculata, foliis Laurinis, fructu racemofo, efculento, fubrotundo, monopyreno, pallide luteo. *Sloan. Hift. Jam. vol.* 2. *Tab.* 198. *Fig.* 2. WERALU Zeylonenfibus. Gerit haec elegans arbor folia fua ad ramorum fummitatem plurima, alternata, ovato-oblonga, per marginem obtufe ferrata, petiolis brevibus infidentia, glabra, quae ex fuis alis dant fcapum femipedalem, plures continentem flores, minutiffimis petiolis infidentes, fecundum fcapi longitudinem fparfos, deorfum nutantes, quorum calix eft quadrifolius, interdum quinquefolius, petala totidem laciniata. Stamina fedecim, fi quatuor, viginti, fi quinque, erecta. piftillum vero unicum. Fructus eft bacca ovalis, nucleum crispum, lapideum continens. Fructus hi inmaturi condiuntur muria ab incolis, addito pauxillo Oleo Olivarum ad conciliandum faporem Olivis proximum. ut notatur in *Muf. Zeyl.* in Tabula noftra florem a dorfo confpiciendum exhibuimus, ut calix quadrifidus appareat, & petala quatuor ipfius floris eleganter fimbriata ad litt. a. litt. b. eft petalum. c. ftamen. d. piftillum.

EMERUS filiquis geminatis, longiffimis. *Nobis. Tab.* 41. Emerus filiquis longiffimis, & anguftiffimis. *Plumier. Cat. pl. Amer. pag.* 19. Senna Zeylanica, arborefcens, filiqua longiffima. *Herb. Hart.* Kedangu. *H. Malab. part.* 6. *Tab.* 27. quae Colutea filiquofa, Malabarenfis. *ibidem.* Colutea Sesban Ægyptiacae foliis accedens, Maderasp. *Plukn. Tab.* 165. *Fig.* 2. Forte & Colutea exotica, anguftifolia, floribus luteis, averfa parte eleganter punctatis. *Plukn. Phyt. Tab.* 169. *Fig.* 5. huc & fpectat Turia Turi. *Rumph. Herb. Ambon.* 1. *cap.* 64. quae cum

 Kedangu

Kedangu *H. Malab.* jungitur, fed quae tres gerit filiquas, & flores ac folia habet majora, loco tantum natali caeterum differens.
Rami noftri fruticis funt lignofi, fimplices, teretes, ftriati, folia alterna, folitaria, pinnata, longiffima, fine inpari. Pinna fingula oppofite inferta, oblonga, obtufa, glabra, integerrima, ex alis foliorum petioli egrediuntur communes, tenuiffimi, fparfi, flores fuftinentes papilionaceos, luteos: Poft flores filiquae communiter duae in fingulo petiolo ad maturitatem proveniunt, longiffimae, tenues, bivalves, unicapfulares, ifthmo interceptae, femina condentes nigra, reniformia, laevia, parva, fecundum longitudinem digefta. vide infra ad *Galegam*, cum qua videtur haecce noftra convenire.

EPHEMERUM Zeylanicum, procumbens, criftatum. *Par. Bat. pag.* 148. ubi defcriptio. & *Ray. tom.* 3. *pag.* 566. Gramen Zeylanicum, putridarum arborum, fpica pifcium pulmones aemulante. *Muf. Zeyl. pag.* 53. potius Phalangium eft. *ibidem.* Gramen diftacophoron, fpica turgida, criftata. *Muf. Zeyl. pag.* 25. ubi dicitur, Ramulorum fummus profert capitellum oblongum, multis femilunatis, herbaceis foliolis, imbricatim fibi invicem inpofitis exornatum. Frequens occurrit in arborum fenio confectarum truncis, lignis putridis, aliisque udofis, & opacis locis infulae Zeylonae, a cujus incolis BOLHIDA vocatur, quod pronunciant BOLHINDA.

EPHEMERUM Zeylanicum, procumbens, Alfinae mediae folio. *Par. Bat. Pr. pag.* 332. mutilata ejus Figura confpicitur apud *Pluknet. in Phyt. Tab.* 174. *Fig.* 2. Graminis dactyli proprie habenda fpecies, ut notatur in *Par. Bat. pag.* 154.

ERYNGIUM Indicum, aquaticum, Ilicis aculeatae folio, floribus coeruleis. *Muf. Zeyl. pag.* 66. Eryngii fpecies *Bontii ibidem*, quae apud *Bontium* defcripta & delineata eft *pag.* 151. MAHALKIRI Zeylonenfibus.

ERYSIMUM Zeylanicum, filiqua recta, hexagona, nigricante, alata. *Muf. Zeyl. pag.* 59.

ESULA Indica, DALUK Zeylonice dicta. *Muf. Zeyl. pag.* 67. Efula; cujus praeter legitimam multae aliae funt fpecies. *Grimm. Labor.*

Ceyl.



EUPATORIOPHALACRON *Scrophulariae aquaticae foliis oppositis. Nobis.*

Ceyl. pag. 123. ubi dicit: Conficitur ex ea correctum quoddam extractum, quod certiffimum habet ufum iis in affectibus, ad quos commendari folet *Efula.*

ESULAE fpecies in infula Lio, foliis anguftioribus. PITTAGHAEDIGHAS Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 22.

EUONYMUS Zeylanica, fructu quadrangulo, miniato. WAELAWAEL Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 67.

EUPATORIO affinis, planta Zeylanica, foliis Ulmi. *Breyn. Cent. pag.* 142. & *Moris. Tab.* 27. *fect.* 7. *Fig.* 29. ut & *Ray. hift. tom.* 1. *pag.* 294.

EUPATORIOPHALACRON Scrophulariae aquaticae foliis oppofitis. *Nobis. Tab.* 42. Eupatoriophalacron Scrophulariae folio trinervi. *Vaill. act. Reg. Paris. ann.* 1720. *pag.* 421. Conyza Zeylanica, latifolia, dentata, flore albo. *Herb. Hart.* Chryfanthemum Zeylanicum, Scrophulariae aquaticae folio, LAVENIA dictum. *D. Scherard.* apud *Ray. tom.* 3. *pag.* 217.

Habet haec elegans planta caulem viridem, rotundum, cui folia lata adcrefcunt bina oppofita, feffilia, longo & tenuiffimo principio ortum ducentia, ad tertiam fere partem integra, feu non dentata, dein incifiones feu dentes profundos habentia, obtufos: Folia autem funt glabra, tenuia, fuperiore parte viridia, inferiore glauca, venis magnis albicantibus, & cofta per medium validiffima donata. Flores in fummo caulis, ubi divaricatus eft, gerit, longis in pediculis gemellos, qui communi pedunculo, dein divifo, folitarius fuo fuftinetur pediculo. Flores hi juxta *Hertog* funt albicantes, quorum anatomiam, characteremque exactiffime dederunt *Vaillant in act. Paris loc. citat.* & *Dillen. in H. Elth. pag.* 138.

EUPHORBIO-TITHYMALUS fpinofus, caule rotundo, & angulofo, foliis Nerii latioribus, & anguftioribus. *Nobis.* Tithymalus Zeylanicus, fpinofus, arborefcens. *Par. Bat. Pr. pag.* 381. *Plukn. Phyt. Tab.* 230. *Fig.* 4. Tithymalus Indicus, arborefcens, fpinofus, Nerii folio. Ela Calli. *H. Amft. part.* 1. *Fig.* 13. *pag.* 25. Tithymalus arborefcens, fpinofus, Zeylanicus, foliis Laurinis. Ela Calli. *Par. Bat. App. pag.* 13. Tithymalus arbor, Indica, fpinofa, foliis latis, Linguae Caninae facie. *Muf. Zeyl. pag.* 54. Euphorbio & Tithymalo media affinis, aizoi-

aizoides, Indica, arborefcens, fpinofa, Nerii folio. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 45. Ela Calli *H. Malab. part.* 2. *Tab.* 43. quod Euphorbium fecundum, hactenus ignotum *Commel. in notis.* & *Fl. Malab. pag.* 28. Tithymalus Africanus, arborefcens, fpinofus, & foliofus, lactefcens, & Euphorbium fundens; feu Euphorbium Africanum, arborefcens, foliofum & fpinofum. *H. Beaum. pag.* 39. Varietas eft Euphorbii angulofi, foliis Nerii latioribus. *Boerh. Ind. H. L. B. part.* 1. *pag.* 259. qui eft Tithymalus aizoides, arborefcens, fpinofus, caudice rotundo, Nerii folio. *Commel. praelud. Botan. pag.* 22. & Tithymalus aizoides, arborefcens, fpinofus, caule angulari, Nerii folio. *Commel. praelud. Botan. pag.* 56. quae tantum differunt una caule rotundiori; altera magis angulofo, & folio latiori, & anguftiori; unde & in *act. reg. Paris. ann.* 1720. *pag.* 501. diftinguitur in Euphorbium fpinofum, amplo Nerii folio, & Euphorbium fpinofum, angufto Salicis folio. Quas tantum varietates habeo, fi vero quis diftinctas velit fpecies, per me licet. vide & *Act. Philof. Lond. vol.* 22. *num.* 287. *pl.* 24. ubi a *Petiv.* Ricinus Malabaricus, fpinofus, Phyllitidis folio vocatur.

EUPHORBIUM trigonum, fpinofum, rotundifolium. *Act. Reg. Paris. ann.* 1720. *pag.* 500. Euphorbium verum antiquorum Scadida-Calli. *H. Amftel. part.* 1. *pag.* 23. Euphorbium Indicum, Opuntiae facie, caule geniculato, triangulari. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 44. *Moris. Hift. pl. tom.* 3. *pag.* 345. *Commel. Fl. Malab. pag.* 27. Tithymalus Indicus, fpinofus, & angulofus, lacte turgens acri. *H. Beaum. pag.* 41. Scadida-Calli. *H. Malab. part.* 2. *Tab.* 42. Tithymalus aizoides, triangularis, nodofus, & fpinofus, lacte turgens acri. *Plukn. Almag. pag.* 370. Euphorbium verum antiquorum *Ray. Hift. pl. pag.* 873. *Boerh. Ind. H. L. B. tom.* 1. *pag.* 269. Euphorbii characterem vide apud *Linnaeum in char. pl. gen. pag.* 152. vires vero & ufum apud *Samuel Dale Pharmac. pag.* 279.

EUPHORBIUM trigonum, & tetragonum, fpinofum, ramis compreffis. *Act. Reg. Paris. ann.* 1720. *pag.* 500. Euphorbio fimilis, *Sadricalli* Indorum, quae forte Euphorbium triangulari caule, ramis planis, compreffis, Opuntiae facie, appellari poteft. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 44. Rangiferi cornua referens, planta Zeylanica, *Sandricalli* Zeylonenfibus. *Par. Bat. Pr. pag.* 368. Tithymalus aizoides, triangularis, & quadrangularis, nodofus, & fpinofus, ramis compreffis. *Commel.*

Prae-



FILIX non ramosa Zeylanica, foliis Adianthi in modum ſerratis.

Praelud. Botan. pag. 21. & Tithymalus aizoïdes, triangularis, & quadrangularis, articulofus & fpinofus, feu fpinis geminis aduncis ex eadem fede ortis armatus, fucco lacteo acerrimo turgidus. *H. Beaum. pag.* 41. vide & *Plukn. Phyt. Tab.* 320. *Fig.* 2. & *Almag. pag.* 370.

FAGARAS Avicennae, *Cluf. ad Garc. Hift. arom. lib.* 1. *cap.* 23. Cubebis affinis, Fagara major, *C. B. P. pag.* 412. Fagara major, Imperato. *ibidem.* GUEGELA-ETTA Zeylonenfibus dicta. *Plukn. Almag. Botan.* 143. ubi cum Fagara Abenfinae, vel Avicennae conjungitur.

FILIX non ramofa, Zeylanica, foliis Adianthi in modum ferratis. *Herb. Herm. Tab.* 43. Filix Zeylanica, foliis Adianthi in modum ferratis. *Muf. Zeyl. pag.* 36. Adianthum Africanum, Rutae Murariae aemulum, fegmentis longioribus, acutis. *Plukn. Phyt. Tab.* 132. *Fig.* 6. Alta haec, & erecta Filicis fpecies caule adfurgit fimplici, firmo, glabro, purpurafcente, e quo pinnae foliorum egrediuntur virides, glaberrimae, fenfim attenuatae, longiffimae, verfus bafin laciniatae, laciniis paulo longioribus & acutioribus, lacinia fingula fecundum marginem ferrato-dentata eft, fatis profunda, crenulâ bifidâ, quandoque trifidâ. Apex autem pinnarum, qui acutiffimus, & tenuiffimus eft, integer exiftit per fpatium unciale. Peculiare eft in hac planta, quod pinnae, quo magis ad radicem fint pofitae, eo propius fibi accedant, & in infima plantae parte fere oppofitae, quae alias alternatim proveniunt, in caulis medio maxime remotae, ad fummum iterum arctius unitae, quod ob plantae altitudinem in Figura noftra, fi jufta & naturalis foliorum magnitudo, quae in omnibus noftris Tabulis, quantum fieri potuit, fervata eft, in infima ejus parte exprimi haud potuit, fumma enim & dimidia fere totius caulis pars exfculpta eft.

FILIX, foliis alternis, denticulatis, indivifis, uncialibus. *Muf. Zeyl. pag.* 7. Trichomanis cubitalis fpecies. *ibidem. pag.* 9. RILLA Zeylonenfibus.

FILIX, fimilis ramofae Alpini, anguftioribus vero foliis, & tantum femel ad bafin divifis. RILLA Zeylon. *Muf. Zeyl. pag.* 11.

FILIX ramofa, Zeylanica (foeminae fpecies) divifuris integris, noftra anguftioribus, femel aut bis diffectis. *Muf. Zeyl. pag.* 32.

Filicis humilis species, segmentis longis, & angustis. *Muf. Zeyl. pag.* 25.

Filix Zeylanica, foliis integris, in margine leviter serratis. *Muf. Zeyl. pag.* 35. Filix exotica, praelongis & angustis ramulis, denticulata. *Plukn. Phyt. Tab.* 181. *Fig.* 5.

Filix Zeylanica, foliis auriculatis, brevibus obtusis. *Muf. Zeyl. pag.* 35. an Filix palustris, mas, non ramosa, pinnulis obtusioribus, ex insula Bermudiensi. *Plukn. Phyt. Tab.* 242. *Fig.* 6?

Filix Zeylanica, ramosa, denticulata. *Muf. Zeyl. pag.* 35. Filix Bermudiensis, elegans, ramosa, pinnis rarioribus, profunde dentatis, &c. *Plukn. Phyt. Tab.* 244. *Fig.* 2.

Filix Zeylanica, denticulata, non ramosa. *Muf. Zeyl. pag.* 36. *Tab.* 44. *Fig.* 1. Filix Zeylanica, dentata. *ibidem.* Filix Zeylanica, denticulata, GHODHAMI-WANA Zeylonensibus. *Herbar. Gronov.* Filix pyramidalis, Maderaspatana, elegans, pinnulis serratis. *Muf. Petiv. no.* 55. *Tab.* 1. icon. Filix Bermudiensis, non ramosa, petraea, pinnis acutioribus, planis, hirsute pubescentibus. *Plukn. Phyt. Tab.* 244. *Fig.* 1. Filix non ramosa, major, surculis raris, brevioribus, pinnulis crebris, latis, brevibus, non aculeatis. *Sloan. Catal. pl. Jam. pag.* 20. & *Hist. Jam. part.* 1. *pag.* 90. *Tab.* 48. *Fig.* 2. quae est Filix Indica, major, alis longis, rotundis, crenatis, binis macularum ordinibus ad oras notatis, Arana-Panna *H. Malab. part.* 12. *Tab.* 31. *Bobart. hist. Oxon. pag.* 575. quoad descriptionem:

Caulis hujus plantae est tenuis, rectus, longus, supra sulcatus, simplex, purpureus, e quo brevissimis pediculis proveniunt pinnae plurimum alternae, rarius oppositae, longae, tenues, per marginem profunde serratae: Unaquaeque serratura, si venarum situm spectemus, est fere ovata, superius glabra, & laete viridis, inferius fere fusca; Fructus aversa pinnae parte secundum marginem denticulorum natus, instar pulveris adspersi apparet.

Ex communicatione *Joh. Freder. Gronovii*, Botanici egregii, hanc cum duabus subsequentibus delineandam curavimus.

Filix Zeylanica, Lonchitidis facie. *Breyn. Cent. pag.* 189. *Tab.* 44. *Fig.* 2. Filicifolia, Lonchitis aspera, maxima Indorum. *Plukn. Phyt. Tab.* 30. *Fig.* 4. & *Almag. pag.* 152. Lonchitis aspera, Zeylanica, alis



FILIX *Zeylanica, denticulata, non ramosa. Mus. Zeyl.*





FILIX *Zeylanica, arborescens, pinnis alternis, longis, integris, in apice bifidis, caule membranis aucto. Nobis.*

alis falcatis, laeviſſime denticulatis, & ſuperiore latere auriculatis. *Bobart. Hiſt. Oxon. part.* 3. *pag.* 566. Quum in *Pluknetii Figura* ſuperior plantae pars deficiat, illam hac tabula ſupplemus. Peculiaris vero ſtructurae eſt haec planta, caulis enim in inferiore plantae parte hirſutiſſimus eſt, (qui male glaber a *Pluknetio* depictus eſt) ſpinulis, ſeu ſquamulis undique obſeſſus, quae ſenſim ad ſuperiora evaneſcentes, caulem in ſummo glaberrimum conſtituunt: Caeterum caulis tenuis eſt, ſulcatus, flexuoſus, ſimplex, inferius villoſus, ſuperius glaber. Pinnae communiter in parte inferiore oppoſitae, in ſuperiore alternae, ſimplices. Singula pinna habet fere faciem digiti, ad baſin transverſim angulo inferiore cauli annexa, ſuperiore autem magis producta, appendiculam conſtituens; margo vix notabiliter ſerratus eſt, quaelibet ſerratura tenuiſſimo aculeo vel ſetula terminatur. Fructus punctatim diſperſus eſt in pinnis ſupremis.

Filix Zeylanica, arboreſcens, pinnis alternis, longis, integris, in apice bifidis, caule membranis aucto. *Nobis. Tab.* 45. Filix arboreſcens, ex ſylvis Cotenſibus HERMANNI *Herbar. Gronov.* Filix ad alas folioſa. *Plum. Cat. pl. Amer. pag.* 11. An Filix arborea, ramoſa, caudice non diviſo, pinnulis anguſtis, raris, obtuſis, integris. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 22? Ad exemplar *Gronovii* manu *Hermanni* adſcriptum erat, foliorum decoctum habilitat uterum ad concipiendum. Elegans certe & rariſſima Filicis ſpecies eſt, quae tota quanta, glaberrima, nigricans, & ſplendens ſeſe offert: Cujus caulis rectus eſt, ad latera utrinque membranulis auctus; membranulae hae e tenuiſſima baſi incipiunt, & latere cauli adnectuntur, ſenſim latiores factae, tandemque in obtuſum deſinunt, longitudine unciali, latitudine ſumma bilineali, adeoque tales membranulae ſenſim ſeſe excipiunt, tanquam gradus in ſcala, & quae a latere oppoſitae ſunt, alternatim cum hiſce variant. Folia ſeu potius pinnae ſunt oblongo-lanceolatae, integerrimae, usque ad ſummum (ubi fiſſum eſt unumquodque folium) venoſae, ſeſſiles, ſingula in ſingulo ſinu membranae per gradus caulis proveniente, adeoque folium hocce compoſitum pinnatum eſt ex pinnis alternis.

Filix non ramoſa, foliis integris, non ſerratis, maxima, Indiae Orientalis. *Breyn. Cent. pag.* 189. Phyllitis *Bontii lib.* 6. *cap.* 34. Filix paluſtris, aurea, foliis Linguae Cervinae *Plum. pag.* 5. *Fig.* 7. Filix ſim-

 pliciter

pliciter pinnatis foliis, seu Phyllitis ramosa, Jamaicensis, maxima, aversa parte, ferruginea lanugine circumquaque obducta, a *Pluknetio* in *Almag. pag.* 154. huic jungitur, quae delineatur in Phytogr. *Tab.* 288. *Fig.* 1. Lonchitis palustris, maxima. *Sloan. Catal. pl. Jam. pag.* 15. Vide & notas ad *H. Malab. part.* 12. *Tab.* 12. *pag.* 25.

Filix non ramosa, Zeylanica, foliis integris, Filici vulgari similis, *Breyn. Cent. pag.* 188. *Ray. hist. pl. tom.* 1. *pag.* 143. an Filix mas, vulgari similis, pinnulis amplioribus, non crenatis, Virginiana. *Plukn. Phyt. Tab.* 179. *Fig.* 2?

Filix non ramosa, foliis integris, non serratis, Zeylanica, minor, *Breyn. Cent. pag.* 188. Filix major in pinnas tantum divisa oblongas, angustasque non crenatas. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 18. & *Hist. Jam. pag.* 48. *part.* 1. *Tab.* 40. Filix non ramosa alis longis, Salicinis, alternis, non crenatis. *Bobart. Hist. Oxon. part.* 3. *pag.* 572.

Filix non ramosa, altissima, palustris, pinnis integris, alternis, serratis, acutis. *Nobis. Tab.* 46. Filix Zeylanica, palustris, non ramosa, altitudine humana superior. *Herb. Herm.* Filix Zeylanica, glabra, latifolia, maxima. *Mus. Zeyl. pag.* 38. Filix non ramosa, foliis integris, serratis, Zeylanica. *Breyn. Cent. pag.* 188. *Ray. hist. pl. tom.* 1. *pag.* 141. quae a *Breynio* Haemionitidi, alteri *Dalechampii* perquam similis dicitur, quae depicta etiam reperitur in *Hist. Lugd. pag.* 1218. sed quae serraturas habet profundiores, & minor ac humilior est.
De nostra in *Mus. Zeyl.* dicitur: foliis est longis, sesquiunciam latis, venosis; Plurimi exiles nervi, recte a medio nervo ad margines excurrunt: quibus addo, quod margines sint laeviter serrati, serraturis angustis, nervus vero medius est crassus, ab utraque folii parte protuberans & conspicuus, coloris straminei, cujus etiam est caulis. Folia sunt pinnata, glaberrima, nervosa, laete viridia, ex caule provenientia.

Filix Zeylanica, scandens, foliis crassis, & angustis. *Mus. Zeyl. pag.* 39. Filix scandens, perpulchra, Indica. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 46.

FLOS CLITORIUS flore coeruleo. *Nobis.* flos Clitorius. *Breyn. Cent. pag.* 76. ubi icon & descriptio *Petiv. Act. Phil. Lond. vol.* 20. *no.* 244. *pl.* 19.



FILIX non ramosa, altissima, palustris, pinnis integris, alternis, serratis, acutis. Nobis.

pl. 19. Clitorius Zeylanicus, flore coeruleo. *Hart. Catal. femin.* Flos coeruleus, Bonga Biru. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 7. *cap.* 30. Phafeolus Indicus, Glycyrrhizae foliis, flore amplo coeruleo. *H. Amft. tom.* 1. *pag.* 47. Phafeolus Indicus, purgans, feu Galega Phafeoloides Zeylanica, flore coeruleo. *Muf. Zeyl. pag.* 10 & 31. Phafeolo adfinis, Glycyrrhizae Germanicae foliis, Orientalis, flore amplo coeruleo. *Par. Bat. Pr. pag.* 364. Phafeolus Indicus, Glycyrrhizae foliis, flore coeruleo amplo, five Flos Clitoridis. *Breyn. Prodr.* 1. *pag.* 43. Flos Clitoridis Ternatenfium *Amm. Char. pl. pag.* 62 & 394. Phafeolus Indicus, coeruleus, Glycyrrhizae foliis alatis, flore amplo Clitorio. *Plukn. Almag. pag.* 294. Faba purgatrix CATHARODU Zeylonenfibus. *Grimm. Labor. Ceyl. pag.* 124. vocatur & KATARODUWAEL in *Muf. Zeyl.* ubi additur: Ex fructu deftillatur aqua Ophthalmica. Farina Fructuum in jufculo ad drachmas duas data, & affumpta, alvum leniter folvit. in *Labor. Ceyl.* notatur, quod fabae exficcentur, & ex iis pulvis conficiatur, qui cum Lacte *Cocos* affumptus, aut jufculo, leniffime purgat, & dolorem mitigat in Colica, Stomachum etiam, & vifcera juvat. dofis eft, drachma una ad tres.

FLOS CLITORIUS, flore albo. *Nobis:* Phafeolus Zeylanicus, purgans, floribus albis. *Muf. Zeyl. pag.* 61. Galega Phafeoloides Zeylanica, flore albo. *ibidem. pag.* 32. Clitorius flos albus *H. L. Bat. pag.* 162. Phafeolo affinis, Glycyrrhizae Germanicae foliis, Orientalis, flore albo. *Par. Bat. Pr. p.* 365. & *Fl. Malab. p.* 54. Schanga-Cuspi. *H. Malab. part.* 8. *Tab.* 38. KATARODU haec quoque Zeylonenfibus audit, eftque prioris varietas.

FRUCTUS Indicus, farmentofus, foliis hispidis, rigidis, ad quamvis materiam laevigandam commodiffimus. *Muf. Zeyl. pag.* 19. KOROSWAEL & KOROSSAWAEL Zeylonenfibus. Nomen tulit a *Koroffa* laevigare; folia enim plantae, cum admodum denfa & fcabra fint, ufurpantur ab incolis ad poliendam, & laevigandam quamcunque rem.

FRUTEX trifolius, fpicatus, producens baccas nigras, *Muf. Zeyl. pag.* 24. Rhois trifoliatae frutex Salawaccenfis, floribus juliformibus *Muf. Petiv. no.* 678. & *Ray. tom.* 3. *pag.* 58. *Dendrol.* KOBBAE Zeylonenfibus.

FRUTEX Zeylanicus, ſpinoſus, Jasmini flore, folio ſubrotundo, ſiliquis falcatis. *Muſ. Zeyl. pag.* 33.

FRUTEX Zeylanicus, ſpinoſus, KATHUPILA dictus. *Muſ. Zeyl. pag.* 39.

FRUTEX ſpinoſus, baccas ſanguineas, oblongas proferens. *Muſ. Zeyl. pag.* 56.

FRUTEX Zeylanicus, ſpinoſus, ſarmentoſus, fructibus rubicundis, carnoſis, rotundis. *Muſ. Zeyl. pag.* 59.

FRUTEX ſarmentoſus, ligno croceo, levi, longe lateque ſpargens. *Muſ. Zeyl. pag.* 47. ubi additur, ſaepe ultra duo, aut tria millia paſſuum in circumferentia prorepit. BANWAL Zeylonenſibus dicitur a *Bana* quod funiculum ſignificat ad alligandum boves, talia enim conficiunt ex tenuioribus hujus ſarmentis.

GAEDHUMBA *Muſ. Zeyl. pag.* 60. ſic dicitur a glutine, quia corticis ſuccus viſcoſus eſt, ac glutinoſus.

GALANGA minor, *Muſ. Zeyl. pag.* 51. *Cluſ. Aromat. hiſt. lib.* 1. *cap.* 40. *pag.* 211. *Acoſt. apud Cluſ. cap.* 31. *pag.* 275. Galanga & Galanga minor Officinarum. *C. B. Pin. pag.* 35. vide & *Ray. tom.* 2. *pag.* 1337. &c. Galanga major & minor, Lanquas & Lampujang apud *Rumph. in Herb. Ambon. lib.* 8. *cap.* 9 & 10. eleganter deſcribuntur. MAHUKALUWA haec quoque Zeylonenſibus dicitur, quod nomen *Zedoariae rotundae* etiam tribuitur; ut patet ſupra ad *Colchicum pag.* 68.

GALANGA ignobilior. *Muſ. Zeyl. pag.* 51. Galanga major *C. B. Pin. pag.* 35. qui utriusque plura habet ſynonyma, apud *Acoſt. in edit. Venet. pag.* 45. hujus habetur figura. Vide apud *Cluſ. lib.* 1. *aromat. cap.* 40. & *Acoſt. cap.* 31. Galangae majoris & minoris deſcriptionem ac uſum habet etiam *Samuel Dale in Pharmac. pag.* 330. *Grimm.* autem in *Labor. Ceyl. pag.* 122. de Galanga majore haec habet: Nos ipſi hanc, prout neceſſitas poſtulavit, ſaepiſſime uſui adhibuimus, & apud nos abundanter plantari poteſt, nam parvae eſt altitudinis; albos flores emittit, ſicut & fructum non abſimilem ipſi Cardamomo &c. Propter quam rationem inter ejus ſpecies libenter fructum illum annumerarem. Iſtius radicis vires ſufficienter ſunt notae. E floribus conſervam com-

compono, quae radice jucundior eſt ad tenerarum perſonarum uſum. KUDAKALUWA Zeylonenſibus.

GALEGA quadrifolia, TELAMANDUKOLA Zeylonice dicta. *Muſ. Zeyl. pag.* 15. nomen habet a *Tela* quod notat illud, quod ſine butyro coctum ſaporoſum eſt: Coquitur autem haec herba loco Bliti.

GALEGA Indica, ſiliquis articulatis, foliis latioribus, ramulis ad exortum alatis. *Muſ. Zeyl. pag.* 24. & 55. Sesban Alpini folio latiori DYA-HYABALA Zeylonenſibus. *ibidem*.

GALEGA Indica, minor, hexaphylla. *Muſ. Zeyl. pag.* 42. TORA & TO-RAKOLA Zeylonenſibus. vide ſupra ad CASSIAM *pag.* 56.

GALEGA Indica, fruteſcens, ſpinuloſa, ſiliquis anguſtis, longiſſimis, folio Mimoſae. *Muſ. Zeyl. pag.* 64. & Galega Ægyptiaca, ſiliquis articulatis. *ibidem*. *C. B. Pin. pag.* 352. Sesban *Alpini Pl. Ægypt. pag.* 81 & 82. *Amm. H. Boſian. pag.* 33. & Sesban aculeatum *Veſlingii pag.* 27. Vide hanc cum ejus charactere deſcriptam in *Ponted. Anthol. pag.* 284. & *ſeq.* an eadem cum *Emero* ſuperius deſcripto?

GALEOPSIS Zeylanica, folio oblongo, flore albo. *Herb. Herm. Tab.* 20. *Fig.* 3. ſupra expreſſa eſt.

Caulem gerit haec planta quadrangularem, hirſutum, viridem; folia bina oppoſita, ſcabra, ſuperiore parte viridia, inferiore pallidiora, oblonga, & obtuſa. Flores ad alas foliorum locantur verticillati, parvi, albicantes, longis in calicibus, hirſutis, diſſectis contenti, qui ſemina poſt ſe relinquunt oblongo-rotunda, nigra, quae pericarpio magno, in ſummo corniculis quatuor inſtructo, occluduntur.

GALLIUM Zeylanicum, minimum, odoratum. *Muſ. Zeyl. pag.* 51.

GALLIUM Zeylanicum, ſylveſtre, Lini folio, flore albido. *Hert. Catal. ſemin.* Convenit forte cum Gallio albo Linifolio. *Barl. Obſerv.* 99.

GAMBU Moluccanum, odore roſeo. *Muſ. Zeyl. pag.* 48. GABBU Zeylonenſibus. Fructus hujus arboris parvi ſunt, Meſpili magnitudine, lutei, odore roſeo. Alia hujus ſpecies Pyri magnitudine ac forma eſt.

Jam-

Jambos Acoſtae. arbores has ex Europa in Zeylonam eſſe tranſlatas credunt. vide infra ad *Jambos.*

GENISTA articulata, repens, foliis craſſiuſculis, planis, acutis. *Nobis. Tab.* 47. *Fig.* 1. Geniſta Zeylanica, ſylveſtris, repens, flore coeruleo. *Herb. Hert.* Hedyſarum monophyllum, repens, ſiliculis glabris, non crenatis. *Muſ. Zeyl. pag.* 33. UDUPYALI alia ſpecies, folio ſingulari, oblongo. *Muſ. Zeyl. pag.* 5.
In ſylvis magna copia haec planta per terram repens, & ſeſe diffundens reperitur, caules multos, rotundos, virides emittens, ubi folia erumpunt, nodoſos ſeu articulatos, paleaceos, ex ſingulo nodo unicum producens folium, quod ſatis longo, & firmo ſuſtinetur pediculo, glaberrimum, laete virens, aequale, craſſum, oblongum, acuminatum. Floſculi in longis ſpicis ſuſtinentur, plures alternatim in ſpica, quae ex alis foliorum erigitur, provenientes, tenuibus, ſed magnis, acutis, quadrifariam diſſectis, paleaceis calicibus contenti, & fere occluſi; ſunt minimi, coerulei, papilionacei. Siliquae binae in ſpica ſimul producuntur communi primo, dein proprio pediculo inſedentes, copioſae admodum hae in ſpicae faſtigio apparent, quae ſunt virides, planae, glaberrimae, nullis articulis vel interſtitiis diſtinctae, ſeminibus reniformibus repletae. Unde ad *Geniſtam* & non ad *Hedyſarum* pertinet. Cumque hac convenire videtur denominatio *C. B. in Pin. pag.* 395. quae Geniſta ramoſa, Hyperici folio ab eo vocatur; noſtrae enim folia Hyperico ſimillima ſunt, & planta ipſa ramoſa admodum eſt. Differt autem ab Hedyſaro Indico, folio ſingulari, ſubrotundo. *Tournef. inſtit. pag.* 401. uti ex *Plukn. Phyt. Tab.* 59. *Fig.* 3. patet.

GENISTELLA Zeylanica, ſpinoſa. *Muſ. Zeyl. pag.* 58. an Geniſtella ſpinoſa, Africana, Laricis folio, *Breyn. Cent. pag.* 68?

GENTIANA Indica, flore patulo, coeruleo, Calthae paluſtris facie, radice tenui, fibroſa. *Muſ. Zeyl. pag.* 33. Gentiana Indica, aquatica, caule quadrato, floribus coeruleis, amplis, radice fibroſa. *ibidem. pag.* 53. GHIROTILLA Zeylonenſibus.

GERANIUM maximum, Zeylanicum, Tuſſilaginis folio, flore purpureo. *Alb. Sebae rer. nat. theſ. part.* 1. *Tab.* 26. *Fig.* 2. *pag.* 42. Characterem hujus generis expoſuit *Linnaeus in char. gen. pl. pag.* 204.

GHAE-



Fig. 1. Fig. 2.

GENISTA articulata, repens, foliis crassiusculis planis, acutis. Nobis.

HEDYSARUM monophyllum, latifolium, siliculis plurimis spica longa digestis. Nobis.

GHAERIETHAGAS, feu arbor bovina. *Muf. Zeyl. pag.* 23 & 32. nomen fignificat offa vaccarum, quia lignum offa refert.

GHALBERYA *Muf. Zeyl. pag.* 22. a *Ghal* quod lapidem, & *Berya* quod cribrare fignificat; purgat enim haec planta fordes pedum.

GHANDAPANA. *Muf. Zeyl. pag.* 60. *Ghanda* notat foetorem, folia enim foetent. *Pana* alia fpecies eft, nec foetens, nec olens.

GHODHAMELUM *Muf. Zeyl. pag.* 16. Flos eft Antirrhini. Planta eft refrigerans, bilem maxime educit, fanat Icterum, praefertim cum lacte vaccino data. ut notatur in *Muf. Zeyl. Orletambari* Malabaris.

GHODHAPARAGHAHA. *Muf. Zeyl. pag.* 70. fic dicitur, quod crefcat folo duro, *Ghodha* vocato. *Para* additur, quod & alia ejus fpecies eft, PARA vocata.

GHONAPITTAN *Muf. Zeyl. pag.* 68. *Ghona* Cervum, *Pittan* dorfum notat, folia quodammodo Cervi dorfum repraefentant. ut dicitur in *Muf. Zeyl.*

GRAMEN Alopecuroides. *Muf. Zeyl. pag.* 5. Gramen Alopecuras, Zeylanicum, *ibidem. pag.* 45. Gramen forte Alopecuroides Indicum, majus, vel minus &c. *Plukn. Phyt. Tab.* 92. *Fig.* 4 & 5. KAWULA Zeylonenfibus.

GRAMEN amoris, minus. *Muf. Zeyl. pag.* 25. Gramen forte amoris alterum, paniculis ftrigofioribus magisque fparfis. *Ray. Catal. pl. exter.* apud *Plukn. Phyt. Tab.* 92. *Fig.* 2. Gramini tremulo affine, panniculatum, elegans, minimum *Sloan. Cat. pl. Jam pag.* 34. an Tsjama-Pullu *H. Malab. part.* 12. *Tab.* 41? an Amourettes Maderaspat. pannicula minus fparfa locuftis perexiguis. *S. Brouwn. lib.* 7. *no.* 293. apud *Scheuchz Agraft. pag.* 197?

GRAMEN arundinaceum, Lithofpermi femine, minus. *Muf. Zeyl. pag.* 45. an Gramen Cyperoides fylvaticum, maximum, geniculatum, afperius, femine Milii Solis. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 36. & *Hift. part.* 1. *p.* 118. *Tab.* 77. *Fig.* 1? WELHIRI Zeylonenfibus.

GRAMEN arundinaceum, tibicinum, Zeylanicum, NALAGHAS. Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 45.

GRAMEN cruciatum Zeylanicum, an Gramen Miliaceum latifolium? *Muf. Zeyl. pag.* 6. an Gramen ifchaemon Malabaricum, fpeciofius, longioribus & mucronatis foliis. *Plukn. Phyt. Tab.* 300. *Fig.* 8? Gramen dactylon, Ægyptiacum *C. B. P. pag.* 7. & *Fl. Botan. pag.* 110. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 34. Gramen dactylon fpicis brevibus craffis, plerumque quatuor cruciformiter difpofitis. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 33. ubi vide plurima fynonyma, & *Hift. Jam. pag.* 110. *vol.* 1. Gramen vaccinum, Rompot Carbou *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 10. *cap.* 5. Cavara-Pullu *H. Malab. part.* 12. *Tab.* 69. ITANA & IDADHU Zeylonenfibus. *Idadhu* fignificat cufpidem arcuum ferream, Cinghalenfium, cujus cufpidis formam referunt hujus plantae folia. *Tana* eft particula adjectiva, herbarum nominibus admodum familiaris.

GRAMEN cruciatum, fupinum, Zeylanicum, humi repens. *Muf. Zeyl. pag.* 45. Gramen dactylon procumbens, craffum & viridius, cumlo reclinato. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 33. & *Hift. Jam. vol.* 1. *pag.* 111. Gramen dactylon cruciatum, Americanum &c. *Plukn. Phyt. Tab.* 189. *Fig.* 7. ITANA Zeylonenfibus.

GRAMEN Dactyloides fpicis deorfum ariftatis. *Nobis. Tab.* 47. *Fig.* 1. Gramen fpica divifa Zeylanicum, ex una parte ariftis donatum. *Muf. Zeyl. pag.* 36. Gramen dactylon, elatius fpicis plurimis tomentofis. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 33. & *Hift. Jam. tom.* 1. *pag.* 111. *Tab.* 65. *Fig.* 2. Gramen Dactylon, Indicum, fpicis villofis, fubrubefcentibus. *Bobart. Hift. Oxon. part.* 3. *pag.* 185. Gramen Zeylanicum, fpica in quinque vel fex partes divifa. *Heift. Cat. pl. Acad. Jul. ann.* 1733. *pag.* 8. Florum fpicae e fummitate caulis veluti ex eodem puncto oriuntur, quinque, fex, vel feptem fimul, una vel altera interdum brevi fpatio remota e caule exit. Omnes funt fpicae oblongae, digitales, rectae, vel laeviter incurvatae, heteromalae verfus latus inferius, conftant omnes glumis alternatim pofitis, muticis, duae vel tres in communi calice mutico exceptae funt. Caulis eft fefquifpithamalis, laevis, ftriatus, glaber. Folia attingunt faepe longitudinem caulis, ad margines fcabra, latitudine per totam longitudinem aequalia, ftriata, laevia.

GRA-


GRAMEN panniculatum, locustis tenuissimis subrotundis. Nobis.
Fig. 3.
GRAMEN pusillum Junci capitulis minimis, ad basin foliolis binis auctis. Nobis.
Fig. 2.
Fig. 1.
GRAMEN Dactyloides spicis deorsum aristatis. Nobis.

GRAMEN Dactylon, Zeylanicum, radice tuberofa, aromatica, dulci, odorata. *Muf. Zeyl. pag.* 66. Gramen dactylon, aromaticum, multiplici pannicula, fpicis brevibus, tomento candicantibus. &c. *Plukn. Phyt. Tab.* 190. *Fig.* 1. KALANDURU Zeylonenfibus.

GRAMEN Dictacophoron, fpica turgida, criftata. *Muf. Zeyl. pag.* 25. Gramen dactylon, bicorne, tomentofum, minus. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 33. & *Hift. Jam. part.* 1. *pag.* 110. *Tab.* 68. *Fig.* 2. an Gramen Dactylon, Siculum, multiplici pannicula, fpicis ex eodem exortu geminis? *Ray. hift. pl. pag.* 1271. *Plukn. Phyt. Tab.* 92. *Fig.* 1.

GRAMEN Dactylon, Zeylanicum, minus. *Heift. Cat. pl. Acad. Jul. ann.* 1732. *pag.* 11. an Gramen dactylon bicorne, fpicis purpurafcentibus, minus. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 34. & *Hift. vol.* 1. *pag.* 112. *Tab.* 68. *Fig.* 1.

GRAMEN Cyperinum, Zeylanicum, vulgare, minus, KALANDURA Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 2 & 4. an Gramen Cyperoides, minus, fpicis compactis, fubrotundis, flavicantibus, *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 36. & *Hift. vol.* 1. *pag.* 119. *Tab.* 79. *Fig.* 1?

GRAMEN Cyperinum, Zeylanicum, radice tuberofa, *Hin* Zeylonenfibus dictum. *Muf. Zeyl. pag.* 4. an Gramen Cyperoides, minimum, fpica fimplici, compacta, radice tuberofa, odorata. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 36. & *Hift. vol.* 1. *pag.* 120. *Tab.* 79. *Fig.* 2?

GRAMEN Cyperinum, Zeylanicum, porcinum, capitulis conglobatis, rotundis. *Muf. Zeyl. pag.* 7. Gramen Cyperoides latiore folio, pannicula in fummitate caulis conglomerata. *Plukn. Phyt. Tab.* 190. *Fig.* 8. vel potius Gramen Cyperoides, minus, fpica compacta, fubrotunda, viridi radice odorata. *Sloan. Cat. pl. Jam. p.* 36. & *Hift. vol.* 1. *pag.* 119. *Tab.* 78. *Fig.* 2. URUKIRI Zeylonenfibus. ab *Uru* quod porcum notat, a porcis enim hoc gramen appetitur.

GRAMEN parvum, fpica triunciali, ramofa, inftar Cyperi Miliacei. *Muf. Zeyl. pag.* 26. Gramen Cyperoides pumilum, elegans Maderasp. *Plukn. Phyt. Tab.* 191. *Fig.* 8.

Gramen Cyperinum, junceum, longiffimum, HASPAN vocatum. *Muf. Zeyl. pag.* 23. an Gramen Cyperoides, Maderasp. pannicula magis fparfa, & fpeciofa. *Plukn. Phyt. Tab.* 192. *Fig.* 2?

Gramen Cyperinum, Indicum, minimum, capillaceum, feu barbatum. *Muf. Zeyl. pag.* 57. an Gramen Cyperoides, minimum, fpicis pluribus compactis & oblongo-rotundis. *Sloan. Cat. pl. Jam. p.* 36. & *Hift. vol.* 1. *pag.* 120. *Tab.* 79. *Fig.* 3? Seu Gramen junceum perpufillum, capillaceis foliis, Æthiopicum *Plukn. Almag. pag.* 179. & *Phyt. Tab.* 300. *Fig.* 5? MANGHARUDAELI Zeylon. *Mangharu* pifciculi barbati nomen eft. *Daeli* barbam notat.

Gramen Cyperinum, Zeylanicum, majus, alterum. *Muf. Zeyl. pag.* 58. an Gramen Cyperoides, Indicae Orientalis elatius, pannicula fparfa, pallefcente. *Plukn. Phyt. Tab.* 191. *Fig.* 7?

Gramen Cyperinum, KARABUHIRI dictum. *Muf. Zeyl. pag.* 45.

Gramen Cyperinum, maximum, MAHAKIRI dictum. *Muf. Zeyl. pag.* 45. an Gramen Cyperoides, majus, fpicis ex oblongo rotundis, compactis, ferrugineis. *Sloan. Cat. pl. Jam. p.* 36. & *Hift. vol.* 1. *pag.* 118. *Tab.* 77. *Fig.* 2?

Gramen Cyperinum, minimum, HINKIRI dictum. *Muf. Zeyl. pag.* 45.

Gramen Cyperinum, medium, inaugurale, ÆLHIN dictum. *Muf. Zeyl. pag.* 45. *Æl* Oryzam nondum mundatam, feu decorticatam notat. *Hiri* Oryza eft. Inter Oryzam autem hoc gramen crefcere folet. *Inaugurale* vocatur, quia Cinghali ex hujus graminis luxuria inaugurantur agrorum fertilitatem, nec fpes bonae frugis illos facile fallit, fi Oryzâ conferunt agros, quos gramine hoc luxuriantes obfervarunt: ut notatur in *Muf. Zeyl.*

Gramen Junceum, Chamaemeli capitulis, aphyllis, albis, *Muf. Zeyl. pag.* 7. Gramen Indicum, capitulis tomentofis *ibidem. pag.* 57. Gramen junceum, Indiae Orientalis, minus, capitulo rotundo, ex paleaceis fpiculis in cacumine caulis glomerato. *Plukn. Mantiff. pag.* 98. KOKMOTHA Zeylonenfibus. *Motha* fignificat fagittam fine cufpide ferreo, fed lignofo, in globuli formam facto. *Koka* aviculam parvam, can-

candidam, longo collo, capite albicante, quod gramen hoc repraesentat. Pedem circiter altum eſt, foliis latioribus dordiano, ut deſcritur in *Muſ. Zeyl.*

GRAMEN junceum, foliis capillaceis ſericeis, capitulis minimis, rotundis. *Muſ. Zeyl. pag.* 8. PENDA Zeylonenſibus, quod caudam avium notat.

GRAMEN junceum, Chamaemeli capitulis albis, aphyllis, minus. *Muſ. Zeyl. pag.* 8. KOKMATHA minor *ibidem. pag.* 20. ubi additur: Haec eſt illa ſpecies, quam habet *D. Doody.* Gramen junceum, minus e Maderasp. ſeu Juncus pumilus, capitulis in ſummitate aphyllis. *Plukn. Phyt. Tab.* 192. *Fig.* 7.

GRAMEN Indicum, capitulis oblongis, floridis, aureis, ſquammatis. *Jupicai* Bontii. *Muſ. Zeyl. pag.* 41. *Erva* d'*Empige* Luſitanis *ibidem.* & *Piſonis pag.* 238. Gramen florens capitulo ſquamoſo. *Ray. hiſt. p.* 1318. & *Commel. Fl. Malab. p.* 34. Kotsjiletti-Pullu *H. Malab. part.* 9. *Tab.* 71. ubi vide notas. RANMOTHA Zeylonenſibus. *Ran* denotat aurum. *Motha* quodcunque corpus tenerum; hujus enim plantae capitula oblongo-rotunda, aurei coloris ſunt.

GRAMEN floridum, luteum, capitulis ſquammatis, majus. *Muſ. Zeyl. pag.* 50. MOTHTHU Zeylonenſibus, quod notat capitellum, quod gladiorum manubriis inponitur.

GRAMEN Junceum, Zeylanicum, odoratum. *Muſ. Zeyl. pag.* 57. Radix Indica odore Cyperi. *ibidem. pag.* 51. SAEWAENDARA Zeylonenſibus, quod notat odorem. *Lambutſchi veru*, id eſt radix odorata. Subſtituunt has radiculas odoratas pro Cypero ac Iride. Comeſtae reddunt urinam odoratam, eamque promovent. *Muſ. Zeyl. pag.* 52.

GRAMEN paludoſum, Junci capitulis ad baſin folioſis. *Muſ. Zeyl. pag.* 45. an Gramen junceum, aquaticum, capitulis cum foliis capillaribus ſimul ortis proliferum. *Plukn. Phyt. Tab.* 32 *Fig.* 3? &c. BINTANA Zeylonenſibus.

GRAMEN puſillum, Junci capitulis minimis, ad baſin foliolis binis auctis. *Nobis. Tab.* 47. *Fig.* 2. Gramen glareoſum, Junci capitulis ad baſin folio-

foliofis. *Muf. Zeyl. pag.* 45. Gramen Junceum parvum, feu Holofteum, ftrictiffimis & hirfutis foliis. *Plukn. Phyt. Tab.* 299. *Fig.* 3. Juncus foliatus, minimus. *J. B. tom.* 2. *lib.* 18. *pag.* 523. Huc fpectat Motta-Pullu *H. Malab. part.* 12. *Tab.* 38. HADUTANA Zeylonenfibus.

Graminis noftri radices funt capillares, plures, fimplices, ferpentinae, albicantes, quae ex capitulo eodem protrudunt folia plurima capillaria, longitudine circiter digiti, interftincta dein brevibus, acuminatis, acutis, fulcatis fquamis. Folia haec majufcula verfus apicem, vel ab eo dimidio uncialis fpatio protrudunt flofculum unicum, vel alterum e latere inferius foliolo tenuiffimo fuffultum. Flos hic conftat fquamis fex, calicinis, in orbem pofitis, oblongo-acuminatis, includens fex ftamina, & unicum piftillum, absque ullis petalis, tandem proferens fructum membranaceum trilocularem. Parvitate certat cum Scirpo omnium minimo, capitulo breviori, *Tournef.*

Gramen panniculatum, locuftis tenuiffimis, fubrotundis. *Nobis. Tab.* 47. *Fig.* 3. Gramen panniculatum, ex oris Malabaricis, pannicula delicatiore. *Plukn. Phyt. Tab.* 300. *Fig.* 2. Gramen Miliaceum, folio hirfuto. *Muf. Zeyl. pag.* 24. Gramen Furni, Rompot Affap. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 10. *cap.* 6. MENERITANA Zeylonenfibus. a *Meneri* quod Milium notat.

Caulem terminat pannicula delicatula, contracta, vel angufta, continens locuftas compofitas ex quatuor vel quinque glumis muticis, minimis, exceptas a calice biglumi, mutico.

Omnes hae fquamae diftinctae, & imbricatim collocantur in formam ovatam. Caulis, qui tenuis eft, tegitur fere vaginis foliorum, quae angufta, ftriata, acuminata, ad exortum e caule hirfuta funt.

Gramen Zeylanicum, Miliaceum. *Muf. Zeyl. pag.* 58. Gramen Dactylon, Orientale, majus, Frumentaceum femine Napi. *Plukn. Phyt. Tab.* 91. *Fig.* 2. vide & *Almag. pag.* 174. Caracam Cinghalenfibus *Knox Itiner. pag.* 11. vide & *Moris tom.* 3. *pag.* 185. ut & *Ray. tom.* 3. *pag.* 606. KURAKKAN Zeylonenfibus.

Graminis fpecies, cujus femina comeduntur loco Oryzae. *Muf. Zeyl. pag.* 61. Gramen dactylon, Indicum, efculentum, fpica articulata. *Ambrof. Phytol. pag.* 546. Figura ejus invenitur apud *Plukn. Phyt. Tab.* 190. *Fig.* 2. BADHAMU Zeylonenfibus.

Gra-



GROSSULARIA *spinis vidua, baccis in racemo congestis spadiceis, foliis crenatis ovato-acuminatis. Nob.*

GRAMEN Zeylanicum, folio eleganter maculato. *Par. Bat. Pr. pag.* 338. Gramen paniceum, minimum, humi ſtratum, ſpica diviſa mutica, foliis variegatis. *Sloan. Cat pl. Jam. p.* 30. & *Hiſt. Jam. vol.* 1. *p.* 107. *Tab.* 64. *Fig.* 3. *Ray. tom.* 3. *pag.* 600. Gramen ſerpentarium, Zeylanicum, *Breyn. Cent. Prodr.* 2. *pag.* 54. ubi pro Graminis Dactyli, aut Panicei ſpecie habetur.

GRAMEN pratenſe, Zeylanicum, paniculis hirſutis, plumoſis. *Muſ. Zeyl. pag.* 58. an Gramen pratenſe, tomentoſum, panicula ſparſa. *C. B. P. pag.* 4?

GRAMEN tremulum, minus, ITANA Zeylonenſibus. *Muſ. Zeyl. pag.* 56. Gramen tremulum, minus, panicula ſparſa, *C. B. P. pag.* 2. *Plukn. Almag. pag.* 176. &c.

GRAMEN Typhoides, album, *Muſ. Zeyl pag.* 32. Gramen forte, Indicum, Alopecuroides, holoſericum, majus, ſpica longa pappeſcente. *Plukn. Almag. pag.* 177. & *Phyt. Tab.* 92. *Fig.* 5. an Gramen Alopecuroides Curaſſ. ſpica longiſſima, & ſericea candida. *Par. Bat. Pr.*

GRANATA MALUS Zeylanica, ſpinoſa. *Par. Bat. Pr. pag.* 338. & *Commel. Fl. Malab. p.* 34. Granata Malus Zeylanica, ſpinoſa, flore luteo. *Par. Bat. Append. pag.* 9. Malus Punica Zeylonenſium, ſpinoſa. *Plukn. Almag. pag.* 240. Malus Granata Zeylonenſis, aculeata *Phyt. Tab.* 98. *Fig.* 6. Katunaregam *H. Malab. part.* 4. *Tab.* 13. *Ray. tom.* 3. *pag.* 19. *Dendr.* Granatum Malum, Delima, *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 2. *cap.* 33. Arbor Granata. *Grimm. Labor. Ceyl. pag.* 116. ubi haec habet: Offert nobis Syrupum Granatorum, Conſervas flor. Granat. Flores & folia optimum ſuum habent uſum in Chirurgia ad Gargariſmos, Clyſteres, & alia medicamenta, quae ſimul attrahendi, repellendi, atque abſtergendi virtutem habere debent. &c. a *Commel. in Fl. Malab. pag.* 42. huic jungitur Malus Limonia, Malabarica, fructu umbilicato. *Ray. Hiſt. p.* 1463.

GROSSULARIA ſpinis vidua, baccis in racemo congeſtis, ſpadiceis, foliis crenatis, ovato-acuminatis. *Nobis. Tab.* 48. Groſſulariae adfinis arbor, baccis in racemo congeſtis, ſpadiceis, ex acido dulceſcentibus, *Herb. Herm.* Groſſulariae forte fructu, non ſpinoſa, Malabathri foliis oblongis, floribus herbaceis racemoſis, fructu nigro. *Sloan. Cat. pl. Jam.*

Jam. pag. 165. Groffularia Zeylanica, baccis majoribus nigris. *Muf. Zeyl. pag.* 11 & 26. Groffularia Zeylanica, magno flore, EMBILLE Zeylonenfibus. D. Herman. apud *Ray. tom.* 3. *pag.* 27. *Dendr.* an Ana-Vinga *H. Malab. part.* 4. *Tab.* 49. ÆMBILLA Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl.* ubi additur, baccas fert forma & fapore Ribes aemulantes. Gerit haec arbufcula caules firmos, craffos, rotundos, glabros, obfcure virides, e quibus folia alternatim proveniunt folitaria, fubrotunda, acuminata, in ambitu crenata, glabra, obfcure virentia. Flores ex foliorum alis proveniunt, in parvis racemis congèfti, tetra aut pentapetaloides parvi, ftaminibus plurimis & calice fuo contenti, qui baccas dant ex acido dulcefcentes, fpadiceas, *Ribefii* forma, unde & forte, quum etiam fpinis deftituatur, eo propius accedit.

Grossularia Zeylanica, major, GHAESAEMBILLA Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 36. Groffularia baccis albis, pediculis floriferis in fummo ramo, & ex alis foliorum exeuntibus. *Ray. tom.* 3. *Dendr. pag.* 27.

Grossularia Zeylanica, baccis minoribus, albis, acidiufculis. *Muf. Zeyl. pag.* 11. Groffularia Zeylanica, fructu albo. D. Hermans. *Ray. tom.* 3. *pag.* 27. *Dendr.* Baccifera Maderasp. Ribes more, floribus mufcofis, Juli inftar. *Petiv. Muf no.* 621. GHAESAEMBILLA haec etiam Zeylonice audit, priorisque varietas eft. Groffulariae character invenitur apud *Linn. char. pl. gen. pag.* 68. ad Ribes.

GUAJAVOS fructu pallido, dulci *Muf. Zeyl. pag.* 3. Guajava alba, dulcis. *Par. Bat. Pr. pag.* 33°. *H. Amft. tom.* 1. *pag.* 121. Guajava Indica, fructu Mali facie, pulpa interiore alba *J. B. tom.* 1. *lib.* 1. *cap.* 41. Guajava alba, dulcis, fructu longo. *Herm. Cat. H. L. B. pag.* 305. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 34. Guajaba pomifera, Indica, pulpa candida. *C. B. P. pag.* 437. Guajavus domeftica, Guajavus *Rumph. Herb. Amboi. lib.* 1. *cap.* 41. qui & *cap.* 42. fylveftrem habet fructu viridi. Guajavae dulcis icon etiam exprimitur apud *Merian. infect. Surin. hift. Tab.* 19. & apud *Pifonem* Guajaba vocatur *pag.* 153 Pela *H. Malab. part.* 3. *Tab.* 34 *pag.* 31. vide & *Ray hift. pag.* 1455. Malo punicae affinis pomifera, flore pentapetalo, albo, fructu nullis diffepimentis interftincto, ex toto efculento, majore, albo. *Sloan. Cat. pl. Jam pag.* 199. qui plurima habet fynonyma & alias etiam fpecies, vide & *Hift. Jam. part.* 2 *pag.* 163. PERA Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl.* ubi dicitur: Lufitani hanc arborem in Zeylonam tranftulerunt. HAM-

HAMDAMANIAS, *Muſ. Zeyl. pag.* 3. *Hamma*, ſeu *Hambda* pellem, vel corium notat.

HAMPINNA *Muſ. Zeyl. pag.* 70. *Ham* pelliculam denotat.

HANSAPE *Muſ. Zeyl. pag.* 13. *Hanſa* anſerem, *Pe* pedem notat. Radix enim, & folia pedem anſerinum referunt.

HEDYSARUM monophyllum, latifolium, ſiliculis plurimis ſpica longa digeſtis. *Nobis. Tab.* 49. *Fig.* 2. Hedyſarum Indicum, folio ſingulari acuminato. *Tournef. inſt. pag.* 401. Onobrychis Zeylanica, folio ſingulari, oblongo-rotundo D. *Hermanni* apud *Ray. tom.* 3. *pag.* 453. huc ſpectat Onobrychis Gangetica, monophyllos, ſiliculis ſingularibus, laevibus, falcatim per internodia diſcriminatis. *Plukn. Phyt. Tab.* 50. *Fig.* 3. & Onobrychis Indiae Orientalis, Fagi foliis alternis, ſiliculis ſpica longa diſpoſitis. *Muſ. Petiv. no.* 788.
Planta haec alternatim ſua gerit folia, in inferiore caulis parte maxima, ſubrotunda, lata, inſtar *Perſicariae Orientalis;* ſuperiore parte viridia & glabra, inferiore autem villoſa, pediculis uncialibus villoſis itidem inſidentia, villi hi per totum caulem, ipſamque florum ſpicam ſeſe diſpergunt. Caulis autem eſt anguloſus, purpuraſcens, hirſutus, in ſummo flores ſuos utcunque producens, ſeu in ſpicam floriferam & frugiferam ſeſe dividens, & diffundens. Spicae hae ſunt longiſſimae, rectae, tenues, villoſae, numero ut plurimum ternae, quae in inferiore ſua parte ad dimidium fere flores, ſiliculasque ſuas dimittunt, in ſuperiore autem dimidii parte copioſe eas ad maturitatem producentes. Floſculi hi ſunt purpuraſcentes, papilionacei, tenuiſſimis pediculis inſidentes, calicibus ſat magnis contenti, ſinguli autem, ut videtur, ſiliculam dant geminam, communi ex origine productam, glabram, compreſſam, articulatam, in ſex, ſeptem, pluresve articulos diſtinctam, ſingulo articulo ſemen unicum ſubrotundum, reniforme, ſplendens, glabrum, flavum continente.

HEDYSARUM monophyllum, repens, folio Nummulariae rotundo, ſiliculis hiſpidis, parvis. *Muſ. Zeyl pag.* 31. Onobrychis Maderasp. Nummulariae folio, Ornithopodii ſiliquis. *Petiv. Gazoph. Tab.* 26. *Fig* 4. *Ray. hiſt. pl. tom.* 3. *app. pag.* 247.

HEDYSARUM monophyllum, Zeylanicum, pediculatum. *Muf. Zeyl. pag.* 35. Hedyfarum humile, Capparis folio. *Dillen. H. Elth. pag.* 170. *Tab.* 141. ubi vide elegantem Figuram, ac defcriptionem, natamque hanc plantam dicit auctor ex femine a *J. Ph. Breynio* miffo, cum infcriptione Hedyfari Zeylanici, folio fingulari, fere circinnato, maculato. &c.

HEDYSARUM bifolium, filiquis articulatis, echinatis. *Muf. Zeyl. pag.* 59. Undupyali, feu Hedyfari fpecies, foliis binis tantum. *Muf. Zeyl. pag.* 18. Mallam Tsjulli *H. Malab. part.* 9. *Tab.* 83. an Onobrychis Maderasp. diphyllos, minor, filiculis hirfutis *Plukn. Phyt. Tab.* 246. *Fig.* 6? MAHASWAENNA Zeylonenfibus dicitur a pede equi, cui folia funt fimilia. *Muf. Zeyl. pag.* 18.

HEDYSARUM bifolium, foliolis ovatis, filiculis afperis, geminis, inarticulatis. *Nobis. Tab.* 50. *Fig.* 1. Hedyfarum Indicum, bifolium, repens, flofculis luteis, filiquis afperis, villofis. *Herb. Hert.* Planta bifolia, humirepa, Trifolii flofculis aureis, filiquis afperis, villofis, articulatis. *Herb. Herm.* Plantula repens Indica, binis in ramulorum extremitate foliolis, flofculis luteis, Trifolii feminibus latis. *Muf. Zeyl. pag.* 58. Planta bifolia, humirepa, Indica, floribus in propriis furculis dipetalis, globulis feminalibus monofpermis. *Ray. tom.* 3. *pag.* 404. Hedyfarum minus, diphyllum, flore luteo. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 73. Nelam-Muri. *H. Malab. part.* 9. *Tab.* 82. ubi in notis. Planta bifolia humirepa, Ari folio, flofculis aureis, villofis, articulatis. *Commel.* & *Fl. Malab. pag.* 54. Defcriptio *Horti Malab. pag.* 161. in omnibus noftrae plantae ita convenit, ut alteram hic fubjungere, fuperfluum foret. *Tabula* vero 83. melius noftri Schemati & Figurae refpondere videtur. huc fpectat Onobrychis Maderasp. diphyllos, filiculis afperis. *Plukn. Phyt. Tab.* 102. *Fig.* 1. cujus folia feffilia penitus depicta funt, quum noftrae plantae folia longis pediculis fuftinentur, quo differunt.

HEDYSARUM trifoliatum, vifcofum, filiquis articulatis, peltatis. *Nobis.* Trifolium Indicum, fpicatum, vifcofum, minus, filiquis articulatis, peltatis. *Muf. Zeyl. pag.* 43.

HEDYSARUM trifoliatum, filiculis glabris, peltatis, geminis inarticulatis. *Nobis. Tab.* 50. *Fig.* 2. Trifolium, Indicum fpicatum, non vifcofum, fili-

Tab. 50.




Fig. 1.

Fig. 2.

HEDYSARUM bifolium, foliolis ovatis, siliculis asperis, geminis inarticulatis. Nobis.

HEDYSARUM trifoliatum, siliculis glabris, peltatis, geminis inarticulatis. Nobis.



HEDYSARUM oxyphyllum, foliolis glabris, [illegible] Nobis.

HEDYSARUM [illegible] foliolis [illegible] Nobis.



HEDYSARUM *trifoliatum, arborescens, floribus ex alis foliorum, siliquis copiosis, glabris. Nobis.*

filiquis articulatis, peltatis. *Herb. Herm.* Hedyfarum Zeylanicum, anguftifolium, triphyllum, filiculis compreffis, articulatis. *Muf. Zeyl. pag.* 31. Hedyfarum triphyllum, minus, flore coerulefcente. *Herb. Hert.* Onobrychis Zeylanica, trifolia, minor, perennis. D. *Hermans* apud *Ray. tom.* 3. *pag.* 457.

a Priori differt caule rotundo, purpureo, glabro, quum altera vifcofum & hirfutum gerat caulem. Folia vero eodem modo proveniunt terna, glabra, oblonga, pallida, in inferiore parte incana, majora, minora, prout in majore, minoreve plantae ramo proveniant. Rami vero lignofi penitus funt, flexiles tamen. Flores in ramulorum fummitate utcunque proveniunt fpicati, parvi, tenues, papilionacei, coloris coerulefcentis, calicibus longis, magnis, contenti, qui per articulationem quafi fibi mutuo injunguntur, quod & etiam ad foliorum ortum obtinet, maxime ubi rami difperguntur. Poft flores fequuntur filiculae planae, compreffae, glabrae, fubrotundae, acutum apicem in fummo gerentes, binae fibi mutuo utcunque inarticulatae, ubi folitariae occurrunt, Thlaspidii filiculis fimiles funt. Singula vero filicula continet femen unicum, fubrotundum, planum, reniforme, fplendens, nigricans.

Hedysarum trifoliatum, arborefcens, floribus fpicatis, foliis fubrotundis, fubtus lanuginofis. *Nobis.* Onobrychis fpicata, Zeylanica, trifolia, frutefcens *Hermanni* apud *Ray. tom.* 3. *pag.* 457. Undupyali fpecies arborefcens, foliis ternis, fere rotundis, fubtus lanuginofis. *Muf. Zeyl. pag.* 22. ÆTUNDUPYALI Zeylonenfibus.

Hedysarum trifoliatum, arborefcens, floribus ex alis foliorum, filiquis copiofis, glabris. *Nobis. Tab.* 51. Trifolium Zeylanicum, arborefcens, filiquis compreffis, articulatis, floribus albis. *Muf. Zeyl. pag.* 21. Hedyfarum Zeylanicum, trifolium, arborefcens, floribus albis. *Herb. Hert.* Folium Crocodili, Daun Boaya. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 6. *cap.* 58. WALDAMINI & MAHAPILAE Zeylonenfibus.

Gerit haec fpecies caulem fubrotundum, lignofum, penitus purpurafcentem, e quo folia alternatim proveniunt, firmo fuftentata pediculo, tria fimul, magna, fubrotunda, glabra, integra, venofa, fuperiore parte viridia, inferiore incana, itidem glabra. Ex ortu vero foliorum proveniunt plurimi, communi primo pedunculo, dein proprio fuffulti flores papilionacei, albicantes, calice quadrifariam diffecto

contenti, finguli filiquam glabram, compreffam, fubrotundam, articulatam producentes, fingulo articulo includente femen fubrotundum, glabrum, nigrum, reniforme.

Hedysarum trifoliatum, frutefcens, flore ac fructu inter duo foliola rotunda abfconditis. *Nobis. Tab.* 52. Onobrychis Indica, triphyllos, foliis amplis, mucronatis, filiquis parvis in fpicam longam ex alis inter bina foliola circinnata arcte convenientia reconditis. Maddy-Mal maddy Malabarorum. *Plukn. Amalth. pag.* 161. *pl.* 5. & *Phyt. Tab.* 433. *Fig.* 7. Arbufcula Zeylanica, trifolia, filiculis Carpino fimilibus, folliculis inclufis. *Muf. Zeyl. pag.* 58. Arbufcula trifolia, filiculis binis rotundifoliis folliculis inclufis. *Muf. Zeyl. pag.* 36. PALAEGHAS Zeylonenfibus, ex foliorum ala erigitur fpica longa, foliis rotundis ad fummum usque ftipata. *Muf. Zeyl.*

Tota haec arbufcula fcabra eft, & laeviter hirfuta, inprimis caulis, qui obfcure purpureus eft, & villis tenuiffimis obfitus, folia gerens terna, brevibus innixa pediculis, quorum fupremum quintuplo fere majus eft, & oblongum, duo alia fibi mutuo oppofita fubrotunda funt, itidem fcabra, nigricantia in fuperiore parte, in inferiore pallida & hirfuta, feu incana, ex foliorum autem alis eriguntur fpicae longiffimae, foliaceae, ubique foliolis rotundis, venofis, undulatis, fcabris, fuperiore parte nigricantibus, inferiore pallidioribus tectae, horum duo femper foliola ex communi pedunculo oriuntur, quae arctiffime fibi invicem juncta, & Concharum inftar claufa funt, inter quae flofculi toti occluduntur parvi, purpurei, papilionacei, gemini in fingula tali concha, quae dehifcit, juftam fi hi acquifivere magnitudinem, & fefe aperiunt; poft quos filiquae geminae, planae, articulatae, in longum & acutum apicem definentes progerminant, continentes in fingulo articulo femen fubrotundum, planum, reniforme, nigrum. in *Pluknetii Figura* faepius tres quatuorve filiculae apparent, in noftra duas tantum femper & conftanter invenimus, conchae foliaceae rudit er etiam ibi depictae funt, multumque a noftrarum fitu ac forma differunt, numero etiam multo inferiores, unde dubito, fi eaedem, quod tamen videtur, an quidem multum poffimus fidere ifti Figurae, quum noftra quam exactiffime ad plantam integram fit delineata, & fideliter etiam expreffa.

Hedysarum trifoliatum, repens, filiculis compreffis, glabris, crenatis. *Muf.*



HEDYSARUM *trifoliatum frutescens, flore ac fructu inter duo foliola rotunda absconditis. Nobis.*



HEDYSARUM *trifoliatum, ſpicatum, foliis oblongis, glabris, ſiliquis aſperis, articulatis. Nob.*

HEDYSARUM *trifoliatum, ſiliculis inferioribus ſolitariis, ſuperioribus articulatis. Nobis.*

Muf. Zeyl. pag. 38. Hedyfarum procumbens, Trifolii Fragiferi folio. *Dillen. H. Elth. pag.* 172. *Tab.* 142. ubi vide reliqua.

HEDYSARUM trifoliatum, Salviae folio. *Nobis.* Trifolium Salviae folio. *Muf. Zeyl. pag.* 25. Trifolium amplexicaule, filiculofum, Salviae folio. *Muf. Zeyl. pag.* 60. TELAMANDU & BUDAMANI Zeylonenfibus.

HEDYSARUM trifoliatum repens, incanum, Salviae foliis, filiqua parva, articulata. *Nobis.* Trifolium Indicum, repens, incanum, foliis Salviae, filiquis parvis, articulatis. *Muf. Zeyl pag.* 48. WALUNDUWAEL Zeylonenfibus, hoc eft *Undu* fylveftre, farmentofum.

HEDYSARUM trifoliatum, filiculis inferioribus folitariis, fuperioribus articulatis. *Nobis. Tab.* 53. *Fig.* 1. Hedyfarum triphyllum, Zeylanicum, rotundifolium. *Muf. Zeyl. pag.* 35. Trifolium fpicatum Indicum, majus, filiquis compreffis, articulatis: & idem vifcofum. *Muf. Zeyl. pag.* 53. Trifolium Indicum, fpicatum, vifcofum, majus, filiquis articulatis, crenatis. *ibidem. pag.* 42. Trifolium Indicum, fpicatum, filiquis compreffis, crenatis, villofis, majus. *Herb. Herm.* Hedyfarum Zeylanicum, triphyllum, majus, flore coerulefcente. *Herb. Hart.* Onobrychis Maderasp. triphylla, filiculis clypeatis, villofis, geniculis fingulis, binisve. *Petiv. Muf. no.* 789. GHASUNDUPYALI Zeylonenfibus, id eft Hedyfarum arborefcens.

Frutefcens haec Hedyfari fpecies caulem habet rotundum, villis tenuiffimis fcabrum, & faepe vifcofum, purpureum: unde folia alternatim emergunt, villofis, longis, & firmis innixa pediculis, quae tria communi infident pediculo, inferiora bina oppofita, fuperiore inpari exiftente, triplo fere majore, funt autem glabra, fubrotunda, venofa, fuperiore parte viridia, inferiore incana. Flores gerit in longis fpicis collectos, ex alis foliorum & in fummitate caulium provenientes, qui parvis calicibus contenti, papilionacei funt & coloris dilute purpurei feu coerulefcentis. Peculiare autem eft huic fpeciei, quod in infima fpicae parte poft flores fequantur filiculae, planae, compreffae, fubrotundae, apicem acutum habentes, fcabrae, folitariae. Reliqua autem fpica producit filiquas longas, planas, articulatas, fex feptemve articulis conftantes, hirfutas, a parte inferiore aequales, fuperiore vero ifthmo interceptas, quae nunc folitariae, nunc geminae

 fimul

fimul ex uno centro proveniunt, gerentes in fingulo articulo femen folitarium, planum, fubrotundum, glabrum, reniforme.

HEDYSARUM trifoliatum, fpicatum, foliis oblongis, glabris, filiquis afpe-ris, articulatis. *Nobis. Tab.* 53. *Fig.* 2. Hedyfarum Zeylanicum, triphyl-lum, flore coerulefcente, foliis oblongis. *Herb. Hart.* Trifolium In-dicum, medium, fpicatum, filiquis depreffis, articulatis. *Muf. Zeyl. pag.* 47. Hedyfarum trifoliatum Maderasp. filiquis membranaceis, afpe-ris. *Petiv. Muf. no.* 649. Hedyfarum triphyllum, fruticofum, flore purpureo, filiqua varie diftorta. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 73. & *Hift. Jam. vol.* 1. *pag.* 184. *Tab.* 116. *Fig.* 2.

Ab altero frutefcente Hedyfaro haud multum abludit haec planta, & foliis oblongis differt, ut & caule virefcente, qui itidem villofus eft, eodemque modo folia gerit terna, viridia, glaberrima, fuperiore ob-fcura, inferiore parte incana, integra, majora, & longiora.

Flores in longiffimis fpicis eriguntur ex foliorum alis, & in fummo cau-lium, alternatim provenientes, tenuiffimis infidentes pediculis, pa-pilionacei, longiffima tuba inftructi, quae abit in filiquam longam compreffam, articulatam, hirfutam, quae geminae faepius proveniunt & copiofae admodum in hac fpecie obfervantur; continent vero, ut in aliis congeneribus, in fingulo loculo, feu articulo femen fubrotun-dum, reniforme. &c.

HEDYSARUM trifoliatum, repens, folio ovali, glabro, caule hirfuto, filiqua plana, articulata. *Nobis. Tab.* 54. *Fig.* 1. Trifolium Indicum, majus, cordatum, filiquis depreffis, articulatis. *Muf. Zeyl. pag.* 56. Onobry-chis Indica, major, foliis Acetofellae, quod UNDUPYALI majus. *Muf. Zeyl. pag.* 5. & UNDUPYALI alia fpecies, folio longiore. *ibidem.*

Repens haec admodum eft planta, fibrillas albicantes, quae radiculas formant, ubique ad foliorum & caulium ortum emittens, folia gerens glabra, terna, ovalia, laete-viridia, in inferiore parte pallidiora, quae communi pediculo, ex caule tenui, hirfuto, angulofo, viridi, proveniunt. Flores nunc folitarii, nunc gemini ex foliorum alis eriguntur, longiffi-mis & tenuiffimis pediculis primo communibus, dein propriis fuffulti, calicibus profundiffime fectis, hirfutiffimis, contenti, parvi, purpu-rei, papilionacei, qui filiquam dant planam, glabram, varie articulatam, in quatuor, quinque, fexve articulos diftinctam, fingulo articulo fuum continente femen reniforme &c.

HEDY-



Fig. 1.

Fig. 2.

HEDYSARUM trifoliatum repens, Acetosellae folio glabro, caule hirsuto, siliqua plana, articulata. Nobis.

HEDYSARUM trifoliatum repens, folio ovali glabro, caule hirsuto, siliqua plana, articulata. Nobis.

Hedysarum trifoliatum, repens, Acetofellae folio glabro, caule hirfuto, filiqua plana, articulata. *Nobis. Tab.* 54. *Fig.* 2. Onobrychis Indica, minor, Acetofellae foliis. *Muf. Zeyl. pag.* 2 & 4. Trifolium Indicum, minus, cordatum, filiquis depreffis, articulatis. *Muf. Zeyl. pag.* 56. Hedyfarum trifoliatum, Maderaspatanum, Lujulae folio, Ferri Equini filiquis. *Petiv. Muf. no.* 649. Foenum Graecum Zeylanicum, repens, flore purpurafcente. *Herb. Hart.* UNDUPYALI Zeylonenfibus.
Antecedente multo minor eft haec planta, nec ita fe per fibrillas radicales difpergens, repens tamen & caulem itidem hirfutum habens, folia itidem tria glabra, cordata, inferius pallida, Oxidem feu Acetofellam perfecte aemulantia, gerens, caeterum eodem modo producens flores & filiquas, ut in priori dictum eft fpecie. Proxime haec accedit ad Hedyfarum procumbens, Trifolii Fragiferi folio *Dillenii*, uti in *H. Elth. pag.* 173. ab auctore etiam animadvertitur.

Hedysarum annuum, majus, Zeylanicum, Mimofae foliis *Tournef. inft. pag.* 402. Hedyfarum caule hirfuto, Mimofae foliis alatis, pinnis acutis, minimis, gramineis. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 74. & *Hift. Jam. part.* 1. *pag.* 186. *Tab.* 118. *Fig.* 3? Mimofa non fpinofa, major, Zeylanica Domino *Hermans*, Excellentiffimi Domini *Syen*. *Breyn. Cent. pag.* 52. ubi elegans Figura & defcriptio, cujus vero caulis glaber eft. Vide & *Petiv. Act. Phil. Lond. vol.* 22. *no.* 267. *pl.* 91. Securidaca clypeata, flore luteo, Lentis folio, Zeylanica. *Breyn. Prodr.* 1. *pag.* 46. Onobrychis annua, Zeylanica, Mimofae foliis, filiquis articulatis, afperis, major. *H. L. Bat. pag.* 458. *Amm. H. Bofian. pag.* 25. an Onobrychis Bisnagarica, Mimofae foliis, filiquis ad unum folummodo latus dentatis, ex alis polyceratos. *Plukn. Almag. pag.* 270. *Phyt. Tab.* 49. *Fig.* 5? Mimofa herba Zeylanica, aquatica, filiquis compreffis, articulatis, hifpidis, atris, an Anonymos Garciae? an Æfchynomene Apollodori? *Muf. Zeyl. pag.* 18. & Herba Mimofa major MAHADYAHYAMBALA dicta, quae Æfchynomene Theophrafti. &c. *ibidem. pag.* 41. Mimofa non fpinofa, major, Zeylanica *Breynii*. DYAHIBALA Cinghalenfibus. D. *Hermans* apud *Ray. hift. pl. pag.* 982. ubi ejus defcriptio. Figuram non damus, quum optime a *Breynio* in *Centur.* fua fit expreffa. DYAHYBALA & DYAHYAMBALA Zeylonenfibus, id eft Tamarindus aquatica. *Dya* enim aquam notat, in qua nafci amat planta, HIEMBALA Tamarindum, cui folia funt fimilia. vide infra ad Mimosam.

Hedy-

HEDYSARUM annuum, minus, Zeylanicum, Mimofae foliis. *Tournef. inft. pag.* 56. Onobrychis annua, Zeylanica, minor, filiquis articulatis, afperis. *H. L. B. pag.* 458. Mimofa herba Zeylanica, filiquis compreffis, hifpidis, articulatis minor, HINDYAHYABALA dicta. *Muf. Zeyl. pag.* 40. Niti-Todda-Vaddi *H. Malab. part.* 9. *Tab.* 20. ubi vide notas. *Fl. Malab. pag.* 2. & infra ad MIMOSAM.

HEDYSARUM Zeylanicum, Aurantii folio. *Nobis.* Onobrychis Zeylanica, Aurantii folio. *Petiv. Hort. ficc. in Ray. tom.* 3. *append. pag.* 247. *no.* 16.

HEDYSARUM Viciae foliis, filiquis fpicatis, deorfum pendentibus, hirfutis. *Nobis.* Vicia Zeylanica, filiquis fpicatim collectis, ac deorfum fpectantibus, nigris, hirfutis, pilofis. *Muf. Zeyl. pag.* 10. GHASUNDUPYALI Zeylonenfibus, id eft *Undupyali*, five Hedyfarum arborefcens.

HEDYSARUM Indicum, magnum, laciniatum, Paftinacae odore. *Muf. Zeyl. pag.* 58.

HEDYSARUM trifoliatum, filiquis anguftiffimis, oblongis. *Nobis.* Trifolium marinum, filiquis anguftiffimis, oblongis. *Muf. Zeyl pag.* 56.

HELIOTROPIUM Indicum, Hormini foliis latioribus. *H. Beaum. pag.* 24. Heliotropium Indicum, majus. *Muf. Zeyl. pag.* 2. Heliotropium Americanum, coeruleum, foliis Hormini. *Dodart. Mem. p.* 83. *Plukn. Phyt.* 245. *Fig.* 4. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 94. Heliotropium latifolium, annuum *H. L. Bat. pag.* 307. Heliotropium Indicum, Hormini folio. *Ray. hift. pl. pag.* 307. ÆTSAETHYA Zeylonenfibus. *Ætfe* Elephantem, *Æthya* fimilem notat; fpica enim floris fimilis eft Probofcidi Elephantis. Vocatur etiam *Doelkoddubu. Doel* Scorpionem, & *Koddubu* caudam feu fpicam fignificat. Nominatur etiam *Kadfchavandi. Kadfcha* Elephas eft. *Vandi* flexus facere. *Muf. Zeyl. pag.* 3. hujus & altera eft floribus albis, & vocatur

HELIOTROPIUM Zeylanicum, majus, Hormini folio, flore albo, ÆTSAETHYA Zeylonenfibus. *Hert. Catal. femin.* Aguaraquinha *Pifon pag.* 229. Bena-Patsja *H. Malab. part.* 10. *Tab.* 48. & *pag.* 96. vide notas. ubi a *Commel.* vocatur Heliotropium Indicum, latiore & rotundiore folio; vide & *Fl. Malab. pag.* 35.

HELIO-



Fig. 1.

HOTTONIA *flore ſolitario ex foliorum alis proveniente. Nobis.*



Fig. 2.

JACOBAEA *perfoliata, folio longo, acuto, auriculato. Nobis.*

HELIOTROPIUM Indicum, foliis Hormini, minus. *Par. Bat. Pr. Muf. Zeyl. pag.* 43. Heliotropium anguftifolium, annuum, minus, Jacua Acanga. Fedagozo *Markgr.* & *Pifonis Par. Bat. Pr. pag.* 340. Heliotropium coeruleum Americ: foliis Hormini anguftioribus. *H. L. Bat. pag.* 307. Heliotropium Curaffavicum, Hormini foliis anguftioribus. *H. Beaum. pag.* 24. & *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 94. Jacua Acanga Brafilianis, Fedagofo Lufitanis. *Pifon. pag.* 229. *Markgr. p.* 6. ÆTSAETHYA Zeylonenfibus, quod Heliotropii nomen genericum eft.

HEMIONITIS multifida, Zeylanica, cofta fagittata; five Filix foliis integris, Zeylanica, pediculo alato. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 55. Filix feu Hemionitis dicta, Indiae Orientalis, Phagi feu Efculi folio aliquatenus accedens. *Plukn. Phyt. Tab.* 36. *Fig.* 5. de qua vide *Ray. hift. pl. pag.* 54.

HEMIONITIS Zeylanica, repens, fcandensve, foliis minimis. *Ray. hift. pl. pag.* 56. ubi ejus defcriptio.

HIBBUTHU & HINHIBBUTHU, five majus & minus. *Muf. Zeyl. pag.* 40. SERGIANDSKLOOT Belgis. *ibidem.*

HIGHULHAENDA folio Myrti. *Muf. Zeyl. pag.* 21.

HINZODALAWAEL, *Muf. Zeyl. pag.* 25.

HONDAPARA, *Muf. Zeyl. pag.* 10. ab *Honda* quod genus notat.

HOTTONIA flore folitario ex foliorum alis proveniente. *Nobis. T ab.* 55. *Fig.* 1. Sarafraga Zeylanica, Millefolii folio, flore albo. *Herb. Hart.* an Alfine faxifraga, Indiae Orientalis, foliolis circa caulem radiatis, flore herbido & mufcofo. *Plukn. Mantiff. pag.* 9? Tsjudan-Tsjera. *H. Malab. part.* 12. *Tab.* 36.

Caulis noftrae plantae eft tenuis, articulatus, fimplex, e quo folia ftellatim erumpunt, quinque, fex, vel plura, tenuia, brevia, pennatim divifa, ad fingulum articulum provenientia, ubi & petiolus tenuis exfurgit, foliis longior, apice gerens florem calice quinquefido, parvo, petalo unico quinquefido (quod in *H. Malab.* quadrifidum defcribitur & depingitur) conftantem, qui ftamina habet quinque & piftillum unicum cum capitulo. Fructus eft capfula fubrotunda, uni-

locularis, femina condens plurima. Primus nomen HOTTONIAE dedit celeberr. *Herm. Boerhave* Millefolio aquatico, ad confufionem cum Millefolio terreftri vitandam, in piam memoriam deceſſoris fui *Petri Hotton*, Profeſſoris quondam in *Acad. Lugd. Bat.* cujus generis characterem in indice fuo *H. L. Bat.* exactius & nitidius defcripfit *part.* 1. *pag.* 206 & 207. cum quo noftra plantula in omnibus ita convenit, ut nifi vim naturae inferre velimus, ab eo genere feparari nequeat. Vide porro *Linnaeum in char. pl. gen. pag.* 43.

HYACINTHUS Indicus, tuberofus, noctu olens. *Muf. Zeyl. pag.* 35. Hyacinthus Indicus, tuberofus, flore Narciffi *C. B. Pin. pag.* 47. Hyacinthus major, Indicus, tuberofa radice non defcriptus. *Swertii Floril. Tab.* 14. SANDALMALAM Zeylonenfibus.

HYDROCOTYLE Zeylanica, Afari folio. *Tournef. inft. pag.* 328. Valerianella Zeylanica, paluftris, repens, Hederae terreftris folio, ad radicem florida. *Par. Bat. pag.* 238. ubi icon & defcriptio. *Amm. Char. pl. pag.* 247. Afarina Zeylanica minor. *Par. Bat. Pr. pag.* 315. (quia cum Afaro foliatura convenit.) *Petiv. act. Phil. Lond. vol.* 22. *no.* 287. *pl.* 4. Ranunculo adfinis, umbelliferis accedens, Chelidonii minoris folio, Zeylanica minor. *Plukn. Phyt. Tab.* 106. *Fig.* 5. Ranunculus aquaticus, Afari foliis, ad nodos umbelliferus *Plum. Cat. pl. Amer. pag.* 7. Codagam *H. Malab. part.* 10. *Tab.* 46. *Fig.* 91. Pesequinus, Pancaga *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 9. *cap.* 69.

HYOSCYAMUS maritimus, fructu Tribuli aculeato, monofpermos. *Muf. Zeyl. pag.* 42. PATIRAJA Zeylonenfibus, ut & *Patiraja Kathu* quod notat murices, feu machinulas illas ferreas, aculeatas, tricufpides, Germanice *Pufangben* dictas. Hujus enim plantae fructu Cinghali loco muricum utuntur. *Muf. Zeyl.*

HYOSCYAMUS maritimus, fructu Tribuli aculeato, difpermos. *Muf. Zeyl. pag.* 42.

HYSSOPUS Zeylanicus, tenellus, pratenfis, WILA Zeylonenfibus, *Muf. Zeyl. pag.* 51. Hyffopus aquaticus, repens, foliis crenatis, floribus longis, amplis. *Muf. Zeyl. pag.* 20.

HYS-



JABOTAPITA *Cinnamomi folio, floribus spicatis. Nobis.*

HYSSOPUS paluſtris, repens, foliis crenatis, odore Thymi. WELAKOLA Zeylonenſibus, *Muſ. Zeyl. pag.* 51. Hyſſopus Zeylanicus, elegans, odore ac ſapore Thymi. *ibidem, pag.* 47. Hyſſopus WELAKOLA *Grimm. Labor. Ceyl. pag.* 129. ubi haec habet: Virtutem eandem, atque noſtra continet. Praebet etiam oleum & aquam per deſtillatio-nem: Poſſumus pariter exinde Syrupum conficere ad morbos pectoris excellentiſſimum.

JABOTAPITA Cinnamomi folio, floribus ſpicatis. *Nobis. Tab.* 56. BOKAERAE Zeylonenſibus. *Herb. Herm.*

Caulis hujus plantae eſt lignoſus, perennis, ramoſus, ramis minus diviſis, folia ramulis ſuperioribus alternatim inſident, oblonga, venis transverſalibus eleganter ſtriata, perennia, glaberrima inſtar Cinna-momi; Apices ramorum terminat Corymbus florum, qui petiolis biuncialibus inſident, quorum calix unifolius, quinquefidus, planus, rotatus; petala non apparent. Receptaculum in medio floris gibbum; eſt cum piſtillo acuminato, ad latus receptaculi interdum apparet corpuſculum ſubrotundum, durum, flavum, quod an bacca, an ni-dus infecti? Videtur ſatis convenire cum JABOTAPITA *Plumier.* in *nov. pl. gen. pag.* 41. *Tab.* 32. quae etiam ad latus receptaculi ano-malum gerit fructum. Unde & eo reduximus: quum autem noſtrae petala deſiderentur, num eo reducenda ſit, pro certo aſſeverare non audemus.

JACBERIKOLE *Muſ. Zeyl. pag.* 60. PANEKILIPKIPPE Malabaris.

JACEAE & SERRATULAE adfinis, capitulis Baccharidis, foliis Tra-chelii, Zeylanica, *Breyn. Prodr.* 1. *pag.* 39. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 36. *H. L. Bat. pag.* 339. & *in append. pag.* 677. ejus Figura. Serra-tula Indica, major, latifolia, mollis *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 90. *Commel. Fl. Malab. pag.* 61. Eupatoria Conyzoides integro Jacobaeae folio, molli & incano. Indiae Orientalis *Plukn. Phyt. Tab.* 177. *Fig.* 1. Sca-bioſa Indica, arborea *Ray. hiſt. pl. pag.* 1443. Conjungitur vulgo cum Scabioſa Zeylanica, capitulis folioſis &c. quae eſt Cattu-Schiragam. *H. Malab.* ſed cujus forma ab hac multum differt, quod ut appareat, Scabioſae illius accuratiſſimam inſculpi curavimus figuram, quae infra exhibetur, ut cum *H. L. Bat.* & *Pluknet.* Figuris conferri poſſit.

JACOBAEA perfoliata, folio longo, acuto, auriculato. *Nobis. Tab.* 55. *Fig.* 2. Jacobaea Zeylanica, folio rigido. *Herb. Hert.* Proxime huic convenit Figura, quae in *Plukn. Phyt. Tab.* 149. *Fig.* 3. exprimitur, fed mire infcribitur: vocatur enim ibi Afperulae forte congener planta peregrina. Accedit & noftrae plantae *Fig.* 2. *Tab.* 378. *Phyt.* quae in *Mantiff. pag.* 55. vocatur Conyza minor, Indiae Orientalis, Nelapu Malabarorum.

Plantae noftrae rami funt longi, tenues, rotundi, filiformes, purpurei, glabri; quibus folia fparfim alternatim adcrefcunt feffilia, caulem ipfum quafi perforantia inftar Perfoliatorum, feu tam arcte eum ambientia, ut ni ad bafin dehifcerent, vel auriculata effent folia, caulis per eorum medium perrumpere videretur. Folia haec funt fcabra, ad latera hirfuta, fuperne viridia, inferne incana, forma oblonga, acuta, fenfim anguftiore, quae quo magis ad ramorum fummum tendunt, eo plus decrefcunt, & tandem minima evadunt; Flores in ramorum faftigio proveniunt folitarii, lateralibus ramulis frequentiores, in omnibus cum Jacobaearum floribus convenientes, coloris lutei dilutioris, feu flavi.

JACOBAEA Zeylanica, flore luteo, folio Cardui fylveftris. *Alb. Sebae rerum nat. thef. part.* 1. *Tab.* 22. *Fig.* 5. *pag.* 34.

JALAPPA parvo flore. *Tournef. inft. pag.* 130. Jalappa minor, purpurea. *Munt. Phytogr. Fig.* 67. Mirabilis Peruviana, parvo flore *H. L. B. pag.* 428. Solanum Mexiocanum, flore variegato minore, femine rugofo. *Sch. Botan. pag.* 144. Solanum Mexiocanum, flore parvo, luteo. *C. B. P. pag.* 168. *Muf. Zeyl. pag.* 67. Solanum Mexiocanum, Jasminum Indicum, flore minore. *C. B. Prodr. pag.* 91. ubi defcribitur. Mirabilis, Marvelje, Bonga Wactu, Kitfyl. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 8. *cap.* 51. Admirabilis Peruviana, rubro flore. *Cluf. rar. pl. hift. lib.* 5. *pag.* 89. & *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 91. ubi & alia hujus funt fynonyma. SENDRIKKAN Zeylonenfibus.

JAMBOS Malaccenfis, fructu aureo, rofam fpirante. *C. B. Muf. Zeyl. pag.* 19. quae Perfici officulo fructus Malaccenfis, ex candido rubefcens, vocatur a *C. B. Pin. pag.* 441. Malacca-Schambu *H. Malab. part.* 1. *Tab.* 17. ubi vide notas. Arbor Indica, flore tetrapetalo, ftaminibus longis referto, fructu majore umbilicato, *Plukn. Almag. pag.* 237.

Prunus



JASMINUM flore tetrapetalo, IXORA *Linnaei*, SCHETTI *H. Malab. Nobis.*

Prunus Malabarica, fructu umbilicato, Pyriformi, *Jambos* dicta, minor. *Ray. Hist. part.* 2. *pag.* 1478. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 56. Jambo. *Clus. lib.* 2. *cap.* 13. Jambi *Acostae edit. Ital. pag.* 203. & apud *Clus. cap.* 48. Jambosa domestica. Jambu. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 1. *cap.* 33. RATAGAMBU & RATAGALBU Zeylonensibus. a *Rata*, quod luteum notat, *Gambu* hujus nomen genericum est. Flores plurimis staminibus constant. Fructus hujus sunt aurei coloris, forma ac magnitudine Pyri, unde ad differentiam subsequentium haec, Jambos fructu aureo Pyriformi, odorato, vocari posset.

Jambos fructu luteo, Mespili forma, odorato, GAMBU dicta. *Nobis.* Gambu Moluccanum, odore roseo. *Mus. Zeyl. pag.* 48. ubi dicitur: Fructus hujus arboris parvi sunt, Mespili magnitudine, lutei, odore roseo. &c. vide supra ad GAMBU.

Jambos sylvestris, fructu rotundo, Cerasi magnitudine. *Mus. Zeyl. pag.* 67. Prunus Malabarica, fructu umbilicato, Pyriformi, *Jambos* dicta, major. *Ray. hist. part.* 2. *pag.* 1478. *Commel. Fl. Malab. pag.* 56. Jambos prior *Acostae ibidem.* Nati Schambu *H. Malab. part.* 1. *Tab.* 18. quae Jambos sylvatica, fructu Cerasi magnitudine, WALGAMBU Cinghalensium *Hermanno. ibidem* in notis *pag.* 30. & *Plukn. Almag. pag.* 252. Jambosa nigra, seu Jambu utan vel sylvestris. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 1. *cap.* 33. ubi usque ad caput 36 alias plures describit species. WALGAMBU Zeylonensibus.

Jambos sylvestris & montana, fructu Cerasi magnitudine. *Nobis.* Jambu sylvestris, fructu Cerasi magnitudine *Mus. Zeyl. pag.* 68. Catu Tsjambu. *H. Malab. part.* 4. *Tab.* 8. quae Jambos sylvestris montana. *Ray. Hist. part.* 2. *pag.* 1480. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 36. Jambosa sylvestris parvifolia, Caju Mera. *Rumph. Herb. Ambon. auctuar. cap.* 6. MAHARATAMBOLA Zeylonensibus.

JASMINUM flore tetrapetalo, IXORA *Linnaei*, SCHETTI *H. Malab. Nobis. Tab* 57. Jasminum Indicum, Lauri folio, inodorum, umbellatum, floribus coccineis. *Par. Bat. Pr. pag.* 342. *Plukn. Almag. pag.* 196. Jasminum arborescens, Indicum, flore tetrapetalo, umbellato, phoeniceo, foliis Laurinis latioribus. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 58. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 36. Cerasus Zeylanica, humilis, sylvestris,

floribus holofericis, intenfe rubris, umbellatim congeftis, fructibus nigris. *Muf. Zeyl. pag.* 15. Cerafus fylveftris, Zeylanica, pavonina, umbellata, latifolia, floribus coccineis, holofericis, *ibidem. pag.* 36. Cerafus Zeylanica, humilis, pavonina, flore holoferico, umbilicato. *ibidem. pag.* 60. Cerafus Zeylanica, humilis, fylveftris, Pavonina, floribus holofericis, intenfe rubris, umbellatim congeftis. *Herb. Herm.* Flamma fylvarum peregrina. *Rumph. Herb. Ambon. auctuar. cap.* 41. quae habetur pro Schetti *H. Malab. part.* 2. *Tab.* 13. ut a *Plukn. in Phyt. Tab.* 59. *Fig.* 2. *Breyn. loc. cit. Ray. Dendr. part.* 3. *pag.* 50. quae *Hift. part.* 2. *pag.* 1573. vocatur Frutex baccifer, Malabaricus, fructu calyculato, rotundo, rubro, polypyreno. Si vero meam plantam ab *Hermanno* ipfo in Zeylona quondam collectam, & ad *Breynium* etiam ab ipfo transmiffam, examinem, & cum *H. Malab.* Figura & defcriptione conferam, in quibusdam differre videtur. Noftrae enim folia funt multo longiora, anguftiora, acutiora; frequentiora etiam multo ad furculos proveniunt, interpofitis plurimis minoribus foliolis, quae accuratiffime omnia in tabula noftra infculpi curavi. Flores *Schetti H. Malab.* dicuntur incarnati, pofteaque dilutiores, flavefcentes, quum noftrae plantae funt intentiffime holoferici, rubri, caeterum defcriptio cum noftra fatis convenit. Ejusdem certe funt generis; an vero diverfae fpecies, an varietas illa loco tantum natali diverfo fit adfcribenda, non determino; pro iisdem plantis tamdiu cum reliquis habebo auctoribus, quamdiu nota magis realis obfervata illas non feparat. RATABALA noftra Zeylonice audit, quod pronunciatur RATAMBALA, a *Rata* quod rubrum denotat, & additur ad differentiam alterius, quae eft floribus holofericis, flavis. Utraque fert fructus nigros, carnofos, rotundos, Cerafonum nigrorum magnitudine & forma, Lufitanis *fructus Pavoninos* vocatos, iis enim pavones vefci creduntur, *Muf. Zeyl. pag.* 15. unde & Cerafus Pavonina faepius haec arbufcula vocata fuit ab *Hermanno.*

JASMINUM flore tetrapetalo, flavo, Bem-Schetti *H. Malab. Nobis.* Jasminum arborefcens, Indicum, flore tetrapetalo, umbellato, foliis Laurinis longioribus & anguftioribus. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 58. Jasminum Zeylanicum, flore pavonino luteo *Hermanni ibidem.* Schetti album, feu Jasminum Indicum, Lauri folio, inodorum, umbellatum, floribus albicantibus. *Plukn. Phyt. Tab.* 109. *Fig.* 2. & *Almag. pag.* 196.

Bem



JASMINUM Limonii folio conjugato, flore odorato, pleno, vario. Nobis.

JASMINUM sylvestre triphyllum, floribus rubellis umbellatis. Nobis.

Bem Schetti. *H. Malab. part.* 2. *Fig.* 14. Flamma fylvarum, Diarong. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 6. *cap.* 53. Jasminum forte arboreum, foliis Laurinis ex adverfo nafcentibus, oblongis, acuminatis, flore albo. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 169. & *Hift. Jam. vol.* 2. *Tab.* 205. *Fig.* 1. Has fpecies *Linnaeus* fecundum ejus fyftema a Jasminis fepavit, a quibus Florum petalis & ftaminibus numero diverfis differunt, nomenque iis inpofuit IXORAE in *Char. pl. gen. pag.* 27. cujus characterem fequenti modo ibi definit:

CAL *Perianthium* quadripartitum, minimum, erectum, perfiftens.

COR: *Petalum* unicum. *Tubus* cylindraceus, longiffimus, tenuis. *Limbus* quadripartitus, planus. *Laciniis* ovatis.

STAM. *Filamenta* quatuor, in divifuris corollae, breviffima, incurva. *Antherae* oblongae.

PIST. *Germen* fubrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine tubi. *Stigma* bifidum.

PER. Bacca fubrotunda, unilocularis.

SEM. quatuor, hinc convexa; inde angulata.

JASMINUM glandiferum, foetidum, Zeylanicum, GHURAENDA Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 23. vocatur a *Ghu* quod ftercus humanum notat, & *Rhaenda* quod foetorem ftercoris. eft inftar Clematis daphnoidis, floribus oblongis, tubulofis, Jasmini. Hujus & alia fpecies eft arborefcens. *Muf. Zeyl.* quod an Jasminum littoreum Gamber Lant. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 7. *cap.* 47?

JASMINUM Indicum, fpinofum, bacciferum, lactefcens, umbellatum. *Muf. Zeyl. pag.* 25 & 70. *Plukn. Phyt. Tab.* 305. *Fig.* 4. KOHOMBA, KATHUKARANDA & KATHUKARADA Zeylonenfibus. a *Kathu* quod fpinas notat.

JASMINUM fylveftre, triphyllum, floribus rubellis, umbellatis. *Nobis. Tab.* 58. *Fig.* 1. Jasminum Zeylanicum, odoratum, fylveftre, bacciferum. *Muf. Zeyl. pag.* 44. & *Herb. Herm.* Jasminum Myrfinites, triphyllum, Malabarenfe, floribus oblongis rubellis. *Plukn. Phyt. Tab.* 303. *Fig.* 2. WALPIDSCHA Zeylonenfibus, quo nomine in *Ray. Dendr. part.* 3. *pag.* 63. citatur Jasminum Zeylanicum, inodorum, petalis ad umbilicum usque incifis, feu bifidis, WALPITSA Zeylonenfibus. Dr. *Hermans. S. Brouwn lib.* 4. *pag.* 161. Sed quod fubfequent magis con-

convenire videtur. Quum haec noſtra planta florum petala habeat integra, & odorata ſit, cum aliis ſylveſtribus caeterum conveniens, caulem habens glabrum, rotundum, viridem, e quo folia oppoſita, tria ſimul communi pediculo orta, proveniunt, quae ſunt oblonga, acuta, glabra, ſuperne viridia, inferne pallidiora. Flores in ramorum ſummo utcunque collocantur plures ſimul umbellati quaſi, longo prius & communi, dein ſuo proprio, breviori pediculo inſidentes, penta-petaloides, tubuloſi, odorati, rubicundi, baccas utcunque geminas poſt ſe relinquentes, ut in aliis hujus generibus.

JASMINUM Indicum, ſylveſtre, bacciferum, inodorum. *Muſ. Zeyl. pag.* 60. an Jasminum luteum, vulgo dictum bacciferum. *C. B. Pin. pag.* 398. & *Plukn. Almag. pag.* 195? Jasminum luteum ſeu trifolium fruticans, aliis Polemonium *Parkins Theat. pag.* 1466. Katu-Mulla *H. Malab. part.* 6. *Tab.* 56. quod floribus albis differt, ÆTHAKIRINDI Zeylonenſibus.

JASMINUM Zeylanicum inodorum, maximum. MAHARATAMBALA Zeylonenſibus. D. *Hermans.* apud *Ray. Dendr. part.* 3. *pag.* 63. Nalla-Mulla *H. Malab. part.* 6. *Tab.* 50. &c.

JASMINUM Limonii folio conjugato, flore odorato, pleno, vario. *Nobis. Tab.* 58. *Fig.* 2. Jasminum Arabicum, folio Aurantii flore pleno. *Muſ. Zeyl. pag.* 32. Jasminum Arabicum, flore roſeo pleno. *Herb. Herm.* Jasminum Indicum, Mali Aurantiae folio, flore albo, pleno, minore. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 58. Jasminum Indicum, Mali Aurantii foliis, flore albo, duplici. *H. Beaum. pag.* 25. Jasminum Arabicum, foliis Limonii conjugatis, flore albo pleno, odoratiſſimo *Boerh. Ind. H. L. B. part.* 2. *pag.* 217. Syringa Arabica, flore duplici. *Parkin. Theat. pag.* 1467. Syringa Arabica, foliis Mali Aurantii. *Par. Bat. Pr. pag.* 379. variat flore ſimplici & pleno, & foliis ſolitariis, oppoſitis, & etiam ternis, ut Cudda-Mulla *H. Malab. part.* 6. *Tab.* 51. quae ternis gaudet foliis. Nandi Ervatam minor *H. Malab. part.* 2. *Tab.* 55. quae flore ſimplici odoratiſſimo gaudet; & in notis Jasminum Malabaricum, foliis Mali Aurantii, flore niveo odoratiſſimo vocatur. ut & apud *Amm. Char. pl. pag.* 483. IDDA noſtra Zeylonenſibus vocatur per excellentiam, quod florem notat, quodque nomen *Nerio* infra deſcripto etiam inditum eſt, & aliis etiam plantis additur



JASMINUM *Zeylanicum, folio oblongo, flore albo, pleno, odoratissimo.*

tur faepius *Idda*, qui egregiis conftant floribus. Arbufcula noftra truncum habet fcabrum, cortice albo obductum, e quo caules emittuntur, unius anni cortice viridi, fubhirfuto conftantes, qui in hac fpecie folia gerunt utcunque oppofita, magna, fubrotunda, venofa, fcabra, utrinque viridia, brevibus, fed firmis innixa pediculis. Flores in ramorum fummo colliguntur plurimi, calicibus tenuiffimis, profunde fectis contenti. Flos pluribus petalis, octo, novem, decem conftat, varii coloris, nunc enim rofeum, nunc penitus album habet colorem, prout viget, vel incipit marcefcere; odor ipfi ineft jucundus, & Jasmini fingularis, Balfamicus, & refocillans, qui per hybernacula primo vere fefe grate diffundit, unde & in Botanophilorum hortis maxime aeftimatur & appetitur haec arbufcula, quum & per plurimam anni partem elegantes fuos producat flores, & amoenum fpargat odorem, cujus & participem me fecit Dom. *Georg. Cliffortius*, Botanices cultor eximius. hujus generis & aliae elegantes obfervantur fpecies, uti in *Catal. Horti Pifani a Dom. Tillio* duae proponuntur *pag.* 87. quarum una *Tab.* 30. nitide infculpta eft, vocaturque Jasminum Indicum, Mali Aurantiae foliis, flore albo, pleno, ampliffimo; juxta *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 59. quod cum Cudda Mulla *H. Malab. part.* 6. *Tab.* 51. convenit. altera *Tab.* 31. confpicitur, folio acuminato, flore ftellato, majore, odoratiffimo, quae fpecies a *Tito in H. Mauroc. pag.* 96. denominata eft. nos & aliam adhuc fubjungemus, quae ab *Hertog* in Zeylona obfervata fuit, vocaturque

Jasminum Zeylanicum, folio oblongo, flore albo, pleno, odoratiffimo. *Herb. Hert. Tab.* 59. Nandi Ervatam major. *H. Malab. part.* 2. *Tab.* 54. quae *pag.* 106. in notis vocatur Syringa Malabarica, lactefcens, flore pleno, niveo, odoratiffimo. & *Amm. Char. pl. pag.* 483. Mougri Indorum, feu Jasminum Arabicum, folio Mali Aurantiae, flore pleno, maximo, Nandi Ervatam. *H. Malab. Amm. Char. pl. pag.* 479. an Jasminum arborefcens, Lauri folio, flore albo, odoratiffimo. *Plum. Cat. pl. Amer. pag.* 17?

Haec arbufcula lignum fuum tegit cortice albicante, fcabro in trunco, unde rami, qui fi teneriores, virides, alias cinerei prorumpunt; folia gerentes incerto ordine, utcunque tamen bina oppofita, ex nodulis fimul proveniunt glabra, oblonga, acuta, fuperiore parte viridia, inferiore pallidiora, tenuia. Flores ex foliorum alis, ut & in fummo caulium proveniunt longis in pediculis, primo communibus, dein pro-

 priis

priis infidentes, calicibus parvis, quinquefidis contenti, qui claufi, oblongi, tubulati funt, aperti vero inftar Rofae fefe expandunt, coloris nivei, & odoris fragrantiffimi, jucundi. In *H. Malab.* de hac notatur quod lactefcat, & fub tempus, quo florum exortus inftat, folia omnia decidant, novaque fimul cum floribus erumpant.

JASMINUM Zeylanicum, ampliffimo Coryli folio, non dentato, floribus albis, odoratis *Plukn. Amalth. pag.* 122. forte ad Jasminum Limonii folio a nobis exhibitum pertinet, vel ejus varietas eft.

JASMINUM Indicum, flore coeruleo Syringhae. *Nochile* Malabaris, *Lagondi* Malaice *Muf. Zeyl pag.* 64. forte Jasminum, folio integro, obtufo, flore coeruleo, racemofo, fructu flavo. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 169.

JASMINUM Millefolii folio, ÆTPAMBA Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 60. videtur a Quamoclit foliis tenuiter divifis diverfum, quum aliud nomen Zeylonicum gerat; & illud alio loco, ac modo ab *Hermanno* citetur, & denominetur. quod infra proponitur. Jasmini characterem habet *Linnaeus* in *Char. pl. gen. pag.* 3.

IEONPALA, *Muf. Zeyl. pag* 4. ubi dicitur; hujus duae funt fpecies; una a mulierculis comeditur in acetariis, loco Bliti.

INOPHYLLUM flore quadrifido. *Nobis. Tab.* 60. Kina minor. *Muf. Zeyl. pag.* 46. Tsjeru-Punna *H. Malab. part.* 4. *Tab.* 39. Kalophyllodendron Indicum, folio & fructu minore. *Vaill. act. reg. Paris. ann.* 1722. *pag.* 283. Calaba folio citri fplendente. *Plum. nov. pl. gen. pag.* 39. *Tab.* 18. Cornus Malabarica, foliis Nymphaeae. *Ray. hift. pl. pag.* 1537. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 23. HINKINA Zeylonenfibus.
Inophyllum hanc vocavimus, quia folia ita funt ftriata, acfi effent fibrae mufculi longitudinaliter diffecti; fingularis enim ftructurae funt; quum a nervo longitudinali ipfius folii utrinque excurrant fibrae parallelae, vel potius ftriae a cofta ad marginem excavatae, rectae, veluti fummi artificis ftudio elaboratae: Folia glaberrima funt, ovata, oppofita, petalis quadragonis, ramis quadragonis infidentia, videntur effe perennia, quum fatis dura & craffa fint. Petioli ex alis foliorum oriuntur communiter folitarii, trifidi, & iterum trifidi, apicibus flores fuftinentes, qui fine calice funt, tetrapetali, regulares, rofacei, ftaminibus numerofis cum parvis apicibus inftructi, quorum piftillum fimplex eft & capitatum.

Fructus



INOPHYLLUM *flore quadrifido*. *Nobis*.



JUJUBA aculeata, nervosis foliis, infra sericeis, flavis. Nobis.

Fructus bacca eft globofa, magna, unico officulo rotundo-acuminato foeta. hujus & character defcribitur a *Vaillant.* & *Plumier* locis citatis.

INOPHYLLUM flore octifido. *Nobis.* Kina *Muf. Zeyl. pag.* 11 & 29. Nux Zeylanica, oleofa, major. *Muf. Zeyl. pag.* 57. Punna *H. Malab. part.* 4. *Tab.* 38. Kalophyllodendron Indicum, folio fubrotundo. *Vaill. act. reg. Paris. ann.* 1722. *pag.* 283. Fooraha *Flacourt Hift. Madag. p.* 139. *n.* 115. Prunifera, feu Nucifera, Malabarica, foliis Nymphaeae, fructu rotundo, cortice pulvinato. *Ray. hift. pl. pag.* 1525. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 56. Arbor Indica, Mali Medicae amplioribus foliis, Maderasp. forte Punna *H. Malab. Plukn. Phyt. Tab.* 147. *Fig.* 3. Bintangor maritima, Bintangor Lant, vel Caju Maria. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 3. *cap.* 26. ubi fructus pruniformis depictus eft. KINE major & KOUGHURU Zeylonenfibus. de quo dicitur in *Muf. Zeyl. pag.* 11. Arbor eft inter Canelliferas frequens, cujus radix gummi fundit albicans, pellucidum, inodorum. Flores funt nivei, odorati. Fructus rotundi, edules, magnitudine Nucis Juglandis, nucleo valde oleofo. Folia rotunda, nervis plurimis a nervo medio ad margines. *Amman.* autem in *Char. pl. pag.* 533. De Punna haec habet: Eft Mali fpecies refinofae, vix diffimilis ei, quae fundit Gummi Gottae, ut habet *Zanon*; fed diffimilitudo eft in feminibus, quae velim conferas. Caeterum Punna eft arbor prunifera, floribus octo petalis, racematim cohaerentibus, & fructu rotundo, fub carnofo cortice, & lignofo putamine nucleum amarum includente, fuccum flavum ac refinofum fundens.

JUJUBA aculeata, nervofis foliis, infra fericeis, flavis. *Nobis. Tab.* 61. Jujuba Indica, rotundifolia, fpinofa, foliis majoribus, fubtus lanuginofis & incanis. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 60. Paliurus Zeylanicus, folio molli, incano. *Herb. Hert.* Zizyphus Indicus, nemorofus, foliis nervofis, fubtus fericeis. *D. Garzin.* qui varias hujus mihi oftendit fpecies, in India Orientali a fe ipfo collectas. Cum Jujuba Indica *C. B. Pin. pag.* 446. haec a *Breynio* & *Plukn. Almag. pag.* 199. jungitur. ubi plura funt fynonyma. Perin-Toddali *H. Malab. part.* 4. *Tab.* 41. cujus defcriptio noftrae plantae fatis convenit, neutiquam Figura; quae etiam non exacte eft obfervata, nec defcriptioni multum refpondet. Pro WAELAMBILLA Cinghalenfium haec ab auctoribus habe-

 tur,

tur, quo nomine ELAEACHNUS fupra exhibita apud *Hermannum* occurrit.

Caulis noftri fruticis eft teres, erectus, hirfutus, aculeatus, e quo alternatim prodeunt folia ovato-acuminata, integerrima, fupra & infra nervofa, fuperius tamen glabra, inferius flava, & molli hirfutie, quafi fericea tecta, ita tamen ut nervi diftincte confpiciantur. Infra foliorum ortum enafcitur ubique aculeus quidam brevis, reflexus, validus, acutiffimus. Rami alternatim progerminant e caule ad alas foliorum, & fimilibus inftruuntur, fed minoribus foliis, eodem modo enatis. Hic tamen in finu foliorum enafcuntur flores plurimi, minimi, in minutiffimum fafciculum congefti, qui cum fructibus in *H. Malab.* bene exhibentur & defcribuntur.

JUJUBA Indica, fpinofa, folio & fructu longiori. *Plukn. Almag. pag.* 199. *Ray. tom.* 3. *Dendr. pag.* 44. Prunus Zeylanica, fpinofa, folio longiore. *Par. Bat. Pr. pag.* 367. Prunus Zeylanica, fpinofa, longiori folio, viridi, fructus officulo orbiculari, fcrobiculis referto. *Plukn. Phyt. Tab.* 216. *Fig.* 6. an fructus peregrinus, quartus, *Clufii Exot. lib.* 2. *cap.* 30?

JUJUBA Indica, fpinofa, folio & fructu rotundo. *Plukn. Almag. pag.* 199. *Ray. tom.* 3. *Dendr. pag.* 44. Prunus Zeylanica, fpinofa, foliis & fructibus rotundis. *H. L. App. pag.* 694. Prunus Zeylanica, fpinofa, folio rotundo, majore. *Par. Bat. Pr. pag.* 367. Prunus Indica, fpinofa, fylveftris, foliis rotundis nervofis, fructu parvo, molli, *Moffan.* Lufitanis. *Muf. Zeyl. pag.* 12. ILANDA Zeylonenfibus.

JUJUBA, feu Zizyphus, Zeylanica, rotundifolia, crenata, minor; foliis fubtus lanuginofis. *Plukn. Almag. pag.* 199. *Phyt. Tab.* 197. *Fig.* 2. Prunus Zeylanica, fpinofa, folio rotundiori minori. *H. Beaum. pag.* 35. *Par. Bat. Pr. pag.* 367. Jujuba Indica, rotundifolia, fpinofa, foliis minoribus, magis viridibus; five Oenoplia, feu Napeca Indica, foliis minoribus, magis viridibus. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 60. Prunus Zeylanica HERMANNI. *ibidem.*

KABALLAEJADIWA, *Muf. Zeyl. pag.* 48. Lingua Diaboli Zeylonice dicitur, quia folia referunt Linguam Lacerti peregrini, fquamofi, Lufitanis *animal verecundum* vocati, a Cinghalis autem *Kaballaeja* dicti. *Diwa* notat linguam.

KAGI-

KAGILAWAEL. *Muf. Zeyl. pag.* 69.

KALUHABURUNGHOS. *Muf. Zeyl. pag.* 21.

KALUHAMBURU. *Muf. Zeyl. pag.* 67. *Kalu* notat nigrum colorem.

KATUPAVE. *Muf. Zeyl. pag.* 67.

KAUKEN Indorum. *Breyn. Cent.* 1. *pag.* 20. *cap.* 8. *Muf. Zeyl. pag.* 33. Arbor Indica, Pyri folio denfiore, floribus odoratiffimis. Elengi *H. Malab. Plukn. Almag. pag.* 203. Elengi invenitur in *H. Malab. part.* 1. *Tab.* 20. quod *pag.* 34. in notis vocatur Oleae adfinis Malabarica, Pyri folio, flore odorifero, ftellato. pro quo etiam agnofcitur in *Ray. tom.* 3. *pag.* 665. & ejus defcriptionem ex *Breynio*, vide in *Ray. tom.* 2. *pag.* 1781. MURUMAL Zeylonenfibus.

KAEBAELLA. *Muf. Zeyl. pag.* 70.

KAERAEKOKU. *Muf. Zeyl. pag.* 6. *Kaeku* & *Koku* notat annulum illum, quem plantae quaedam tenellae & juniores in cacumine conficiunt, ut omnes *Filicum* fpecies faciunt.

KETMIA Sinenfis, fructu fubrotundo, flore pleno. *Tournef. inft. pag.* 100. Malva Indica, frutefcens, flore pleno, rofeo; rubro. *Muf. Zeyl. pag.* 29. Alcea Indica, hortenfis, flore pleno atro-rubente, Rofae fimillimo, *ibidem. pag.* 61. Alcea arborefcens, Indica, hortenfis, flore atro-purpureo. *Herb. Herm.* Althaea arborea, rofea, Sinenfis, multiplex & fimplex, *Morif. Hift. tom.* 2. *pag.* 530. *Tab.* 18. *fect.* 5. Rofa Batavica, Indica, inodora. *Bontii Hift. nat. lib.* 6. *cap.* 46. *pag.* 141. ubi mira Figura. Rofa Sinenfis. *Ferr. Fl. Cult. pag.* 479. ubi melior icon & *Amm. H. Bofian. pag.* 31. de hac porro vide notas ad *Merian. infect. Surin. pag.* 31. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 2. ad Alceam arborefcentem Japonicam, pampineis foliis fubafperis, flore mutabili, five colorem mutante. *Breyn. Pr.* 2. *pag.* 10. ubi plura invenies fynonyma. Flos feftalis, Bonga Raja. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 6. *cap.* 12. Ain-Pariti *H. Malab. part.* 6. *Tab.* 43. ubi flore fimplici, & Schem-Pariti *H. Malab. part.* 2. *Tab.* 17. ubi flore pleno exprimitur. WADDA-GHAS Zeylonenfibus. *Fulo de Sapatta* & *Foglie Sapatte* Lufitanis, hoc eft flos Calceoli, quod fucco florum coria tingantur. Defcriptio-

nem nec Figuram addimus, quum a tot jam auctoribus sit exhibita & descripta, & ob facilem ejus propagationem, & culturam unicuique fere in hortis praesens.

Ketmia arborea, orbiculatis foliis, floribus Ephemeris, fructu pentagono. *Nobis.* Alcea arborea, Indica, foliis orbiculatis, Ketmiae floribus Ephemeris, fructu in quinque partes hiante. *Mus. Zeyl. pag.* 40. Flos Horarius, Bonga Balitsjaja. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 6. *cap.* 17. BELIPATHAEGHAS. Zeylonensibus.

Ketmia Ægyptia, semine moschato. *Tournef. inst. pag.* 100. quae a *Merian.* eleganter exprimitur ad *pag.* 42. Alcea Indica, magno flore, villosa, moschata, siliqua pentagona: seu Alcea moschata *Pisonis. Mus. Zeyl. pag.* 40. Alcea Indica, moschata, villosa, siliquis pentagonis *ibidem. pag.* 48. Althaea Indica, magno flore, semine moschato *ibidem. pag.* 59. Abel Mosch. Ægyptiacum, sive Althaea Ægyptiaca moschata. *Moris. hist. Oxon. part.* 2. *pag.* 533. Abel Mosch Indicum, vel Alcea Indica, magno flore, villoso, moschato semine, siliqua pentagona; *Amman. H. Bosian. pag.* 1. & *Char. pl. pag.* 241. qui Abel Mosch Ægyptiacum, & Abel Mosch Indicum duas facit plantas. Catta-Gasturi *H. Malab. part.* 2. *Tab.* 38. reliqua synonyma occurrunt apud *Tournef. pag.* 100. *Plukn. Almag. pag.* 14 & 15. *Commel. Fl. Malab. pag.* 2. & plurima apud *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 98. ejus usum vide apud *Samuel. Dale Pharmac. pag.* 306. Granum moschatum, Gendapura *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 6. *cap.* 18. KAPUKANAESSA. Zeylonensibus.

Ketmia Indica, flore amplo, flavo, pendulo, fructu pentagono, alato. *Nobis.* Alcea Indica, non spinosa, flore amplo, flavo, pendulo, fructu quinquangulo, alato. *Mus. Zeyl. pag.* 43. TELAEPALA Zeylonensibus.

Ketmia Indica, flore amplo, flavo, pendulo, unguibus holosericis, pericarpiis quinque angulis. *Nobis.* Alcea Indica, non spinosa, flore amplo, flavo, pendulo, unguibus holosericis, pericarpiis quinque angulis. *Mus. Zeyl. pag.* 59. Alcea Indica, non spinosa, fructu lappaceo, altera. *ibidem. pag.* 66. an Alcea arborea, Indica, villosa, quinis foliorum lobis, flore magno, sulphureo? *Plukn. Almag. pag.* 14. & *Phyt. Tab.* 255. *Fig.* 2. KAPUAEPALA Zeylonensibus.

Ket-

KETMIA Indica, folio anguftiore, acuto, flore amplo, flavo, pendulo, unguibus holofericis. *Nobis.* Alcea Indica, non fpinofa, folio angu- ftiore, & magis mucronato, flore amplo, flavo, pendulo, unguibus holofericis. *Muf. Zeyl. pag.* 63. eadem & *ibidem* eft folio latiore, flore flavo, nitente. quae conveniunt cum Malva arborea, folio oblongo-acuminato, veluti dentato, & laeviter finuato, flore ex rubro fla- vefcente. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 95. & *Hift. Jam. part.* 1. *pag.* 216. *Tab.* 133. *Fig.* 1.

KETMIA Indica, fpinulofa, profunde laciniata, Acetofae fapore. *Nobis.* Alcea Acetofa, fpinofa, Indica, farmentofa, floribus amplis, pendu- lis, unguibus Holofericis: Acetofa Indica *Bontii. Muf. Zeyl. pag.* 65. Acetofa Indica apud *Bontium* occurrit *lib.* 6. *cap.* 27. *pag.* 114. Alcea Acetofa, fpinofa, Indiae Orientalis heptaphylla, five Acetofa Indica *Bontii. Breyn. Prodr.* 1. *pag.* 1. Alcea Acetofa Indica, fpinofa, foliis profunde laciniatis, flore fubluteo, amplo. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 9. Althaea Indica, fpinofa, Acetofae fapore, flore flavo, pendente. *Par. Bat. Pr. pag.* 308. Alcea fpinofa, Maderasp. faporis acidi, foliis pro- funde laciniatis Cannabis in modum, pentaphylla. *Plukn. Almag. pag.* 15. quae in *Phyt. Tab.* 5. *Fig.* 4. exhibetur. vide & *H. L. Bat. pag.* 27. & *Commel. Fl. Malab.* 3. ubi cum Narinam Pulli *H. Malab.* jungitur, fed quae potius ad fequentem pertinet. NAPIRITTA Zeylonenfibus.

KETMIA Indica, Goffypii folio, Acetofae fapore. *Tournef. inft. pag.* 100. Ketmia Goffypii folio, Acetofae fapore. *Plum. Cat. pl. Amer. pag.* 2. Althaea Indica, Goffypii folio, Acetofae fapore. *H. L. Bat. pag.* 25. Althaea Indica, Acetofae fapore. *Amm. hort. Bofian. pag.* 2. Alcea Acetofa Indica, mitis, foliis fuperioribus Goffypii in modum tripar- tito divifis. *Plukn. Phyt. Tab.* 6. *Fig.* 2. Alcea Acetofa trifido folio, Indiae Orientalis. *Breyn. Prodr.* 1. *pag.* 1. & *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 90. & *Hift. Jam. part.* 1. *pag.* 224. ubi vide reliqua. Narinam Pulli, *H. Malab. part.* 6. *Tab.* 44. quae in notis Alcea Indica, fpinofa, ma- gno flore, ex albido flavefcente vocatur.

KETMIA Indica, Cannabinis foliis, *Bangue* dicta. *Nobis.* Althaea Indica, Cannabinis foliis, *Bangue* dicta *Garciae ab Horto. H. L. B. pag.* 26. Bangue apud *Garciam* occurrit *pag.* 276. Figura, & *pag.* 277. *defcr. Edit. Ital. in quarto.* & apud *Cluf. cap.* 54. *pag.* 290. & apud *Acoft. p.* 290.

Can-

Cannabi ſimilis exotica *C. B. Pin. pag.* 330. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 17. Bangue Cannabi ſimile *J. Bauh. tom.* 3. *pag.* 440. *lib.* 30. Bangue *Parkin. Theat. pag.* 1624. Alcea Indica, Cannabino folio, Aceтоſae ſapore quibusdam. *Sam. Dale Pharm. pag.* 306. qui Cannabis ſpeciem veram eſſe ex *Robinſon* aſſerit, & a quo pro Calengi-Cansjava *H. Malab. part.* 10. *pag.* 119. habetur. vide & *Commel. Fl. Malab. pag.* 3.

KETMIA folio quinquefido, ſubtus candicante, flore flaveſcente, ſemine tomentoſo. *Nobis.* Althaea arbor, folio quinquepartito, ſubtus candicante, religioſa. *Muſ. Zeyl. pag.* 32. Cudi-Pariti. *H. Malab. part.* 1. *Tab.* 31. quae in notis Alcea Malabarenſis, pentaphylla, flore minore, ex albo flaveſcente, ſemine tomentoſo, vocatur. an Novella rubra, Daun Baru Mera *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 3. *cap.* 30? ubi Pariti *H. Malab. part.* 1. *Tab.* 30. jungitur.

KETMIA Zeylanica, Populi folio incano, flore ſimplici, albo. *Hart. Catal. ſemin.*

KETMIA Zeylanica, ſempervirens, & florens, Tiliae folio, flore luteo. *Hert. ibidem.* Arbor Solis, Indica, major; ſeu Alcea Indica arborea, major, Tiliae folio, floribus Ketmiae ephemeris, fructibus orbiculatis, ſulcatis, ſuccum Guttae Gambae ſimilem fundentibus. *Muſ. Zeyl. pag.* 45. Althaea arbor, rotundifolia, flore roſeo incarnato. *ibidem. pag.* 37. Ketmia Indica, Tiliae folio. *Plum. Cat. pl. Amer. pag.* 2. Ketmia Indica, Populi folio, fructu orbiculato, compreſſo. *Tournef. inſt. pag.* 100. Arbor Solis THYRYAGHAS *Muſ. Zeyl. pag.* 61. Althaea arborea, Indica, Populi folio, flore ephemero. *H. L. Bat. pag.* 22. Alcea arborea, Indica, maxima, Populi folio, flore majore, flaveſcente. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 10. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 2. *Plukn. Almag. pag.* 16. Alcea Indica, arboreſcens, folio Populi, vel cordiformi, flore Ephemero, ex albo flaveſcente. *Amm. H. Boſian. pag.* 6. & *Char. pl.* 300. Novella Daun Baru *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 3. *cap.* 28. SURIGHAHAS Zeylonenſibus, a *Suria* quod ſolem, & *Ghas* ſeu *Ghaha* quod arborem notat. *Povereſſa* Luſitanis dicitur, de quo notatur in *Muſ. Zeyl. pag.* 61. quod flores hujus arboris Solis ortu luteſcant, & expandantur, occaſu vero ejus rubeſcant, & decidant.

KET-

KETMIA Indica, Vitis folio, flore amplo, flavo. *Nobis.* Althaea Indica, Vitis folio, flore amplo, flavo, pendente. *H. L. Bat. pag.* 26. ubi icon & defcriptio, & *Commel. Fl. Malab. pag.* 3. Alcea Indica, Vitis folio, flore amplo, flavefcente, quinis ad fingulos flores thecis, Katan-Belloveren. *H. Malab. part.* 6. *Tab.* 46. *Plukn. Almag. pag.* 15. Alcea Indica, non fpinofa, flore amplo, pendulo, flavo. *D. Hermans. Breyn. Prodr.* 1. *pag.* 2. Abutilon Indicum, fronde Pampinea, fructu quinquecapfulari. *Tournef. inft. pag.* 99. Abutilon Indicum, quinque ad fingulos flores thecis. *Ray. hift. part.* 2. *pag.* 1818. &c.

KETMIA Indica, foliis Laurinis, flore violaceo, fpicato. *Nobis.* Althaea arborea, Indica, flore violaceo, purpureo, fpicato. *Par. Bat. Pr. pag.* 307. *Muf. Zeyl. pag.* 61. Alcea Indica, arborea, pericarpio carnofo, in plura loculamenta partito. *Ray. hift. pl. part.* 2. *pag.* 1902. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 2. Alcea Indica, arborefcens, Lauri folio prima, feu Alcea Indica, arborefcens, foliis Laurinis, fubafperis, polyanthos, minor, flore purpureo, hexapetalo, petalis rotundioribus & latioribus, fructu minore, caudato. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 11. Adamboe vel Althaea arborefcens, Indica, flore purpureo, fpicato. *Amm. H. Bofian. pag.* 1. & *Char. pl. pag.* 247. forte Abutilon arboreum, fpicatum, flore purpureo minore, Betonicae folio incano. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 97. Adamboe *H. Malab. part.* 4. *Tab.* 20 & 21. MURTUGHAS Zeylonenfibus.

KETMIA Zeylanica, Fici folio, perianthio oblongo, integro. *Dillen. H. Elth. pag.* 190. *Tab.* 157. Ketmia Indica, humilis, folio diffecto, afpero, flore parvo, candido, inftar Jasmini Hifpanici explicato, purpurafcente. *J. Ph. Breynii ibidem* &c.

KETMIA Zeylanica, virens, pilofa, annua, flore fulphureo, umbone atro-purpureo. *Alb. Sebae rer. nat. thef. part.* 1. *Tab.* 18. *Fig.* 3. & *pag.* 27. ejus defcriptio. Hujus generis characterem dedit *Linnaeus in char. gen. pl. pag.* 207.

KORRACA congener. *Muf. Zeyl. pag.* 70.

LACHRYMA JOBI. *H. Eyft. Æftiv. ord.* 13. *Fig.* 1. *pag.* 6. *Cluf. Hift.* CCXVI. Lachryma Jobi Indica, Salee. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 8. *cap.* 28. Milium Solis, feu Lithofpermum Indicum Bontii, &

Lithofpermum arundinaceum, forte Diofcorid. & Plinii *Muf. Zeyl. pag.* 29. & *C. B. P. pag.* 258. Milium Solis *Bontii pag.* 152. Lachryma Jobi multis, five Milium arundinaceum *J. Bom. tom.* 2. *lib.* 18. *pag.* 449. Milium arundinaceum, femine Lithofpermi facie, maximo, duriffimo. *H. L. Bat. pag.* 426. &c. KARAEBU Zeylonenfibus.

Lachryma *Jobi* gramineis foliis, in capreolos definentibus. *Nobis.* Lithofpermum Indicum, arundinaceum, foliis gramineis in capreolos definentibus. *Muf. Zeyl. pag.* 30.

Lachryma *Jobi* Zeylanica, omnium maxima, *Nobis.* Lithofpermum maximum arundinaceum, Zeylanicum. *Muf. Zeyl. pag.* 40. Catri-Conda *H. Malab. part.* 12. *Tab.* 70. Lachryma Jobi altiffima, Arundinis folio & facie. *Plum. Cat. pl. Amer. pag.* 11. quae a *Merian. Inf. Surin.* exprimitur ad *pag.* 54.

Lachryma *Jobi* paludofa, minor, *Nobis.* Lithofpermum Indicum, arundinaceum, paludofum, minus. *Muf. Zeyl. pag.* 65. Lithofpermum Cyperoides, arundinaceum, minus paludofum. *ibidem. pag.* 71. Lithofpermum Ambonicum, Saleeutan *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 10. *cap.* 16. KARABU Zeylonenfibus.

LAMIUM anguftifolium, glabrum, Zeylanicum, flore albo. *Muf. Zeyl. pag.* 1. Videtur effe Leonurus annuus, anguftifolius, flore albo. *ibidem.* TUMBAKOLA & WALKARALHAEBO ad differentiam illius, quod in hortis nafcitur, Zeylonenfibus vocatur. *Wal* enim fylveftre notat.

Lamii rubri fimilis Malabarica, radice glandulofa, eduli, Kurka *H. Malab.* INSALA Zeylonenfibus dicta. *Plukn. Amalth. pag.* 129. Kurka *H. Malab. part.* 11. *Tab.* 25. exprimitur.

LATHYRUS Zeylanicus, odorato flore, amoenè ex albo &rubro vario. *Nobis.* Lathyrus Zeylanicus, hirfutus, flore variegato, odorato. *Herb. Hart.* floris tantum varietate haec planta a Lathyro odorato *Cupani* differt, quem, quia in *H. Amft. part.* 2. *pag.* 159. *Fig.* 80. bene defcriptus & expreffus eft, hic non ulterius exhibemus, quum & omnibus infuper notae funt hae plantae, eo quod frequentiffime in noftris occurrant hortis.

Lathy-



LAURUS *ſerrata, floribus ſpicatis, ex foliorum alis provenientibus. Herb. Herm.*

LATHYRUS Zeylanicus, flore rubro, pulchro, filiquis Pifi. *Breyn. Prodr.* 1. apud *Ray. hift. pl. pag.* 1891.

LAURUS ferrata, floribus fpicatis, ex foliorum alis provenientibus. *Herb. Herm.* quae exprimitur *Tab.* 62. Laurus Zeylanica, foliis ferratis, floribus in fpicis parvis ad exortum foliorum provenientibus. *Herb. Hart.* MENDYA Zeylonenfibus.

Arbor haec eft Cerafi effigie, ramos fuperiores rubros fpargens, e quibus folia alterna, fatis remota exeunt ovato-lanceolata, ferrata, laevia, venofa, venis conveniens cum Cerafo fylveftri; Petioli fimiliter eodem modo exeunt, flores fuftinentes in racemum collectos plurimos, parvos. Unusquisque petiolus, qui communiter folitarius ex fingula folii ala exit, eft fesquiuncialis, erectus, flores albos gerens, quorum calix eft unifolius, quinquedentatus, petala quinque fubrotunda, ftamina viginti, vel plura, piftillum unicum, capitatum. Fructus eft bacca coronata a calice, unde ad Myrtum accedit, quum habeat fructum infra calicem umbilicatum. Ex hac arbore refina odorata colligitur, quae utiliffima ad Paralyfin. &c.

LENS PHASEOLOIDES foliis fubrotundis, oppofitis, flore fpicato, pentapetalo, lobis latiffimis, fructu orbiculato, fufco. *Nobis.* Lens Phafeoloides, maxima, Indica, Caffiae foliis, femine maximo, cordiformi. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 63. Phafeolus alatus, Indicus, fructu fufco, orbiculato, maximo, lobis latiffimis & longiffimis. *H. L. Bat. pag.* 494. *Par. Bat. Pr. pag.* 365. Phafeolus maximus, perennis, folio decompofito, lobo maximo, contorto, Perim-Kaku-Valli *H. Malab. Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 68. Phafeolus Zeylanicus, maximus, folio Lentifci. *Muf. Zeyl. pag.* 44. Phafeolus lobis amplis, longis, geniculatis, fructu maximo, orbiculari, fufco, fplendente, an Pararar Clufii *ibidem* ? Phafeolus utriusque Indiae, arboreus, alatis foliis, fructu magno, cordiformi, lobis longiffimis, nodofis, plerumque intortis. *Plukn. Almag. pag.* 295. ubi reliqua vide & Perim-Kaku-Valli *H. Malab. part.* 8. *Tab.* 32, 33 & 34. ubi confule notas. PUSAETHA & PUSWAEL Zeylonenfibus.

LENS PHASEOLOIDES bifolia, fructu orbiculato, fufco, lobis minoribus. *Nobis.* Phafeolus Indicus, alatus, fructu fufco, orbiculato, maximo, lobis minoribus. *Muf. Zeyl. pag.* 69. *Par. Bat. Pr. pag.* 365. Phafeo-

lus major, Fabae purgatricis nomine miffus, Cor Divi Thomae quibusdam. *Clufii Comment. ad Monard. pag.* 365. Faba purgatrix, latisfima, ex infula D. Thomae. *C. B. Pin. pag.* 338. item arbor filiquofa, Juglandis folio, Brafiliana, lobo longiffimo, Acaciae filiquae inftar diftincto. *C. B. P. pag.* 404. Phafeolus novi orbis, feu Faba purgatrix, latiffima, Cordis Figura. *J. B. tom.* 1. *lib.* 12. *pag.* 438. *Plukn. Almag. pag.* 295. *Phyt. Tab.* 211. *Fig.* 6. HINPUS Zeylonenfibus.

LENTIBULARIA Zeylanica. *Nobis.* eft Millefolium galericulatum. *Ray. Muf. Zeyl. pag.* 9. Millefolium paluftre, galericulatum. *Ray. Meth. pl. auct.* & *emend. pag.* 92. & *Hift. pl. pag.* 1322. Millefolium aquaticum, flore luteo, galericulato. *Parkins. Theat. Botan. pag.* 1258. *J. B. tom.* 3. *lib.* 38. Lentibularia *Rivini ord. pl. irreg. monop.* ubi elegans Figura. hujus nota characteriftica juxta *Rayum* eft, Flos in duo fegmenta divifus, quorum fuperius galeae, inferius labelli lati figuram obtinet. Capfula feminalis eft fubrotunda, unum intus femen continens; reliqua vide apud *Dillen. in novis plant. gener. pag.* 115. & *Linnaeum in char. plant. gen. pag.* 5. ad UTRICULARIAM. hujus minorem fpeciem habet *Plukn. in Phyt. Tab.* 99. *Fig.* 6. vocans Millefolium paluftre, galericulatum, minus.

LEUCAS foliis rotundis, ferratis, flore albo. *Nobis. Tab.* 63. *Fig.* 1. Lamium rotundifolium, album, Zeylanicum, odoratum. *Herb. Herm.* Lamium Indicum, foliis oblongis, flore albo, graveolens. *Muf. Zeyl. pag.* 65. GHAETHATUMBA Zeylonenfibus.

a Lamio hanc feparavimus, quum hujus calix fit tubulatus, ore decadentato, adeoque quoad calicem cum Marrubio convenit, fed labio fuperiore cochleato a Marrubio differt, quod integrum eft, inferius vero labium oblongum, ad latera finuatum, aut emarginatum, quatuor habens ftamina cum apicibus, piftillum unicum, bifidum. Caulem caeterum gerit haec planta quadrifidum, fcabrum, viridem; folia ad caulem bina oppofita, ad decuffim provenientia, pediculis femiuncialibus infidentia, ubi autem rami e caule progerminant, uncialis eft longitudinis pediculus; Folia haec funt glabra, viridia, venofa, fubrotunda, in ambitu ferrata; Flores ex eorum alis proveniunt utcunque gemini; calice longo, tubulofo contenti; qui cum floribus jam fupra defcriptus eft.

LIGU-



Fig. 1.

LEUCAS foliis rotundis, ferratis, flore albo. Nobis.

Fig. 2.

LYSIMACHIA erecta, caule ter tripartito. Nobis.



LIGUSTRUM foliis ad singula internodia ternis, Lignum Colubrinum officinis creditum. Nobis.

LIGUSTRUM foliis ad fingula internodia ternis, *Lignum Colubrinum* officinis creditum. *Nobis. Tab.* 64. Clematis Indica, Perficae foliis, fructu Periclymeni. *C. B. Pin. pag.* 304. *Muf. Zeyl. pag.* 4. Lignum Colubrinum primum, & laudatiffimum, *Garziae ab Horto Hift. aromat. pag.* 163. & *Herb. Herm.* ubi dicitur, quod perperam *Garzias* afferat vocari *Rametul* ab incolis, quum vocetur ACAWERYA & EKAWERYA a Zeylonenfibus. De Ligno Colubrino vide *Cluf. lib.* 1. *Aromat. cap.* 44. a *Rumphio in Herbar. Ambon. lib.* 2. *cap.* 46. breviter hoc lignum juxta *Hermannum* defcribitur, dicitque quod *Hermannus* EKAWERYA vocet, & pro Clematitide Indica, Perficae folio, Caprifolii fructu habeat, huic porro pro Synonymo jungens primam fpeciem *Garziae lib.* 1. *cap.* 44. & *Acoft. cap.* 33. & *Philipp. Baldei lib.* 2. *cap.* 49. *Hiftor. Ceylon. Rumphius* porro in illo capite aliud *Lignum Colubrinum*, a noftro penitus diverfum, depingit & defcribit, quod fructus rotundos gerit, vocaturque ab ipfo *Lignum Colubrinum.* CAJU ULAR *cap.* 46. Radix ferpentum EKAWERYA dicta. *Grimm. Labor. Ceyl. pag.* 116. ubi haec fequuntur: Vocatur a Cinghalenfibus *Rametul.* Pulcherrima planta eft, in altum exfurgit cum ramis tenuibus, & cum foliis longis, & acuminatis, cum parvis raris, fructibus, qui funt racemi fimul conjuncti. Radix difcurrit in modum ferpentum cum nodis fub terra, valde lignofa eft, alba, fufca, cum cortice coloris cinerei & faporis amari. Haec eft prima fpecies, quam *Garzias ab Horto* inter Ligna ferpentum defcribit. Vires ejus non minores funt, quam eae, quas magna Serpentum arbor poffidet. Incolae plurimum eam extollunt contra omnia Venena, & venenofos morbos. Contritam eam exhibent usque ad Semi drachmam, & amplius.

Inquiritur a *Samuel Dale in Pharmacol. pag.* 440. an hoc fit Lignum Colubrinum verum officinarum, & idem, quae Nux Vomica minor; quod eft Solanum arborefcens, Indicum, foliis Napecae minoribus, fructu rotundo, duro &c. *Breynii.* quas ego diverfas puto fpecies, licet earum lignum pro *Ligno Colubrino* habeatur, & utraeque in Zeylona infula crefcant. Prioris fynonyma data funt, & eft lignum Colubrinum primum *Garziae*, pofterioris fynonyma ad *Nucem Vomicam* exhibebuntur infra, cujus lignum, pro tertio Ligno Colubrino *Garziae* & *Acoftae* habetur, ita ut diverfae fint plantae.

Hujus noftrae caulis eft trigonus, articulatus, ftriatus; folia ad fin-

gulum articulum tria, oblongo-acuminata, integra, nec ferrata, quo a Perficae foliis differunt, cum qua alias figura fatis conveniunt, petiolis parvis innixa. In apice caulis oriuntur flofculi plurimi, veluti ac in umbella congefti; qui funt in fundibiliformes, pentapetaloides, calicibus parvis, quinquefidis inftructi, duo habentes ftamina cum unico piftillo; quod deinde abit in fructum fubrotundum, femibifidum, bilocularem, continentem in fingulo loculo femen unicum fubrotundum: unde ambigit inter LIGUSTRUM & LILAC *Tournefortii.*

LIGUSTRUM Indicum, feu Alcanna *Muf. Zeyl. pag.* 65. an Poutaletsje *H. Malab. part.* 4. *Tab.* 572. quae Liguftri fpecies. *Commelin. in notis ibidem.* & Baccifera Indica, baccis oblongis, in umbellae formam dispofitis. *Ray. hift. pag.* 1634. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 12. &c. MANITHONDI Zeylonenfibus.

LILIO-NARCISSUS Zeylanicus, latifolius, flore niveo, linea purpurea ftriato. *H. Amft. part.* 1. *pag.* 73. Lilio-Narciffus Zeyl. latifolius, flore niveo, externe linea purpurea ftriato. *Amm. Char. pl. pag.* 485.

LILIO-NARCISSUS Indicus, flore albo, hexagono. *Plukn. Almag. pag.* 220. Narciffus hexagonus, Zeylanicus, flore odorato, albo. *Par. Bat. App.* Narciffus Zeylanicus, flore albo, hexagono, odorato. *H. Amft. part.* 1. *pag.* 75. & *H. L. Bat. App. pag.* 691 & 693. ubi icones & defcript. Narciffus Zeylanicus, flore albo, hexagono, odorato, LUNULA indigenis dictus. *Amm. Char. pl. pag.* 484. *Ray. hift. pl. pag.* 1904. *Commel. Fl. Malab. pag.* 46. hujus major & minor fpecies eft, & bulbo rotundo, & oblongo; uti videre eft in *Muf. Zeyl. pag.* 61. Lilium Indicum, Caffe Zelan. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 11. *cap.* 47. Pancratii nomine indigitavit hanc familiam Clariff. *Dillen. in H. Elth. pag.* 299. ubi notas vide characterifticas, Catulli-Pola. *H. Malab. part.* 11. *Tab.* 40. WALLUNU, LUNALA & LUNA Zeylonenfibus vocatur.

LILIO-NARCISSUS maximus, Zeylanicus, floribus albis, umbellatis, *Plukn. Almag. pag.* 219. Lilium Zeylanicum, umbellatum, bulbiferum, minus. *Muf. Zeyl. pag.* 55. Lilium Zeylanicum, bulbiferum & umbelliferum. *H. L. Bat. App. pag.* 683. ubi Figura & defcriptio, & *Ray. hift.*



PARONYCHIA foliis ad genicula confertis, acutis, floribus umbellatis. Nobis.

LIMONES pumili, Zeylanici, sylvestres, DEHIGHAHA Zeylonensibus. Mus. Zeyl.

hift. pl. pag. 1905. Belutta-Pola-Taly: *H. Malab. part.* 11. *Tab.* 38. quae Lilii Zeylanici umbelliferi & bulbiferi confpecies. *Commel. in not.* & *Fl. Malab. pag.* 41. TANGHEKOLLI TOLABO minor, & WALTOLABO Zeylonenfibus. Unde & hujus major, & minor habetur fpecies.

LIMONES pumili, Zeylanici, fylveftres, DEHIGHAHA Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 40. & *Herb. Herm.* exprimitur *Tab.* 65. *Fig.* 1. Arboris hujus caulis eft teres, laevis, lignofus; folia funt acuta, craffa, venofa, integerrima, alterna, petiolis breviffimis infidentia; infra foliorum exortum fpina enafcitur acutiffima, & fafciculus florum parvorum, decem aut duodecim fimul, quibus fuccedunt fructus: Differt haec a fubfequenti, foliis folitariis, alternis, quum illa habeat folia conjugata, nec flores ita in fafciculum collectos; nomine Zeylonico etiam penitus diftincta.

LIMONIA Malus, fylveftris, Zeylanica, fructu pumilo; an Limones fylveftres, non majores ovo Columbino circa Cairum Bellonii? *Muf. Zeyl. pag.* 63. Malus Limonia, Zeylanica, fructu pumilo, *ibidem. pag.* 68. Limonellus, Limon Nipis. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 2. *cap.* 39. Malus Limonia, Lentifci folio, Zeylanica, fructu minimo, Uvarum magnitudine aemulo. *Plukn. Almag. pag.* 239. & *Mantiff. pag.* 57. Limones fua fpecie pufilli in Indiae infula Zeylan. *Hift. Lugdun. pag.* 1838. & apud *Plukn. Mantiff. pag.* 125. Malus Limonia, Indica, fructu pufillo. *Ray. hift. pag.* 1658. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 42. Malus Aurantia, fructu Limonis pufillo, acidiffimo. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 211. ubi plura habet fynonyma, & *Hift. Jam. part.* 2. *pag.* 182. Catu-Tsjeru-Naregam. *H. Malab. part.* 4. *Tab.* 12. ubi in notis. Malus Limonia, pumila, fylveftris, Zeylanica D. HERMANNI, quod a *Plukn. in Mantiff. pag.* 57. jungitur cum Coru Indorum, Mali aureae foliis, floribus albis; Parencoruttee *Malabarorum.* vide & *Petiv. act. Londin. vol.* 22. *no.* 271. *pl.* 107. ubi Coutree Malabaris dicitur &c. WALHEDI & JAKUAWA Zeylonenfibus.

LINARIA minima, Zeylanica. *Muf. Zeyl. pag.* 31.

LOTUS Zeylanica, rubra, filiqua rotundiore, habitu Ericae. *Hert. Catal. femin.*

LOTUS

Lotus Zeylanica, minutiſſimis foliis, floribus minimis, purpureis. *Hert. ibidem.*


LYCHNIS Indica, ſylveſtris, viſcoſa, floribus tenellis, rubris. *Hert. ibidem.*

Lychnis Indica, ſylveſtris, floſculis tenellis, albis. *Muſ. Zeyl. pag.* 11. an Lychnis ſylveſtris, minima, anguſtifolia, procumbens, flore ex albido vireſcente? *Plukn. Almag. pag.* 230. ubi vide reliqua. WISADULI Zeylonenſibus, a *Wiſſa*, quod dolorem denotat, & inflammationem, quam *Colubris* morſu cauſavit. *Duli* notat pulverem ſubtilisſimum, aut rem aliquam levem, a quolibet levi vento mobilem: accepit forte hoc nomen, quod hujus pulvis loco dolenti, & a morſu *Colubris* inflammato inſperſus, inflammationem tollat, partemque affectam curet.

Lychnis articulata, repens, folio Vincae Pervincae. *Muſ. Zeyl. pag.* 61. Lychnidifolia. *ibidem. pag.* 13. MAHANAYKOLA, aliis PURUCWAEL & PURUKUWAEL. a *Puruku* quod notat articulum, ſeu geniculum plantae; cauliculi enim articulati ſunt.

LYCOPODIUM Zeylanicum, erectum, ramoſiſſimum. *Nobis. Tab.* 66. Muſcus terreſtris, Zeylanicus, erectus, ſeu Lycopodium Zeylanicum, *Muſ. Zeyl. pag.* 36. Muſcus erectus, ramoſus, terreſtris, Zeylanicus, ſempervirens. *Herb. Herm.* non multum abludit a Muſco maximo, Coridis folio, viticulis valde ramoſis. *Plumier Tab.* 165. *lett. A.* Quum autem ſpicae florum in noſtra planta deſiderentur, nec adeo ea excreverit; incertum eſt determinare, ad quamnam proprie ſpeciem pertineat: Caeterum caulis ejus eſt bipedalis, foliolis ſparſis, aceroſis fere tectus, quae inbricatim incumbunt, ſed quoad inſertionem ſatis remota ſunt: e caule hoc deſcripto prodeunt ſparſim rami plurimi, qui iterum in ramos dividuntur tenuiores; quorum folia ab ipſius caulis non differunt magnitudine, ſed tantum, quod confertiora ſint; uno verbo eſt medium inter Lycopodium Sabinae facie; & repens, vulgatiſſimum Officinarum.

Lycopodium denticulatum, minus, Zeylanicum. *Nobis.* Muſcus denticulatus, Zeylanicus, minor. *Muſ. Zeyl. pag.* 29. Muſcus denticulatus minor,



LYCOPODIUM Zeylanicum, erectum, ramosissimum. Nobis.



LYSIMACHIA *folio sinuato, acuminato, trinervio, flore coeruleo, amplo, calice carinato, alato. Nobis.*

minor, Guianenfis, feu Planta mufcofa, & plumofa, Guianenfis, perelegans, minor. *Breyn. Cent. pag.* 194. *Plukn. Almag. pag.* 247.

LYCOPODIUM Zeylanicum, erectum, foliis craffioribus, & magis compreffis. *Nobis.* Mufcus Zeylanicus, arboreus, clavatus, foliis craffis, rotundis, Lycopodii fructu compreffo. *Muf. Zeyl. pag.* 38. Mufcus Zeylanicus, erectus, perpetuo virens, in arboris proceritatem excrefcens. *Plukn. Tab.* 47. *Fig.* 9. Planta mufcofa, & plumofa, Guianenfis, major. *Breyn. Cent. pag.* 194. Mufcus Zeylanicus, terreftris, clavatus, erectus, BADALWANASSA *Hermanni*: an Belam-Patsja. *H. Malab. part.* 12. *Tab.* 39? apud *Moris hift. pl. part.* 3. *pag.* 624. *Sect.* 15. *Tab.* 5. *Fig.* 6. & *Ray. hift. tom.* 3. *pag.* 33. a *Dodart* fequenti modo defcribitur: Pedale & erectum eft exemplar a *Cl. Hermanno* nobiscum communicatum, in varios ramufculos divaricatum, qui rurfus in alios dividuntur; ad quorum fingulam terminationem clava parva, fublutea, quadrantem unciae longitudine non fuperans, adnata eft. Ita ut primi noftri tantum fit varietas, ac foliis craffioribus, magisque congeftis ab illo differat; ut ex allegatis Figuris facile conftat.

LYSIMACHIA folio finuato, acuminato, trinervio, flore coeruleo, amplo, calice carinato, alato. *Nobis. Tab.* 67. Ciftus Zeylanicus, folio conjugato, flore coeruleo, in umbellam pofito. *Herb. Hart.* huc fpectat Ciftus Chamaerhodendros, Mariana, Laurifolia, floribus expanfis, fummo ramulo in umbellam plurimis. *Plukn. Mantiff. pag.* 49. & Ciftus folio oblongo, integro, glabro, fubtus albido, vafculis trigonis. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 86. & *Hift. Jam. part. pag.* 18. *Tab.* 4. *Fig.* 1. quod eft Hypericum, feu Androfaemum magnum, Canarienfe, ramofum, copiofis floribus, fruticofum. *Plukn. Phyt. Tab.* 302. *Fig.* 1. Noftra planta caulem habet laevem, fungofum, cinereum; medulla albicante repletum, fulcatum, quadrangularem, in quatuor, vel plura internodia diftinctum. Folia huic funt oppofita ad articulos, ovato-acuminata, glabra, finuata, utrinque integerrima, feffilia, trinervia. Flores in fummo ramorum gerit elegantes, coeruleos, expanfos, utcunque fex; petiolis erectis, fimplicibus, raro ramofis infidentes, qui calicem habent quinquefolium, foliis lanceolatis, cum carina in fingulo folio alata; cujus petalum eft unicum, rotatum, tubo, longitudine calicis, limbo quinquefido, amplo, laciniis, ovatis, patentibus.

Stamina funt quinque, erecta, petalo breviora; Piftillum unicum, embryone ovato, ftylo longitudine ftaminum; ftigmate capitato, incurvo. Fructus capfula eft ovata, unilocularis, apice dehifcens; hinc non eft *Ciftus*, cui florum petala quinque, caduca, & ftamina multa; calix quidem quinquefolius, fed in illo duae laciniae minores adfunt.

LYSIMACHIA erecta, caule ter tripartito. *Nobis. Tab.* 63. *Fig.* 2. Lychnis Indica, Gentianae foliis, febrifuga, GIRITILLA Zeylonenfibus. *Petiv. Muf. no.* 657. & *Act. Phil. Lond. vol.* 22. *num.* 264. *pl.* 21. Lyfimachia Indica, glabra, dentata, anguftifolia, *Muf. Zeyl. pag.* 57. Gentiana fugax, Zeylanica, radice fibrofa. *Amm. Char. pl. pag.* 404. Lychnis Gentianae foliis, Zeylanica, florum petalis mucronatis, capfula pyramidali. *ibidem.*
Humilis haec eft planta, ex radice brevi, fibrofa, albicante provenìens, caule fpithamali, erecto, tetragono, albido; in medio autem dividitur caulis in tres partes, fingula pars iterum tripartitur, & adhuc tertia. Flores terminant caules, & ad eorum ortum, ut & ad divaricationem caulis oriuntur folia oppofita, lanceolata, integra.
Flos hujus plantae componitur ex calice quinquefido, parvo, petalo quinquefido rotato, ftaminibus quinque erectis; piftillo unico, fimplici, quod abit in capfulam pyramidalem, unilocularem, femina plurima continentem. Ex communicatione *Joh. Fred. Gronovii* hanc plantam exhibemus.

LYSIMACHIA Zeylanica, caule quinquangulo, floribus incarnatis. *Muf. Zeyl. pag.* 65.

LYSIMACHIA Zeylanica, pratenfis, flore galericulato, incarnato, radice crocea. *Muf. Zeyl. pag.* 65. an *Caffida?*

LYSIMACHIA Indica, aquatica, glabra, flore flavo, filiqua angulofa; ftellata, DYANILLA Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 66. Chamaenerii, ut videtur, haec fpecies eft.


LYSIMACHIA Zeylanica, fpinofa, flore luteo, magno. *Hert. Catal. femin.*

LYSIMACHIAE fpecies, fructu Caryophylloideo, KIKIRINDIA Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 17. Lyfimachia Indica, non pappofa, repens, flore pentapetalo, fructu Caryophylloide. *Ray. hift. pag.* 1510.
&

& *Commel. Fl. Malab. pag.* 41. Nircarambu. *H. Malab. part.* 2. *pag.* 99. huc fpectat Lyfimachia lutea, non pappofa, erecta, minor, flore luteo, pentapetalo, fructu Caryophylloide. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 85. & *Hift. Jam. vol.* 1. *Tab.* 128. *Fig.* 2 & 3. Herba Vitiliginum Sajor-Parum. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 10. *cap.* 35. KIKIRINDIA Zeylonenfibus vocatur, id eft fucco ex viridi atrefcente donata. Vocatur quoque BRUNGA, MARKAKO ANGHARACO. HAEMARAGHO & KARARANGHINA in *Muf. Zeyl. pag.* 17. ubi additur: Planta eft humilis, ramofa, fructu Caryophyllum aemulante. Frigida eft herba in tertio gradu, inprimis oculorum medicina.

MALUS Indica, fructu pentagono, BLIMBI dicta. *Ray. hift. pl. pag.* 1449. *Commel. Fl. Malab. pag.* 42. Mala acida. *Muf. Zeyl. pag.* 19. Mala Malabarica, acida, oblonga, *Billinbing Bontii. ibidem. pag.* 54. ubi notatur. Icon *Bontii lib.* 6. *cap.* 42. non quadrat, nec fructus, quos iconi appofuit, ideoque merito explodenda eft figura. Prunum ftellatum BLIMBING. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 1. *cap.* 30. ubi *cap.* 31. Blimbingium teres etiam depingit & defcribit. ut & Blimbingium fylveftre, Blimbing Utan. in *lib.* 6. *cap.* 79. Blimbi *H. Malab. part.* 3. *Tab.* 45 & 46. Caranbola parva Indiae Orientalis. *Plukn. Mantiff. pag.* 36. Blimbi *Amman. H. Bofian. pag.* 6. & *Char. plant. pag.* 294. ubi haec habet: Eft Malus Indica, fructu penta- vel hexagono, floribus pentapetalis, racematim caudici vel ramis lignofis adhaerentibus, foliis pinnatis. BILLINGHAS & BILIN Zeylonenfibus in *Muf. Zeyl.* ubi dicitur, quod fructus gerat teretes, oblongosq́, carnofos, virides, fubftantia Cucumeribus non diffimiles, fapore grato, acido. Semina continet plana, rotunda, depreffa, ut fere *Cucumeris.* haec quoque eft Arbor BILLINGHBINGH dicta. *Grimm. Labor. Ceyl. pag.* 110. ubi fequenti modo defcribitur. Pulcherrima eft arbor; Fructus habet virides, angulatos & oblongos, qui fuccum acidum continent. Crefcit ab infima parte ftirpis usque ad apicem per omnes nodos & ramos modo mirabili, & jucundiffimo. Succus iftorum pulchrum nobis praebet Syrupum in morbis calidis, in febribus, in Hepatis, aut aliarum partium inflammationibus. Variis modis convenit in morbis biliofis, ex quo & per Baln. Mariae aqua valde refrigerans poteft deftillari. Flores, qui rubicundi, aut violacei funt coloris, contra morbos fupra dictos, immo adverfus alios plurimos affectus pulcherrimam fuppeditant Confervam.

Pag. 149. Tab. 68.



MALVINDA Ulmifolia, flosculis pusillis, muscosis constipatis. Nobis.

MALVINDA bicornis, Ballotes folio. *Dillen. H. Elth. pag.* 211. *Tab.* 171. *Fig.* 209. Alcea Zeylanica, foliis Althaeae, flore lutefcente, femine duplici arifta donato. *Herb. Hert.* Alcea Indica, molli, & hirfuto, feu lanuginofo folio, feminibus duplici, & nonnunquam triplici arifta donatis. *Muf. Zeyl. pag.* 2. Althaea Indica, Carpini foliis, flore luteo, feminibus duplici roftro donatis. *ibidem. pag.* 69. Althaea Maderasp. fubrotundo folio, molli & hirfuto, multipilis, five feminibus ad apicem crinitis. *Plukn. Phyt. Tab.* 131. *Fig.* 2. Katu-Uren *H. Malab. part.* 10. *Tab.* 54. quae eft Malva minor, erecta, Betonicae folio, flore luteo, femine duplici roftro, feu aculeo praedito. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 96.

KAPUAEPALA & KAESURUBAEWILA Zeylonenfibus. Planta, quam ex *Herb. Hart.* fervo, multo rotundiora habet folia, quam illa *H. Elth.* quae optime & accuratiffime juxta vivam depicta eft, & differunt forte per locum natalem varium. *Pluknetii* vero, quae ad ficcam eft infculpta, cum noftra, quae in Zeylona crevit, maxime convenit, unde & ejus Figuram non damus, nec etiam defcriptionem, quum in *H. Malab.* accurate fatis fit defcripta. *Tournefortius* has ad *Malvas* retinuit, vocaturque ab eo Malva Ulmifolia, femine cum gemino roftro. *in Inft. pag.* 69. quam jungit cum Alcea Virginiana, Carpini folio, flofculis minimis luteis, femine duplici roftro, feu aculeo praedito. *Morif. Hift. Oxon. part.* 2. *pag.* 518.

MALVINDA Ulmifolia, flofculis pufillis, mufcofis, conftipatis. *Nobis. Tab.* 68. Malva Ulmifolia, femine cum gemino roftro, floribus racemofis. *Tournef. inft. pag.* 96. Alcea Zeylanica, Carpini folio, flofculis fafciculatim congeftis. *H. L. Bat. pag.* 13. quam vide fupra ad *Alceam pag.* 10. Althaea folio viridi, flofculis parvis, mufcofis, racematim denfe ftipatis. *Muf. Zeyl. pag.* 31. Anoda Zeylanica, Althaeae fimilis, flore luteo. *Herb. Hertog.* Juxta cujus exemplar Figuram exhibuimus. huc & pertinet Abutilon fruticofum, foliis fubrotundis, ferratis, floribus albis, pentapetalis, ad alas foliorum conglomeratis. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 97.

Caule adfurgit haec planta lignofo, villofo, villis hifce abrafis, purpurafcente; folia gerens mollia, fubhirfuta, viridia, oblonga, in ambitu crenata, alterna, pediculis firmis, itidem lignofis, lanuginofisque innixa, ad quorum alas erigitur caulis tenuis, fimplex, longus,

 qui

qui flores gerit in medio & ad fummum collectos, arcte quafi conftipatos; ad florum autem nodos oritur femper folium, in medio caulis majus, in fummo minimum, maxime villofum. Nodus talis florifer conftat ex plurimis flofculis fibi mutuo arcte junctis, propriis tamen caliculis & pediculis infidentibus, inter quos villi albicantes inftar Mufci funt difperfi; flofculi autem funt monopetali, pentapetaloides, patentes, calice fimplici, quinquefido inftructi, fulvi aut lutei coloris. Ulteriorem hujus generis characterem vide apud *Linnaeum char. pl. gen. pag.* 205. ad SIDAM; qui novum hocce nomen huic generi impofuit.

Malvinda ftellata, Alnifolia. *Dillen. H. Elth. pag.* 215. *Tab.* 172. *Fig.* 211. ubi elegantem vide Figuram, & varia fynonyma fummo cum judicio collecta. Malva Indica, folio cordiformi. *Tournef. inft. pag.* 96. Alcea Zeylanica, folio latiore cordiformi. *H. L. Bat. pag.* 12. & *Ray. hift. pl. pag.* 1873. Malva Indica, frutefcens, folio cordato. *Par. Bat. Pr. pag.* 350. Althaea Indica, latiore folio, cordiformi, ad fummum finuato. *Plukn. Phyt. Tab.* 9. *Fig.* 2. &c.

Malvinda altiffima, Betonicae folio, floribus ad genicula gemellis. *Nobis. Tab.* 69. *Fig.* 1. Alcea Indica, alta, ramofa, foliis floribusque minimis. *Muf. Zeyl. pag.* 40. Althaea Indica, alta, ramofa, foliis floribusque pufillis. *Herb. Herm.* huc pertinet Althaea fpicata, Betonicae folio villofo, fpica breviore & laxa. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 97. & *Hift. Jam. vol.* 1. *pag.* 44. *Tab.* 14. *Fig.* 3.

Alta haec admodum & ramofa eft planta, caules habens obfcure purpurafcentes, glabros, rotundos, quibus folia adcrefcunt alterna, hirfuta, fubrotunda, ferrata, latiore bafi in acutum apicem definentia, Betonicae forma, e quorum alis, cum appendicibus binis foliaceis eriguntur bini, longi, pediculi hirfuti, quorum fuperior duobus tribusve foliolis ut plurimum ornatur, ad quorum fummum fuftinetur flofculus, calice magno, profunde diffecto contentus, pentapetalus, coloris lutei, tubo longo, & multis ftaminibus inftructus, flofculo deciduo, vafcula feminalia in calice reconduntur membranacea, continentia quinque femina convexa, angulofa, nigricantia.

Malvinda foliis inferioribus multifidis, fuperioribus incifis, flore folitario. *Nobis. Tab.* 69. *Fig.* 2. Alcea floribus rofeis, parvis, fructu lappaceo,



MALVINDA foliis inferioribus multifidis, superioribus incisis, flore solitario. Nobis.

MALVINDA altissima, Betonicae folio; floribus ad genicula gemellis. Nobis.



MANGHAS lactescens, foliis Nerii crassis, venosis, Jasmini flore, fructu Persicae simili venenato. Nobis.

MENTHA Zeylanica, pusilla, angustissimo folio dentato. Nobis.

paceo, quinquepartito, foliis profunde laciniatis. *Muf. Zeyl. pag.* 63. Althaea Zeylanica, erecta, foliis undulatis, flore purpureo, feminum capfula fpinis horrida. *Herb. Hert.* Alcea Indica, frutefcens; foliis in lacinias varie diffectis. *Plukn. Phyt. Tab.* 74. *Fig.* 1. KADHUPARA Zeylonenfibus.

Adfurgit elegans haec planta caule lignofo, rotundo, viridi, villis laeviter obfeffo, folia gerens alterna, mollia, lanuginofa, fuperiore parte viridia, inferiore incana, varie diffecta, Quercus folia in divi-fione aemulantia: quo magis ad inferiora tendunt, eo latiora, & ibi maxime laciniata, ad fuperiora fenfim anguftiora & laevibus laciniis tantum infculpta, in fuprema vero plantae parte funt minima. Ex alis autem foliorum erigitur pediculus brevis, cui infidet flos folita-rius, calice multifido, & varie diffecto (qui in *Pluknetii Figura* fine flore expreffus confpicitur) contentus, monopetalus, pentapetaloi-des, profunde, & ad unguem usque diffectus, e cujus medio erigitur ftylus craffus, in medio circiter fuo ftaminibus plurimis tefticulos feu apices habentibus ornatus, qui ftylus feu tubus eft placenta, cui in orbem accrefcunt filiculae quinae, triangulares, fpinulis obfeffae, & horridae, intus vero glaberrimae, quae fingulae continent femen al-bicans, triangulare, lata bafi in conum acutum affurgens. ad URAE-NAM *Dillenii* haec proxime accedit & pertinet, cujus & aliam fpe-ciem vide fupra citatam ad ALCEAM *pag.* 9. huic proxime convenien-tem. Character autem hujus generis apud mox citatum auctorem inve-nitur in *Hort. Elth. pag.* 430. & *Linnaeum in char. gen. pl. pag.* 204.

MALWAETHAKEGYA *Muf. Zeyl. pag.* 69. dicitur a *Mal* quod fru-ctus notat & *Waetha* quod cujuscunque generis lignum notat, ad fepes conficiendas idoneum: additur autem vox *Mal* quod & alia hujus ar-boris fpecies inveniatur, nullos producens fructus, ut notatur in *Muf. Zeyl. loco citato.*

MANGHAS lactefcens, foliis Nerii craffis, venofis, Jasmini flore, fructu Perficae fimili, venenato. *Nobis. Tab.* 70. *Fig.* 1. Manghas fyl-veftris, lactefcens, fructu venenato. *Muf. Zeyl. pag.* 49. Arbor exi-tiofa, lactefcens, fructu Aurantii colore, bipartito, flore Jasmini albo, *Manghas* fylveftris. *Muf. Zeyl. pag.* 32. Manghas fylveftris, pudendis vaccarum fimilis. *ibidem. pag.* 68. Manghas fylveftris, lactefcens, ve-nenata, Jasmini flore & odore. *Par. Bat. Pr. pag.* 351. *Plukn. Al-*

mag.

mag. pag. 241. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 43. Manghas bravas Lufitanis & *Acoftae pag.* 241. Manghas fructu venenato *C. B. P. pag.* 440. Mangha fructu venenato, officulo cordiformi; nucleo gemino. *Ray. hift. pag.* 1552. quae eft arbor lactaria, Manga Brava. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 3. *cap.* 38. fed ubi fructus duo fibi invicem oppofiti Olivaeformes depicti funt; unde & forte diverfae funt fpecies.

Noftra porro convenit cum Odallam *H. Malab. part.* 1. *Tab.* 39. quae in *notis pag.* 72. vocatur Perficae fimilis, anguftifolia, offe cordis humani figura, binos nucleos continente. Tavaracare Malab. flore albo, folio Nerii latiore. *Petiv. Gazoph. nat. & art. Tab.* 16. *Fig.* 4. quae & eft Mangoe arbor *Joh. Freyeri itin. per Indiam Orient. edit. Belg. pag.* 180. ubi & ejus Figurae inveniuntur. GHONKADURU Zeylonenfibus. hoc eft boum venenum. *Ghona* enim vacca. *Kaduru* venenum eft: Fructus quoque referunt quodammodo pudenda vaccarum, ut notatur in *Muf. Zeyl. pag.* 49.

Arbor haec in varios ramos divifa, folia gerit Nerii lanceolata, utrinque obtufa, margine integro, craffa, cofta in latere inferiore erecta, elevata cum venulis fimplicibus, pinnatim ad angulum rectum exeuntibus. Folia fupra funt laevia, & transverfaliter fecundum venas fulcata. Ex divifuris caulis prodit laevis racemus, continens flores erectos, quorum calix eft quinquefidus, petalum unicum, infundibiliforme, exacte Jasmini quinquefidum, ftamina quinque: deciduo flore fuccedit fructus magnus, rotundus, a latere fulcatus, continens femina duo, offea, ovata: adeoque maxime cum *Jasmino* convenit, exceptis ftaminibus. Lacte turgens eft tota planta & cauftica, quo cum *Apocynis*, ut & cum flore quadrat; fi autem illud lac legitime fit praeparatum, purgat ἄνω & κάτω, unde in Hydropicis faepe fummi ufus poteft effe. Per communicationem *Joh. Fred. Gronovii* hanc plantam infculpendam curavimus.

MANGHAS marina, fylveftris, fructu venenato MUDUKADHURU Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 59 & 66. an Mangha fylveftris, Indiae Orientalis. *Plukn. Phyt. Tab.* 203. *Fig.* 7? & *Almag. pag.* 241. &c. MUDUKADHURU vocatur. a *Mudu* quod mare, & *Kadhuru* quod venenum denotat.

MANGIFERA arbor. *Muf. Zeyl. pag.* 59 & 66. Arbor Mangifera *Bontii lib.* 6. *cap.* 5. *pag.* 95. Mao feu Mau, vel Manghas. *H. Malab. part.*



Fig. 2.

MOLLUGO Zeylanica, sylvestris, angustifolia, flore albo. Herb. Hart.

Fig. 1.

MARRUBIUM odoratissimum, Betonicae folio. Nobis.

part. 4. *Tab.* 1 & 2. Manga Indica, fructu magno reniformi. *Ray. hift. pl. pag.* 1550. ubi reliqua vide fynonyma & in *Commel. Fl. Malab. pag.* 43. & infra ad *Perficam.* Mangas ab *Acofta* quoque defcribitur. edit *Ital. pag.* 240. & apud *Cluf. cap.* 43. & a *Cluf. in exot. lib.* 2. *cap.* 9. *Rumphius in herbar. Ambon. lib.* 1. *cap.* 21. habet Mangam domefticam, ubi & quinque alias defcribit & depingit fpecies, & *cap.* 38. delineat *Mangaftomam.* noftra AMWAGHAHA Zeylonenfibus dicitur.

MARRUBIUM odoratiffimum, Betonicae folio. *Nobis. Tab.* 71. *Fig.* 1. Marrubium Zeylanicum, odoratum, Nepethae facie, folio Lamii Pannonici. *Muf. Zeyl. pag.* 30. Planta fpicata, hirfuta, Menthae tuberofae facie. *ibidem. pag.* 25. Marrubium Zeylanicum, odoratum. *Herb. Herm.* Stachys Zeylanica, major, Betonicae folio, flore purpurafcente. *Herb. Hart.* Stachys Indica, procerior, Betonicae folio, noftras. *Plukn. Almag. pag.* 357. & *Ray. hift. pag.* 1872. ubi vide reliqua. Marrubium JACKWANASSA Zeylonenfibus. *Grimm. Labor. Ceyl. pag.* 129. ubi haec habet: Odore atque fapore caetera nobis cognita fuperat. Oleum fubtile, fimul & aquam nobis exhibet, quae praeftantiffima funt in morbis matricis ex obftructionibus contingentibus. Ex eodem Syrupum extrahimus ad eosdem affectus, & ad morbos ftomachicos. in *Muf. Zeyl. pag.* 30. De origine vocis JAKWANASSA dicitur, quod derivetur a *Jak* quod daemonem fignificat; Cinghali enim hujus plantae fumo daemonem poffe expelli fuperftitiofe contendunt. *Wanaffa* fumum feu fuffimigium notat.

Caulis hujus plantae eft rectus, altus, quadragonus; folia oppofita, petiolis biuncialibus, vel longioribus infidentia, cordato-oblonga, per marginem profunde crenata, inferiora majora, fuperiora parva, & fere feffilia, mollia, inferne maxime incana. Verfus fummitatem caulis flores plurimi caulem amplectuntur, verticillos parum remotos conftituunt, fingulo verticillo ad bafin foliorum pari feffili inftructo: ex alis inferiorum foliorum prodeunt fecundum aetatem ramuli, ramo fimplici primo fimiles, fed minores, tota planta pubefcit. Florum calix eft tubulatus, oblongus, femiquinquefidus, rigidus, perfiftens, femina condens quatuor, parva, glabra, reniformia, depreffa, nitida.

MATRICARIA flore pleno, magno. *Muf. Zeyl. pag.* 33. Matricaria Zeylanica, hortenfis, flore pleno, D. SCHERARD apud *Ray. tom.* 3.

pag. 224. Matricaria Maderasp. flore pleno, flavefcente. *Petiv. Muf. no.* 786. Matricaria Indica, latiore folio, flore pleno. *Bobart. hift. Oxon. tom.* 3. *pag.* 33. Tsjetti-Pu *H. Malab. part.* 10. *Tab.* 44. Matricaria Sinenfis, Serrine. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 8. *cap.* 53. ubi cum Tsjetti-Pu. *H. Malab.* jungitur. quae a *Commel. in not.* Matricaria Indica, latiore folio, flore pleno vocatur. Vide & ejus *Fl. Malab. pag.* 44.

MEDICAGO Zeylanica, trifolia, arborefcens, flore albo. *Herb. Hart.* quae convenit cum *Hedyfaro* fuperius *Tab.* 51. a *nobis* exhibito.

MELASTOMA fcabra, trinervia. *Nobis. Tab.* 72. Ciftus Indicus, trinervius, anguftifolius, flore rofeo, feminibus pulpa nigra inclufis. *Muf. Zeyl. pag.* 36. Ciftus Zeylanicus, Laurinis foliis, flore purpureo. *Herb. Hart.*

Caulis hujus fruticis eft durus & fcaber, tetragonus, cinereus, fimiles minores, binos oppofitos emittens ramulos, ad quorum ortum bina folia oblonga, majora, quam in minoribus ramis, proveniunt, quae funt dura, fcabra, trinervia, fuperius obfcure virentia, inferius pallidiora, brevibus innixa pediculis. In fummo ramorum flores fuftinentur, qui in medio caulis folitarius erigitur, in lateralibus quatuor, quinque vel plures proveniunt. Flores hi funt ampli, rofacei, pentapetali, purpurei, ftaminibus decem, magnis, nigricantibus, recurvis, & piftillo tenui, erecto conftantes, calice magno, fcabro & hirfuto, femiquinquefido contenti. Poft quos fructus fequuntur rotundi, glabri, in quinque loculamenta divifi, pulpa nigra referti, in qua femina plurima, minima, fubrotunda collocantur. Generis hujus novi character exacte recenfetur a *Linnaeo in char. pl. gen. pag.* 127.

MELASTOMA quinquenervia, minor, capitulis villofis. *Nobis.* Ciftus Indicus, quinquenervius, capitulis villofis, pulpa nigra refertis, minor. *Muf. Zeyl. pag.* 14. Ciftus Indicus, quinquenervius, folio fcabro, & hirfuto, flore rubro, capitulis fericeis, villofis, pulpa nigra refertis, minor, Katou-Kadel *H. Malab. Amm. Char. pl. pag.* 439. Katou-Kadali *H. Malab. part.* 4. *Tab.* 43. Baccifera Indica, fructu umbilicato, quinque-capfulari, polyfpermo, floribus minoribus, fructus cortice afpero. *Ray. hift. pl. pag.* 1493. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 12. qui cum Cifto Indico majore, MAHABOTHYA dicto, hanc conjungit. ubi vide reliqua. huc fpectat Groffulariae fructu, non fpinofa Malabathri



MELASTOMA scabra trinervia Nobis.



MELASTOMA *quinquenervia, hirta, major capitulis ſericeis, villoſis* Nobis.

thri foliis, fubtus niveis, fructu racemofo in Umbellae modum difpo-fito. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 165. & *Hift. vol.* 2. *Tab.* 198. *Fig.* 1. ubi & alias habet fpecies. HINBOTHYA Zeylonenfibus noftra vocatur. id eft *Bowithya* parvum. *Bowithya* autem dicitur illud, quod apertum eft, fructus enim maturi dehifcunt, quorum pulpa ufurpatur ad Linguae vitia, quando fcilicet dehifcit, inflammatur, & quafi de-corticatur; ut notatur in *Muf. Zeyl.*

MELASTOMA quinquenervia, hirta, major, capitulis fericeis, villofis. *Nobis. Tab.* 73. Ciftus Indicus, quinquenervius, capitulis fericeis, pulpa nigra refertis, major. *Muf. Zeyl. pag.* 10. Ciftus Indicus, quinquenervius, folio hirto, ac fcabro, floribus rofeis amplis, capitulis fericeis, villofis, pulpa nigra refertis, major. *Herb. Herm.* & *Commel. Fl. Malab. pag.* 20. ut & in notis ad *H. Malab. part.* 4. *pag.* 91. ubi pro Katou-Kadali *Tab.* 43. expreffa habetur; fed quanquam noftra planta eadem fit illi, quae ibi in notis juxta *Herb. Hermanni* citetur, cum Kadali tamen *H. Malab. part.* 4. *Tab.* 42. magis convenit, ut plantarum comparatio cum Figuris abunde docet, pro quo etiam a *Petiv.* habetur, & vocatur Kadali Madraspatana, pentaneuros, foliis eleganter hirtis, in *Herbar. fuo*, cujus exemplar fervo ab ipfo collectum, & hoc nomine ejus manu adfcriptum, quod in omnibus plantae *Herbar. Hermanni* convenit. quae porro vocatur Ciftus Indicus, quinquenervius, folio fcabro, flore rubro, capitulis fericeis, pulpa nigra refertis, latifolius, five major, Kadali *H. Malab. Amm. Char. pl. pag.* 437. & Baccifera Indica, fructu umbilicato, quinque-capfulari, polyfpermo. *Ray. hift. pag.* 1493. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 12. Ciftus Chamaerhodendros, feu Ledum Orientale pentaneuros, foliis brevioribus, ferruginea & molli lanugine villofis. &c. *Plukn. Almag. pag.* 106. & in *Mantiff. pag.* 49. vocatur Ciftus pulpifer Indicus *Hermanni*. quae in *Phytogr. Tab.* 161. *Fig.* 2. exprimitur, ubi heptaneuros &c. dicitur. & eft Datura Indica, foliis Malabathri. *Breyn. Cent. pag.* 119. ac Stramonia, feu Datura Ciftoides, frutefcens, hirfuta, major, Indica. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 97. cum qua convenit Groffulariae fructu non fpinofa, Malabathri foliis, longa & ruffa lanugine hirfutis, fructu majore coeruleo. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 165. & *Hift. Jam. vol.* 2. *Tab.* 197. *Fig.* 2. BOTHYA, & MAHABOTHYA, feu majus Zeylonenfibus dicitur; & *Bocca preto* Lufitanis, hoc eft os nigrum, quia

V 2 pueri

pueri comedendo hujus pulpam os denigrant. unde & nomen huic generi indimus MELASTOMA, id eſt μέλας nigrum & ςόμα os. quum peculiaris, & novi ſint generis hae plantae.

Frutex hic gerit caules quadrangulares ruffeſcentes, tuberculis ruffis undique obſeſſos, ut in Ficoide caule glaciato, licet hic ſplendeat, fere obtinet. E caule hoc rami varii proveniunt majoribus ramis ſimillimi, bini ſemper oppoſiti, ſenſim ad ſummum minores, qui folia gerunt ſemper bina oppoſita, oblonga, tribus majoribus nervis in medio, binis minoribus in ambitu donata, qui ſaepe per ſcabritiem, & hirſutiem elegantiſſimam in ſuprema folii parte non apparent, ubi illud etiam obſcure viret, & ſetis ſeu pilis recurvis certo & eleganti quaſi ordine diſpoſitis hirſutum eſt; ab inferiore ejus parte pallide viret & ſcabrum eſt, ſetis caeterum deſtitutum, unde & quinque illi nervi pulchre ibi conſpici poſſunt. Flores porro in ſummitate ramorum proveniunt elegántes roſacei, ampli, pentapetali, purpurei, calicibus magnis, hirtis & ſcabris ſemiquinquefidis contenti, ſtamina habentes decem, magna, recurva, nigricantia, & piſtillum unicum, erectum; poſt quos capitula ſericea, villoſa, qui fructus ſunt rotundi, quinquefidi, pulpa nigra & ſeminibus plurimis referti, ſequuntur. Ulteriorem accuratam deſcriptionem vide in *H. Malab. part.* 4. *pag.* 87. quae accuratior eſt & plantae noſtrae magis convenit, quam Figura ibi expreſſa, quae glaberrima ibi depicta eſt, quum tota ſit ſcabra, & hirſuta, quod vitium ſaepius in *H. Malab.* obſervavi.

An MELO ſeu PEPO Zeylanicus, KEKIRYA Zeylonenſibus. *Muſ. Zeyl. pag.* 69? qui forte Melo Indicus *Cluſii lib.* 2. *exot. cap.* 20.

MELOCHIA Corchori folio. *Dillen. H. Elth. pag.* 221. *Tab.* 176. *Fig.* 217. Ketmia lucida, Melochiae folio. *Joh. Phil. Breyn. ibidem.* & Alcea Zeylanica, flore rubello. *ibidem.* Alcea Indica, minor, floſculis luteis, parvis, faſciculatis, Melochiae folio, HINGHALKURA Zeylonenſibus. *Muſ. Zeyl. pag.* 43. &c.

Melochia Indica, major, floſculis luteis, parvis, faſciculatis. *Nobis.* Althaea Indica, major, Melochiae folio, floſculis luteis, parvis, faſciculatis. MAHAGHALKURA Zeylonenſibus. *Muſ. Zeyl. pag.* 42. Althaea forte Maderasp. Melochiae foliis, floribus ex alis foliorum, pediculo curto. *Plukn. Phyt. Tab.* 240. *Fig.* 5. GHALKURA & MAHA-

HAGHALKURA dicitur a *Maha* quod majorem & *Ghal* quod petram notat. hujus generis characterem habet *Linnaeus in char. pl. gen. pag.* 203.

MELILOTUS Indica, hortenfis, fativa, floribus odoratis, albis. *Muf. Zeyl. pag.* 64. Melilotus Indica, humilis erecta, floribus exiguis, odoratis, albis, pericarpiis majoribus, fpicatim denfius ftipatis. *Plukn. Phyt. Tab.* 45. *Fig.* 5. Melilotus Indiae Orientalis *Parkins.* apud *Ray. hift. pl. pag.* 953. Swendadi-Pullu *H. Malab. part.* 9. *Tab.* 40. ubi a *Commel. in notis.* Meliloto vulgari flore albo accedens, fi non eadem, vocatur. vide & *Fl. Malab. pag.* 44.

MELONGENA fructu oblongo. *Tournef. inft. pag.* 151. Solanum pomiferum, fructu oblongo. *C. B. P. pag.* 167. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 63. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 108. & *Hift. vol.* 1. *pag.* 237. Solani fpecies Fockii Fockii dicta. *Bontii lib.* 6. *cap.* 35. *pag.* 123. & *Muf. Zeyl. pag.* 37. Mala infana haec a *Dodon in pempt. pag.* 458. vocantur. & Melanzana in *H. Eyft. aut. Ord.* 1. *Fig.* 1. *Fol.* 3. Nila Barudena *H. Malab. part.* 10. *Tab.* 74. ubi vide notas. & Trongum hortenfe. Trong. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 8. *cap* 46.

MENTHA Zeylanica, camphorata, hirfuta; rectius forfan Polium Zeyl. hirfutum, quadrifolium, camphoratum. *Muf. Zeyl. pag.* 1. Mentha Zeylanica, camphorata, triphylla, & tetraphylla, GHONA-COLLA Zeylonenfibus D. *Herman* apud *Ray. hift. pl. part.* 3. *pag.* 284. Mentha Zeylanica, camphorata, fere trifoliata *Petiv. hort. ficc.* apud *Ray. lib.* 3. *append. pag.* 246. *no.* 22. Mentha Zeylanica, aquatica, hirfuta, ramofa, odore gravi. *Muf. Zeyl. pag.* 57. Mentha GHONAKOLLA dicta. *Grimm. Labor. Ceyl. pag.* 129. qui dicit: Subtilem atque Camphoreum poffidet odorem, pariterque clariffimum eft medicamentum pro Stomacho, Capite, Matrice. Subtile & jucundum nobis praebet Oleum per deftill. immo & aquam iisdem ufibus infervientem. GHONAKOLA autem dicitur a *Ghona* quod cervum, & *Kola* quod folium notat. his enim cervi dicuntur vefci: ut notatur in *Muf. Zeyl.* Sequenti modo apud *Ray.* defcribitur: Caule exfurgit firmo, quadrato, ramofo, foliis ad intervalla binis, non raro etiam ternis vel quaternis cincto; anguftis, oblongis, acutis circa marginem argute denticulatis. Flores fpicatim coagmentati in fummis caulibus & ramulis, fpicis Dipfaci aut Betonicae capitibus figura fimilibus,

sed multo minoribus; unde proxime nostrae expressae plantae convenit, quae apud *Ray.* angustissimo dentato folio denominatur.

MENTHA Zeylanica, Conyzoides, odorata. *Mus. Zeyl. pag.* 51. an Mentha crispa, Cheriro Sulassi Kitsyl, *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 8. *cap.* 58?

MENTHA Indica, repens, hortensis, crassa, acris, odore ac sapore fragrantissimo. KAPARAWALLI Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag.* 62.

MENTHA Zeylanica, aquatica, inodora, latifolia; *Mus. Zeyl. pag.* 35. Planta Zeylanica Menthae aquaticae in insula Zeylon nascentis, ut videtur, species. *Ray. tom.* 3. *Dendr. pag.* 134. ubi additur: In surditate singulare & specificum remedium esse perhibetur, multis experimentis comprobatum.

MENTHA Zeylanica, spicata, pusilla, angustissimo folio, dentato. *Nobis. Tab.* 70. *Fig.* 2. Mentha Zeylanica, angustissimo folio, dentato. D. *Hermans* apud *Ray. tom.* 3. *pag.* 284. Veronica Zeylanica, minima, flore rubello. *Herb. Hart.*

Vera haec Menthae est species; Cujus calix est minimus, subrotundus, ore quinquedentato, duobus dentibus latioribus: Flores ac semina ut reliquae menthae, perficiens. E radice tenui, lignosa, brevissima oritur caulis brevis, qui ramos laterales se ipso longiores undique spargit, triunciales, singulus caulis terminatur spica verticillatim divisa, constans floribus minutissimis, rubellis, folia ad caules sunt opposita, oblonga, hirsuta, serrata, seu denticulata, quae nunc bina, nunc quatuor simul ex eodem centro proveniunt.

Generis hujus character invenitur apud *Linnaeum in char. plant. gen. pag.* 172.

METHONICA gloriosa, foliis capreolatis, floribus fimbriatis, reflexis. *Nobis.* Methonica Malabarorum. *H. L. B. App. pag.* 688. ubi icon & descr. Lilium superbum *Methonica* Malabar. *Mus. Zeyl. pag.* 28. *Ray. hist. pl. pag.* 1915. Lilium Zeylanicum superbum *H. Amst. part.* 1. *pag.* 69. *Plukn. Phyt. Tab.* 116. *Fig.* 3. Lilium Zeylanicum superbum, radice tuberosa, florum petalis coccineis, fimbriatim reflexis. NYAGHALA Zingalensibus. *Amm. H. Bos. pag.* 19. vide & *Amm. Char. pl. pag.* 521. ad Paeoniam. Paeonia Zeylanica, superba, florum petalis



MICROCOCOS *foliis alternis, oblongis, acuminatis. Nobis.*

talis fimbriatis, fulgenti cocco fplendentibus; foliis capreolatis. *Muf. Zeyl. pag.* 34. Paeonia Zeylanica, capreolata, fuperba, floribus ful-genti cocco fplendentibus, fimbriatis. *Herb. Herm.* ubi additur: Lu-fitani inter Lilia volunt referri, fed perperam; femina enim cum Paeo-nia conveniunt tum forma, tum & virtute. Mendoni *H. Malab. part.* 7. *Tab.* 57. Methonica Malabarorum, Nienghala Zeylonenfium, Li-lium Zeylanicum fuperbum vulgo Hermanni. *Ray. hift. pl. pag.* 1915. *Plukn. Almag. pag.* 249. *Petiv. act. Phil. Lond. vol.* 22. *no.* 271. *pl.* 155. Lilium Zeylanicum, feminibus ad Paeoniam accedentibus. *Plukn. Mantiff. pag.* 130. ubi dicitur: Male ad Paeonias refertur, nam non eft multifiliqua, fed tricapfularis, hexapetalos; & quod apud Malab. radix pro antidoto habeatur: quum ab aliis pro fummo, atro-ciffimo veneno habeatur. NAJAJALA, NYAGHALA & NIEN-GHALA Zeylonenfibus. Notam hujus character. dederunt *Dillen. in nov. pl. gen. pag.* 158. & *Linnaeus in char. pl. gen. pag.* 93. ad GLO-RIOSAM.

MICROCOS foliis alternis, oblongis, acuminatis. *Nobis. Tab.* 74. KOKUKIRILLA *Herb. Herman.* & *Muf. Zeyl. pag.* 10. communiter dicitur *Kocurille de Kleine Cocos* Belgis *ibidem.* Confer cum hac Fi-guram *Pluknet. Tab.* 262. *Fig.* 3. quae huic eadem videtur. An Catu-tekka hujus fpecies; quae invenitur in *H. Malab. part.* 4. *Tab.* 28. Sed quae foliis eft oppofitis, fructu minimo.

Gaudet haec arbufcula foliis oblongis, acuminatis, in acutum apicem definentibus, glabris, venofis, obfcure virentibus, alternatim cauli breviffimis pediculis adfixis, ad quorum infertionem fquamma una, alterave inftar gemmae apparet; caulis fcaber eft rotundus, nigricans, in fummo flores producens plurimos in thyrfum collectos, qui con-ftant calice communi, feptifolio, duos vel tres continente flores, quorum petala funt quinque, oblonga, decidua, ftamina plurima, capillacea, apicibus fubrotundis. Piftillum unicum, fimplex habentes, quod abit in fructum fubrotundum, COCUM *Hermanno* vocatum, qui in exemplari noftro defideratur.

MILIUM Indicum femine fufco, juba larga. *Muf Zeyl. pag.* 44. Mi-lium Indicum, arundinaceo caule, femine fufco, glumis fplendenti-bus, atris. *Plukn. Almag. pag.* 250. Milium Indicum, arundinaceo caule, granis flavefcentibus. *H. L. Bat. pag.* 425. & *Sloan. Cat. pl.*

Jam.

Jam. pag. 25. ubi plurima vide ſynonyma, & *Hiſt. Jam. vol.* 1. *pag.* 104. KAURINGHU Zeylonenſibus.

Milium Zeylanicum, fuſcum, parvum, MUNAMU Zeylonenſibus. *Muſ. Zeyl. pag.* 45.

Milium Zeylanicum, minimum, GHAETANA Zeylonenſibus. *Muſ. Zeyl. pag.* 45.

Milium gramineum, minimum, BADHAMU Zeylonenſibus. *Muſ. Zeyl. pag.* 45.

Milium Zeylanicum minus, MENERI Zeylonenſibus. *Muſ. Zeyl. pag.* 66. hujus generis characterem vide apud *Linnaeum in Char. pl. gen. pag.* 17.

Mimosa herba Zeylanica, aquatica, ſiliquis compreſſis, articulatis, hiſpidis, atris, an Anonymos *Garziae* & Æſchynomene *Apollodori*? *Muſ. Zeyl. pag.* 18. Herba mimoſa, Zeylanica, ſiliquis compreſſis, hiſpidis, articulatis, major, Æſchynomene *Theophraſti. ibidem. pag.* 41. Æſchynomenes apud *Theophr.* occurrit *lib.* 4. *cap.* 3. vide & *Cluſ. in exot. pag.* 293. ad ANONYMUM. MAHADYAHYAMBALA, & MAHA-PINAWAKA Zeylonenſibus, id eſt magna *Pinawaka.* vide ſupra ad *Hedyſarum pag.* 119.

Mimosa herba, Zeylanica, ſiliquis compreſſis, hiſpidis, articulatis, minor. *Muſ. Zeyl. pag.* 40 Æſchynomene mitis, ſecunda, vel potius herba caſta, Zeylanica, ſiliquis latis, compreſſis, minoribus. *Breyn. Cent. pag.* 47. *Ray. hiſt. pag.* 981. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 2. Mimoſa Orientalis, non ſpinoſa, rarioribus ramis, floribus ſpicatis? *Plukn. Phyt. Tab.* 307. *Fig.* 4. Niti-Todda-Vaddi. *H. Malab. Part.* 9. *Tab.* 20. HINDYAHYABALA Zeylonenſibus, quod pronunciatur *Hidyahaembala.*

Mimosa herba, Zeylanica, foliis & ſiliquis anguſtis, glabris. *Muſ. Zeyl. pag.* 18. Herba viva Zeylanica, ſiliquis longis, anguſtis, glabris; quae DYAHYABALAE ſpecies *ibidem. pag.* 48.

Mimosa herba Zeylanica, ſiliquis anguſtis, glabris media. *Muſ. Zeyl. pag.* 66. huc ſpectat Mimoſa Americana, pigra, ſiliquis longis anguſtis,

fti , Allium olentibus. *Plukn. Almag. pag.* 252. & *Phyt. Tab.* 307. *Fig.* 3. an potius *Hedyfari* habendae funt fpecies?

Mimosa Zeylanica, filiculis articulatis, tenerrimis, glabris, femine minimo. *Boerh. ind. H. L. B. part.* 2. *pag.* 55.

Mimosa humilis, quadripennis, glabra, procumbens, guttis fanguineis maculata, ex infula Zeylon. *Plukn. Mantiff. pag.* 131.

Mimosa pumila, Zeylonenfis, erecta, multifolia, pinnulis fingulis macula purpurea utrinque notatis. *Plukn. ibidem.*

MOLLUGO Zeylanica, fylveftris, anguftifolia, flore albo. *Herb. Hart.* quae exprimitur *Tab. noftra* 71. *Fig.* 2.
Planta eft pedalis altitudinis, e radice albicante, fibrofa adfurgens caule brevi, glabro, viridi, qui ftatim in minores majori fimiles dividitur; ad ramorum autem divifiones, folia majora fex numero in orbem, feu ftellam pofita collocantur; quae funt viridia, glabra, longa, acuta, Mollugini vulgari fimilia, ex alis illorum foliorum ramuli minores, ad caulem quatuor gerentes folia, proveniunt, qui in eorum fummo fuftinent flores albicantes, tenuiffimis & longiffimis petiolis infidentes, forma *Molluginis* vulgaris.

MOMORDICA Zeylanica, pampinea fronde, fructu longiore. *Tournef. inft. pag.* 103. Momordica Zeylanica, major. *Par. Bat. App. pag.* 10. Cucumis Indicus, puniceus, major. *Par. Bat. Pr. pag.* 329. *Muf. Zeyl. pag.* 67. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 103. Cucumis puniceus, Zeylanicus, *Margofa* Lufitanis. *H. L. Bat. pag.* 204. Pandi-Pavel. *H. Malab. part.* 8. *Tab.* 9. ubi in notis vocatur Cucumis puniceus Indicus, fructu majore, ex flavo rubente. Balfamina Cucumerina, Indica, fructu majore flavefcente. *H. Amft. part.* 1. *Fig.* 54. & *Fl. Malab. pag.* 13. Momordica, five Charantia Indiae Orientalis, fructu aurantio, majore, oblongo, feminibus albis. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 73. qui Cucumis Zeylanicus, major, feminibus albis *H. L. Bat. App. pag.* 663. Momordica Zeylanica, fructu pyriformi, majore, ex flavo rubente, feminibus albis. *H. Beaum. pag.* 30. & *Amm. Char. pl. pag.* 469. Amara Indica, Papari *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 9. *cap.* 46. TUBUKARU-WILA Zeylonenfibus. Licet fructus hujus plantae faepe varient co-

X lore

lore flavo & rubente, pro eadem tamen habenda eſt ſpecie, cum qua & convenit

MOMORDICA Indica, amara, fructu tuberoſo, pyriformi, rubente, *Maragoſa* Luſitanis, KARABILA Zeylonenſibus. *Muſ. Zeyl. pag.* 39.

MOMORDICA Indica, amara, fructu tuberoſo, rubente, pyriformi, folio Vitis KATUKARAWILA Zeylonenſibus. *Muſ. Zeyl. pag.* 44.

MOMORDICA fructu rubente, pyriformi, TUBAKWILA Zeylonenſibus. *Muſ. Zeyl. pag.* 67.
Proxime hae ſpecies inter ſeſe conveniunt, ni forte eaedem; quum vero *Hermannus* eas ſeparavit, omnesque ſingulari ſeu proprio nomine Zeylanico occurrunt, conjungere illas non audebam, praeſertim quum in *H. Malab.* undecim hujus generis proponantur ſpecies, cum quibus quaedam harum conveniunt, & pro iisdem habendae ſunt: ſi quis vero illas velit conjungere, & tanquam varietates tantum habere, per me licet.

MOMORDICA Zeylanica, pampinea, fronde, fructu breviore, minore. *Tournef. inſt. pag.* 103. Cucumis puniceus, Indicus, minor. *Par. Bat. Pr. pag.* 329. Cucumis Zeylanicus, minor, feminibus nigris. *H. L. Bat. App. pag.* 664. quae a *Commel. in Fl. Malab. pag.* 14. jungitur cum Balſamina cucumerina, punicea, Zeylanica majore. *Commel. Cat. H. Amſt. pag.* 47. & eſt Pavel *H. Malab. part.* 8. *Tab.* 10. ubi in notis vocatur Cucumis Malabaricus, fructu ex flavo rubente.

MOMORDICA DAMELLA Zeylonenſibus. *Muſ. Zeyl. pag.* 52. forte eſt Momordica vulgaris *Tournefortii.*

MOMORDICA flore fiſtuloſo, radiato, albo, Hederae folio, Malabarica. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 74. quae eſt planta Zeylanica ſcandens, Hederaceis foliis, *Breyn. in Ephemer. Curioſ. ann.* 4*ti* & 5*ti pag.* 136. ubi elegans figura & ejus deſcriptio. huc ſpectat Balſamina Cucumerina, fructu viridi, ſtriis albis, *Commel.* in notis ad *H. Malab part.* 8. *Fig.* 33. quae Tota-Piri *ibidem* vocatur, & *Tab.* 17. eleganter exprimitur.

MORINGA Zeylanica, foliorum pinnis pinnatis, flore majore, fructu angu-



MORINGA *Zeylanica, foliorum pinnis pinnatis, flore majore, fructu anguloso. Nobis.*

angulofo. *Nobis. Tab.* 75. Moringa Lentifci folio, fructu magno, angulofo. *Herb. Hart.* quo nomine & a *Joh. Bauhino part.* 1. *lib.* 12. *pag.* 435. vocatur, fed cujus figura a noftra multum differt. quae Moringa ab *Acofta* vocatur *edit. Ital. pag.* 262. & apud *Cluf. pag.* 218. & *lib. aromat. cap.* 35. *Muf. Zeyl. pag.* 37. & *Dalechamp pag.* 1685. & *Ferrar. Fl. Cult. lib.* 3. *cap.* 21. *pag.* 385. quae convenit cum Murungu *H. Malab. part.* 6. *Tab.* 11. ubi vide notas. Balanus Myrepfica, filiqua trangulari, femine minore alato. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 22. qui notas ejus habet characterifticas. MORINGEROS *Chr. Acoftae*, quae arbor filiquofa, floribus papilionaceis, (pro decapetalis) albis, amplis, filiquis anguftis, longis, triangulis, feminibus itidem trigonis, figura, magnitudine, & forma, quodammodo etiam colore proxime ad Balanum Myrepf. accedentibus, inclufis, pulpa albicante fungofa. *Amm. H. Bofian. pag.* 21. & *Char. pl. pag.* 478 & 490. Nux Been Zeylanica, filiqua triangula, feminibus alatis, *Moringeros* Lufitanis, & KATU MURUNGHA Zeylonenfium. *H. L. Bat. App. pag.* 692. & *Par. Bat. Pr. pag.* 357. Moringho floribus amplis, magnis. *Muf. Zeyl. pag.* 62. hujus reliqua fynonyma inveniuntur apud *Plukn. in Almag. pag.* 253. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 13. Morunga foemina, Kella Parampolam a *Rumph. in Herb. Ambon. lib.* 1. *cap.* 63. vocatur, quae huic penitus convenit, cujus flores polypetali cum multis ftaminibus funt depicti, & foliorum rachis communiter ex feptem vel pluribus conftat foliis. KATU-MURUNGHA & WATTU MURUNGU, id eft *Murungu* hortenfe Zeylonenfibus haec dicitur; ut conftat ex *H. L. Bat. pag.* 170. Quum hujus flores nec foliorum forma in datis jam figuris clare & diftincte exprimantur, accuratiorem iconem infculpi curavimus juxta noftrum, quod fervamus, exemplar. Cujus calix mihi apparuit quinquefolius, coloratus, deciduus, foliis conftans oblongis, obtufis, aequalibus. Petala floris quinque, magnitudine, & forma calicis inferius & ad unum latus magis dehifcentia, alias aequalia; unde ab auctoribus hujus flos decapetalus habetur.

Stamina funt decem, quorum quinque inferiora longiora, furfum incurva. Piftillum unicum, inferius Embryonem oblongum habens: Pericarpium vero eft capfula filiquofa, teres, longiffima, trivalvis; femina funt trigona, membraná alatá donata, plurima juxta longitudinem filiquae difpofita. Flores in racemis ex caule egreffis fparfim proveniunt. Folia hujus plantae funt pinnata, rachis longa; Pinnae folio-

rum elliptice oppofitae, fecundum longitudinem petiolis parvis adfixae. Petioli hi faepe etiam in inferiore parte tres fimul emittunt pinnas, unde inferius trifoliatae, fuperius folitariae pinnae apparent.

MORINGA Zeylanica, pinnis rarioribus, flore minore. *Nobis.* Moringha floribus parvis. *Muf. Zeyl. pag.* 63. Moringhos floribus parvis. *ibidem. pag.* 21. Moringa Mas. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 1. *cap.* 63. ubi flos depictus eft pentapetalus, cum quinque ftaminibus, & folia ad rachim tantum quinque vel tria, quae cum figura *H. Amft. part.* 1. *Fig.* 112. convenit.

De Morunga *Grimm. in Labor. Ceyl. pag.* 111. in genere dicit: Radix ipfius excellentiffimam nobis exhibet medicinam, quae convenit cum noftra piperis radice, quoad odorem & faporem, quamobrem pro cibis etiam ufui adhibetur &c.

Sal ejus eft exquifitiffimum in Hydrope, Morbo regio, Cachexia, Obftructione Hepatis, Lienis, & in Calculo &c. Fructus optimum ibi locum habent. Flores in jufculis pro morbis calidis conveniunt.

MOTHUKOLA *Muf. Zeyl. pag.* 68. ubi additur, folia hujus comeduntur in obfoniis.

MURUWAWAEL *Muf. Zeyl. pag.* 55. ubi notatur, Caulem habet ductilem, & fubtili lino infarctum, quo utuntur pifcatores.

MUSA Seraphionis. Ficus Indica. *Muf. Zeyl. pag.* 70. Ficoides, feu Ficus Indica, longiffimo, latiffimoque folio, fructu longiffimo, *Mufa* Seraphionis dicta. *Herm. H. L. Bat. pag.* 256. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 28. *Merian. infect. Surin. pag.* 12. hujus habet Figuram, nec non optima invenitur apud *Linnaeum in tractat.* de MUSA CLIFFORT. quae *pag.* 14. cum ejus fynonymis & nota characteriftica exactiffime defcribitur. Palma humilis, longis latisque foliis. *C. B. Muf. Zeyl. pag.* 61. Ficus Indica, racemofa, foliis & fructu ampliffimis, *Mufa* Arabibus dicta. *Plukn. Almag. pag.* 145. ubi multa hujus inveniuntur fynonyma, & plurima ejus apud *Sloan. in Catal. pl. Jam. pag.* 189. ubi Mufa caudice viridi, fructu longiore falcato, angulofo vocatur. vide & *Hift. Jam. part.* 2. *pag.* 141. & *Cluf. lib.* 2 *cap.* 8. & *Acoft* apud *Cluf. lib. aromat. cap.* 42. ut & *Dale Pharmac. fupplem. pag.* 265. Bala *H. Malab. part.* 1. *Tab.* 12, 13, & 14. ubi *pag.* 20. fexdecim enumeran-



MUSSAENDA Zeylanica, flore rubro, fructu oblongo, poly= spermo folio ex florum thyrso prodeunte albo. Herb. Hart.

merantur ſpecies, quae apud *Rumph. in Herb. Ambon. lib.* 8. *cap.* 1. etiam occurrunt, quarum quaedam etiam depictae ſunt, atque haec ab eo vocatur Muſa arbor, vel arbor Muſae Piſſang, Figo de India. KEHELGHAHA Zeylonenſibus haec arbor, ſeu planta in genere dicitur; ejus fructus vero *Watukaena.* Fructuum faſciculus *Watukaena-wirya.* Flos *Watumuwa.* Folia *Kehel-Kolla.* Liquor, qui ex hujus floſculis ſponte exſtillat *Kehelperu. Peru* notat mel; dulcis enim & vinoſus eſt liquor. Cortex arboris membranoſus eſt, ex quo caudex componitur *Kehelpatum* dictus, ut notatur in *Muſ. Zeyl. pag.* 70. ubi etiam dicitur, quod varias hujus arboris ſpecies Cinghali enumerent, quarum plurimae ibi etiam nominibus Barbaris denominantur.

MUSSAENDA Zeylanica, flore rubro, fructu oblongo, polyſpermo, folio ex florum thyrſo prodeunte albo. *Herb. Hart.* Quae *Tab.* 76. expreſſa reperitur. Muſſaenda. *Muſ. Zeyl. pag.* 36. Belilla *H. Malab. part.* 2. *Tab.* 18. *ibidem.* qui frutex Indicus, baccifer, fructu oblongo, polyſpermo. *Ray. hiſt. pag.* 1493. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 31. Muſſaenda, arbor Indica, floribus in ſummis ramulis veluti in faſciculos diſpoſitis, e quorum medio emergit folium latum, ſingulare, flavicans. *Ray. tom.* 3. *Dendr. pag.* 126. ubi ſequenti modo breviter deſcribitur: Folia in ramulis ex adverſo bina, triuncias longa, duas lata, Ellipticae fere figurae, niſi quod in mucronem exeant. &c. Flores parvi ex oblongo tubo in quinque ſegmenta brevia expanduntur. & in *Muſ. Zeyl.* dicitur; Folium, quod ex florum thyrſo prodit, differt a caeteris, eſtque coloris luteo vireſcentis.

a *Rumphio in Herbar. Ambon. lib.* 6. *cap.* 57. ſimilis huic planta, ni eadem deſcribitur, quam etiam cum Belilla *H. Malab.* conjungit, & ab eo vocatur Folium Principiſſae, Daun Putry. depingitur autem illa planta penitus glabra & viridis, quum noſtra ſit hirſuta & obſcure virens. Flores dependent ibi lutei vel flavi, calice oblongo, vix diſſecto contenti, inter quos folia ſubrotunda minora, quam in noſtra, & alba erumpunt. Fructus autem eſt ibi oblongus viridis, punctatus, ut videtur, quadrangularis, quatuor apicibus coronatus, in quatuor loculamenta diviſus, polyſpermos.

Nobis autem accurato examine inſtituto apparuit, quod noſtra *Muſſaenda* calice conſtet unifolio, hirſuto, in quinque radios anguſtos, longitudine floris producto. Floris petalum autem eſt unicum, infun-

 liforme,

liforme, limbo quinquefido, totum hirſutum, coriaceum. Stamina floris ſunt quinque e tubo petali nata, apicibus quinque oblongis inſtructa; piſtillum unicum, tenue, ſummo bifidum gerens. Fructus in fundo calicis reconditur pyriformis, carnoſus, in duo loculamenta diviſus, ſeminibus plurimis, minutiſſimis nidulantibus, ut eleganter in *Figura H. Malab.* etiam apparet: ſed notandum eſt, quod ibi calix brevis & quinquedentatus tantum exhibeatur, quum in noſtra planta ſit tenuis, longus, hirſutus, ut etiam in noſtra icone conſpicitur. Tota denique planta glabra ibi depicta eſt, quum noſtra tota quanta ſit hirſuta, & illa cum *Rumphii Figura* penitus convenit. errorem tamen illum ſaepius in *H. Malab.* iconibus commiſſum eſſe obſervavimus, forte per incuriam ſculptorum. Folia porro in noſtra planta ſunt ovato-acuminata, acuta, villoſa, petiolis parvis inſidentia, integra, bina ſibi oppoſita, obſcure virentia. Flores in ſummis ramulis proveniunt racemoſi, jam deſcripti, inter hos folia occurrunt ſolitaria, cum caulis quoad figuram ſimilia, ſed color in his albus, vel flaveſcens utrinque, & multo ſunt tenuiora, laeviter etiam villoſa.

MUWAKIRIWAEL. *Muſ. Zeyl. pag.* 70. *Muwa* cervum. *Kiri* lac notat.

MYROBALANUS Zeylanica, ex qua Gummi Elemi, fructu odore ac ſapore praeſtans, KAEKUNA Zeylonenſibus. WILDE AMANDELS Belgis. *Muſ. Zeyl. pag.* 48.

MYRTUS Indica, odore Citri: an Myrtus Indica, odorata Theophraſti? *Muſ. Zeyl. pag.* 9. HINCUBUSE & NARANDA Zeylonenſibus. forte eſt Vitis Idaea infra propoſita, ubi vide. Myrti characterem habet *Linnaeus in char. pl. gen. pag.* 142.

NATASURI. *Muſ. Zeyl. pag.* 59.

NELUGHAS. *Muſ. Zeyl. pag.* 3.

NERIUM anguſtifolium, flore rubente, odorato, roſeo. *Muſ. Zeyl. pag.* 33. Nerium anguſtifolium, Indicum, flore rubro, odorato, ſimplici. *Foula Miſtica* Luſitanis. *ibidem. pag.* 34. Nerion Indicum, anguſtifolium, floribus odoratis, ſimplicibus. *H. L. Bat. pag.* 447. ubi icon & deſcriptio, & *Commel. Fl. Malab. pag.* 47. & *Ray. hiſt. pl. pag.* 1768.



NERIUM *Indicum, siliquis angustis, erectis, longis, geminis. Nobis.*

1768. Nerium Indicum, anguſtifolium, flore incarnato, odorato, ſimplici, *Par. Bat. Pr. pag.* 356. Belutta-Aveli, *H. Malab. part.* 9. *Tab.* 2. &c.

NERIUM Zeylanicum, floribus roſeis, amplis, plenis. *Muſ. Zeyl. pag.* 46. Nerion Indicum, latifolium, floribus odoratis, plenis. *H. L. Bat. pag.* 447. ubi icon & deſcriptio. Nerium Indicum, latifolium, flore rubro, & aliquando variegato, odorato, pleno. *Par. Bat. Pr. pag.* 356. & *H. Beaum. pag.* 31. Nerium latifolium, Indicum, flore variegato, odorato, pleno. *H. Amſt. tom.* 1. *pag.* 45. *Fig.* 23. Nerium Indicum, flore rubeſcente pleno. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 46. Oleander Sinicus, Bodilo Tsjena. *H. Malab. Rumph. Herb. Ambon. auctuar. cap.* 33. Tsjovanna-Areli *H. Malab. part.* 9. *Tab.* 1. Flos Myſticarum vulgo. *Muſ. Zeyl. pag.* 46. illis enim Myſticae ornant caput, collum, & brachia; ut ibi notatur.

NERIUM Indicum, ſiliquis anguſtis, erectis, longis, geminis. *Nobis. Tab.* 77. Apocynum Zeylanicum, arboreſcens, Armenii flore albo, ſiliquis anguſtis, erectis, longis, geminis. *Herb. Herm.* Apocynum erectum Malabaricum, fruteſcens, Jasmini flore candido. *Par. Bat. pag.* 44. ubi pro Codaga-Pala *H. Malab. part.* 1. *Tab.* 47. habetur, & frequens in inſula Zeylana dicitur. Apocynum fruteſcens, Zeylanicum, Jasmini flore & odore, WALIDDA Zeylonenſibus. D. *Herman* apud *Ray. tom.* 3. *pag.* 538. Apocynum Indicum, erectum, arboreſcens, floribus albis, amplis, ſiliqua gemella, WALIDDA dicta *Amm. Char. pl. pag.* 618.

Elegans haec arbuſcula caulibus firmis, & lignoſis, rotundis, ex ſuo trunco varios dat ramos, cortice nigricante, lignum albicans tegente, cinctos; folia gerentes bina ſibi mutuo oppoſita, oblongo-lanceolata, acuta, glabra, nervoſa, variae magnitudinis, ab utraque parte laete viridia In ſummo caulium varii egrediuntur flores, tubuloſi, in quinque ſegmenta diviſi, monopetali, ſtaminibus multis in conum acutum collectis ornati, albiſſimi, jucundi odoris & adſpectus. Calix flores ſuſtinens, eſt ſtellatus, in quinque lacinias diviſus, qui ſatis longo & tenui, ac varie multiplicato innititur petiolo, & perpetuus eſt; floribus enim emarcidis ex uno tali calice duae ſimul eriguntur ſiliquae anguſtae, erectae, naturaliter triplo fere longiores, quam in data Figura potuit exprimi; miro modo in ſummo per apicem acutiſſimum circum-

circumvolutum fibi junctae, & connexae; quae filiquae lanugine albiffima funt repletae, in qua femina collocantur plurima, longa, angufta, ftriata, pappo, qui lanuginem illam conftituit, ornata, cinerea.

NERIUM Indicum, folio fubrotundo, undulato, craffo, flore dilute rubente. *Nobis. Tab.* 78. *Fig.* 1. Apocynum Zeylanicum, fubrotundo folio, Nerii flore rubro. *Herb. Hart.* Apocynum arboreum Indiae Orientalis, Laurinis foliis, roftrato Borraginis flore, praegrandi filiqua, feminibus longis gracilibus, fericeis pappis involutis. *Plukn. Mantiff. pag.* 16. Apocynum Malabaricum, arborefcens Limonii folio, flore ex flavo rubefcente, filiquis maximis. *Commel. in notis ad H. Malab. part.* 9. *pag.* 5. ubi Nelam-Pala vocatur. huc pertinet quoque Nerium arboreum, folio latiore, obtufo, flore luteo minore. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 154. & *Hift. vol.* 2. *pag.* 62. *Tab.* 186. *Fig.* 2. huc & fpectat Arbor Indica, Lauri amplioribus foliis, obtufis, e regione binis, floribus Jasmini, fummo ramulorum umbellatim pofitis, ex infula Johanna. *Plukn. Mantiff. pag.* 20. ubi dicit Tsjovanna-Amelpodi *H. Malab. part.* 6. *Tab.* 47. huic proxime accedere.

A prioribus differt haec arbufcula foliis rotundioribus, craffioribus, nervofiffimis, per quorum dorfum nervus flavus, validiffimus ad fummum usque decurrit: Flores caeterum funt etiam oblongi, tubulati, in limbo quinquefidi & inftar Borraginis ibi rotati, fed profundius fecti. Flores hi & in fummitate ramorum, & ex alis foliorum proveniunt multi fimul collecti, poft quos filiquae latae, longae, fimplices, glabrae fubfequuntur, feminibus longis, ftriatis, pappofis coloris flavi repletae: Semina haec eleganter inter pappum vario ordine locantur, ut in data figura pulchre confpicitur.

NERIUM Indicum fcandens, flore albo, filiquis geminis. *Nobis. Tab.* 78. *Fig.* 2. Apocynum Zeylanicum, Indicum, frutefcens Nerii flore candidiffimo. *Par. Bat. pag.* 40. & *Herb Hart.* Nerium Indicum, folio non nihil mucronato. *Par. Bat. Pr. pag.* 357. Apocynum Zeylanicum, arborefcens. *Muf. Zeyl. pag.* 2. Apocynum arborefcens, flore albo, Caryophylli fylveftris facie, filiquis anguftis, erectis, geminis. *Muf. Zeyl. pag.* 42. Pal-Valli *H. Malab. part.* 9. *Tab.* 12. quod Apocynum Malabaricum fcandens, latifolium, flore rubefcente, filiquis anguftiffimis, & longiffimis. *Commel. in notis* & *Fl. Malab. pag.* 6. vocatur, & folia habet rotundiora, floresque minores. Jasminum (potius

NERIUM Indicum scandens, flore albo, siliquis geminis. Nobis.



NERIUM Indicum, folio subrotundo, undulato, crasso, flore dilute rubente. Nobis.

tius Apocynum) Indicum, fylveftre, inodorum, filiquofum, femi-nibus pappofis, floribus albis, amplis, IDDA Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 47. huc forte fpectat, quod fupra *pag.* 25. citatum eft. Apocynum fcandens, flore Nerii albo. *Plum. pl. Amer. pag.* 82. *Tab.* 96. an Arbor Indica, Nerii foliis fplendentibus Belgarum. *Plukn. Almag. pag.* 263? IDDAGHAS Zeylonenfibus dicitur per excellentiam ab *Idda*, quod florem notat ob floris ftructurae, & inmaculati candoris pulchritudinem eximiam. *Ghas* arbor eft, ut notatur in *Muf. Zeyl.* Folia gerit haec arbufcula oblonga, glabra, fplendentia, tenuia, viridia, venofa, brevi innixa pediculo, bina fibi invicem oppofita, ut in aliis congeneribus, caulibus lignofis, flexilibus, cortice purpureo maculato ornatis, adfixa; flores tam in fummitate ramorum, quam inter folia per caules funt difperfi, pluresque fimul collecti, candidi, tubulati, in quinque lacinias diffecti, poft quos filiquae anguftae erectae, geminae, in *Parad. Batav.* (ubi reliquam vide defcriptionem) dicuntur fubfequi, unde magnam adfinitatem habet cum illa *Tab.* 77. a nobis exhibita, diverfae tamen funt, ut etiam ex *Parad. Batav.* patet, plantae, & a Zeylonenfibus diverfis etiam indigitatae nominibus, atque haec fpecies fcandens ab *Hermanno* defcribitur, quum altera erecta dicatur, foliatura floribusque etiam differens. Hujus generis character invenitur apud *Linnaeum char. pl. gen. pag.* 63.

NICOTIANA. *Grimm. Labor. Ceyl. pag.* 126. ubi dicit: Praebet nobis aquam, Oleum ftillat. Ol. per infufionem, Confervam, ex qua varia vomitoria, quae certiora funt, quam infufiones Croci metallorum, aut Vitri Antimonii. Participes vos reddo meliorum hoc in fubjecto defcriptionum. Ubi varias porro proponit formulas. &c.

NIWITIWAEL. *Muf. Zeyl. pag.* 70.

NUX Zeylanica, folio multifido, digitato, flore Merdam olente. *Par. Bat. Pr. pag.* 357. *Muf. Zeyl. pag.* 61. *Plukn. Phyt. Tab.* 208 *Fig.* 3. Nux Juglans Zeylanica, magna, bifida, flore puniceo, ftercus humanum redolente, nucleis ovalibus, triplici cortice veftitis, oleofis. *Muf. Zeyl. pag.* 5. Lignum Americanum, foetidum, Merdam olens, Polefaulatio Lufitanis. *Par. Bat. Pr. pag.* 346. *in Plukn. Mantiff. pag.* 137. huic Telabo congener effe videtur, qui prius in *Almag. pag.* 266. diverfus putabatur. vide & *Ray. hift. pl. pag.* 1754. ubi quaeritur, an

 Telabo

Telabo fit Covalam *H. Malab. part.* 1. *Fig.* 49. fed propius accedit Karil *H. Malab. part.* 4. *Tab.* 36. vide & notas ad *H. Malab. part.* 1. *pag.* 90. Merda Papaveris, feu Lignum Stercoris *Grimm. Labor. Ceyl. pag.* 98. ubi breviter haec habet: Haec arbor ita vocatur, quoniam fortiter olet, plus tamen ad ftercus vaccinum, quam humanum acce-dit. Propter odorem incolae non ipfam cufant, fed utuntur ejus ligno cum ligno Santali contufo, & illud cum aqua forbetur ad febres, mor-bos calidos, & puerorum aphtas curandas, dofis eft drachma dimidia ad drach. unam. TELABO Zeylonenfibus dicitur.

Nux Juglans, Moluccana, bifida, RATHAKAEKUNA Zeylonenfi-bus. *Muf. Zeyl. pag.* 6 & 24. id eft *Kaekuna* exoticum. Nuces fert Juglande majores, putamine, cortice duro, & nucleo conftantes, ex quo oleum paratur copiofiffimum: folia habet lata, acuminata, pediculis longis, flores gerit copiofiffimos in fummo ramulorum, ut defcribitur in *Muf. Zeyl.*

Nux Juglans, Zeylanica, minor, bifida, flore puniceo, NAWAGHAS Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 23. ubi dicitur folia habet lata, & ob-tufa. Floresin fummitate ramulorum.

Nux Zeylanica, Juglandis folio, ÆMBARAELLA dicta. *Muf. Zeyl. pag.* 50. *Par. Bat. Pr. pag.* 357. Domba-Gedy Zeylonenfium, feu Nux Zeyl. Juglandis folio. *Par. Bat. Pr.* quae arbor Nucifera, fructu oblongo, rotundo, fub membranaceo, ligneoque putamine unicum nucleum oleofum, & odoratum includente. *Amm. char. pl. pag.* 371. in *H. Amft. tom.* 1. *Fig.* 61. exprimitur & dicitur, quod DOMBA-GEDY Zeylonenfibus vocetur, in *Muf.* autem *Zeyl.* ÆMBARAEL-LA, ubi & additur, quod haec arbor fructus proferat fimiles *Manghas*, quos Cinghali Muria condiunt, ficut Europaei Cucumeres.

Nux Moluccana, foliis inftar Ricini, femine nigro. *Muf. Zeyl. pag.* 34.

Nux Zeylanica, rotunda, exitiofa, folio rigido, glabro, fplendente, an eadem cum *Domba Vol.* 2. *Fol.* 5. *Muf. Zeyl. pag.* 66. & DOMBA *ibidem. pag.* 15? Nux oleofa DHUMBA Zeylonenfibus dicta; quae eft Nux Bengalenfis Juglandifolia, fructu orbiculari. *Plukn. Almag. pag.* 265. DOMBA quae Nux Indica, foliis fubrotundis, laevibus, fplen-

denti-

dentibus, resinosa. *Amm. Char. pl. pag.* 371. Nucifera arbor, semper virens, Indiana, praelongis foliis, venuste venosis, cujus lignum REDWOOD, id est Erythroxylum Barbadensibus, Nux vero *Dhum-ba* Zeylonensibus dicta. *Plukn. Mantiss. pag.* 136. Mali persicae, Mameyae dictae, folio longiori; arbor maxima, cortice sulcato, cinereo, amaro. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 180. & *Hist. part.* 2. *pag.* 124. De DOMBA in *Mus. Zeyl. pag.* 15. dicitur: Folia habet lata, subrotunda, nervis plurimis, directe a medio nervo ad margines tendentibus, floribusque quinquepetalis. *Domba* notat rotundum; fructus enim rotundi sunt ut globuli; ex fructibus exprimitur Oleum ad varios usus, ac praecipue ad Lampadas.

NUX Zeylanica, umbilicatis foliis. *H. Beaum. pag.* 31. Althaea arbor Indica, folio umbilicato, pallente. *Par. Bat. Pr. pag.* 307. Nux vesicaria, oleosa, foliis umbilicatis, ex insula Barbadensi. *Plukn. Phyt. Tab.* 208. *Fig.* 1. Arbuscula exotica, foliis umbilicatis, nuculam Nuculae Indicae sonorae *J. B.* similem ferens. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 20. a quo pro Pada-Kelangu *H. Malab. part.* 7. *Tab.* 49. habetur. quae multum sane differt & plane diversa est a *Pluknetii* Figura; reliqua porro synonyma vide apud *Plukn. in Almag. pag.* 266.

NUX Vomica Officinarum. *Mus. Zeyl. pag.* 41. Malus Indica, venenata, amara, nucleis argenteis, compressis, orbiculatis. *ibidem.* Nux vomica major, & Officinarum. *Par. Bat. Pr. pag.* 357. Colubrini ligni tertium genus in Malabar. vastae arboris magnitudine Acostae. *C. B. Pin. pag.* 301. Solanum arboreum, Indicum, maximum, foliis Oenopliae, sive Napecae majoribus, fructu rotundo, duro, rubro, semine orbiculari, compresso, maximo, *Nuces Vomicas* & *Lignum Colubrinum* Officinarum ferens. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 92. & *Fl. Malab. pag.* 63. ubi vide plura. Caniram *H. Malab. part.* 1. *Tab.* 37. & Modira-Caniram *part.* 8. *Tab.* 24. ubi omnino vide notas subjectas *pag.* 47. & *Samuel Dale Pharmacol. pag.* 439. Arbor Serpentaria, seu Lignum Colubrinum & Nuces Vomicae. *Grimm. Labor. Ceyl. pag.* 95. ubi haec habet: Arbor vocatur a Cinghalensibus GODHAKADURU. Magna est, atque ramos suos simul valde inter se commixtos, non secus ac serpentis, emittit. Ipsius folia potius rotundae, quam longae figurae cernuntur; Fructus, quos progignit, sunt notae illae *Nuces Vomicae Officinarum*, quae numero quodam in rotundissimo cortice conclusae

reperiuntur. Canes ab ifto fructu rabiofi fiunt, & moriuntur. Hominibus autem inferviunt ad venena. &c. Lignum mediocriter durum eft cum venis albis tranfcurrentibus. Optimum eft Alexipharmacum ad omnes venenofos affectus, adverfus morfus venenofarum beftiarum, ferpentum, &c. Adverfus febres, fcabiem &c. ut apud laudatum auctorem & alios latius explicatur. in *Muf. Zeyl.* dicitur, quod GHODHAKADURA vocetur a *Ghodha* folo duro, quo nafci amat, & *Duru* venenum; arboris enim fructus habentur venenati. Lignum circumfertur per Europam nomine *Ligni Colubrini*. & in *Ray. hift. pl. pag.* 1661. & *tom.* 3. *pag.* 117. *Dendr.* dicitur, quod *Ghad-Hokadura*, quae Nux Vomica officinarum, folia habeat Canellae Zeylanicae foliorum figura fimilia, itidem trinervia, fed breviora, latiora, ac craffiora.
Hujus character a *Linnaeo* fequenti modo definitur. Calix regularis, quinquefidus, parvus, petalum infundibiliforme, ad maximam partem quinquefidum; ftamina quinque, piftillum unicum petalo longius. Pericarpium globofum, cortice fragili, unicapfulari, pulpa repletum. Semina quindecim in tribus phalangibus difpofita, orbiculata, depreffa. Hujus & notas characterifticas accurate fatis defcripfit *Amm. in char. pl. pag.* 310 & 477. ubi vide.

Nux Zeylanica, Mofchatae rotundae fimilis, inodora, minor. *Muf. Zeyl. pag* 49. Nucifera, feu Nux Indiae Orientalis, fructu minore fufco. *Plukn. Almag. pag.* 265. IRYA & IRYAGHAS Zeylonenfibus.

Nux Zeylanica, Mofchatae rotundae fimilis, oblonga. *Muf. Zeyl. pag.* 49. an Nux Myriftica, fylveftris, Indiae Orientalis, fructu oblongo, *Plukn. Almag. pag.* 265? & Noce Mofchata *Acoft. edit. Ital. pag.* 78.

Nux Myriftica, oblonga, Malabarica, *Muf. Zeyl. pag.* 59. Nux Myriftica, major, fpuria Malabarica. *Ray. hift. pl. pag.* 1524. & *Fl. Malab. pag.* 48. Nux Indica, oblonga, intrinfecus fimilis Nuci Mofchatae *J. B. tom.* 1. *pag.* 399. Nux Myriftica fpuria, feu Panan Palka *H. Malab. part.* 4. *Tab.* 5. ubi vide notas. & *Plukn. Almag. pag.* 265. Avellanae Indicae genus oblongum. *Cluf. in Garz. pag.* 189. Nux Myriftica, mas, Palala prima. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 2. *cap.* 8. ubi cum Panan Palka *H. Malab.* jungitur. & huic Nux Myriftica mas *Cluf. exot. lib.* 1. *cap.* 16. eadem habetur.

Nux





NUX Moschata, spuria, sylvestris, Caryophylli arboris foliis, oppositis. Nobis.

Nux Mofchata, fpuria, fylveftris, Caryophylli arboris foliis, oppofitis. *Nobis. Tab.* 79. Pfeudo-Nux Mofchata, fylveftris, Zeylanica. *Herb. Herm.* Nux Mofchata, fpuria, quae Pfeudo-Nux Mofchata, Zeylanica, IRYAGHEDHI Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 58.

Arboris hujus rami funt recti, duri, caulem gerentes fcabrum, purpureum, rotundum, e quo folia oppofita, petiolis firmis, lignofisque infidentia erumpunt, triuncialia, ovato-acuta, glaberrima, & fplendentia, inferius caefia. De flore, fructuque nihil dicere poffum, quum noftrae deficiant plantae, nec ullibi bene hactenus defcriptos invenerim; tubercula enim, feu coni in fummo ramorum apparentes, potius gemmae, quam quidem fructus funt in *Rumphii herbario Amboinico*, ubi plures Nucis Mofchatae occurrunt fpecies, forte defcripti erunt accurate flores & fructus, quod opus, quum hic per quadraginta annos jam delituerit in domo Societatis Indiae Orientalis, a gubernatoribus illius focietatis impetrata venia, in lucem edere eft animus, ni fumptus, qui ad tale opus cum Figuris inprimendum requiruntur, exorbitantes illud impediant.

NYADA. *Muf. Zeyl. pag.* 56. quod pronunciatur *Niaenda.* Incolae hujus plantae folia diducunt, ex quibus chordae conficiuntur, ut notatur in *Muf. Zeyl.*

NYMPHAEA Indica, tuberofa, foliis per marginem crenatis; flore incarnato: feu Lotus Ægyptia Theophr. *Muf. Zeyl. pag.* 19. Lotus Ægyptia apud *Theophr.* occurrit *pag.* 449 & 450. Nymphaea, feu Nufar *Veflingii cap.* 34. *pag.* 42. Nymphaea Ægyptiaca, alba, folio crenato, radice tuberofa. *Bobart. hift. Oxon. tom.* 3. *pag.* 513. Nymphaea alba, major, Ægyptia; *Amm. char. pl. pag.* 461. Ambel *H. Malab. part.* 11. *Tab.* 26. quae Nymphaea Indica, flore albo, folio in ambitu ferrato a *Commel.* in *notis* vocatur. vide & *Ray. tom.* 3. *pag.* 630. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 120. & *Hift. part.* 1. *pag* 252. OLU-ALLA Zeylonenfibus, ab *Olu* quod caput in genere notat. *Alla* radix eft.

NYMPHAEA alba, Indica, maxima, flore albo, fabifera. *Muf. Zeyl. pag.* 66. Nymphaea Indica, Faba Ægyptia dicta, flore incarnato. *Par. Bat. pag.* 205. ubi elegans Figura & defcriptio. Nymphaea Indica, maxima, Faba Ægyptia *Stapel in Theophr. Par. Bat. Pr. pag.* 358. quae apud *Theophr. lib.* 4. *cap.* 10. *pag.* 446. & *Diofcorid. lib.* 2. *cap.* 99. invenitur

nitur descripta & depicta. Nelumbo Zeylonensium. *Tournef. inst. pag.* 261. Nymphaea Indica, Faba Ægyptia dicta, flore incarnato. *Ray. tom.* 3. *pag.* 632. ubi pro Tamara *H. Malab. part.* 11. *Tab.* 30. habetur, quae a *Commel.* in notis Nymphaeae affinis, Malabarica, flore amplo, rosaceo, albicante vocatur. vide & *Fl. Malab. pag.* 48. Nymphaeae adfinis glandifera, Malabarica, umbilicato folio ampliore, flore pleno, candido. *Bobart. Hist. Oxon. tom.* 3. *pag.* 514. ubi pro Beru Tamara *H. Malab. part.* 11. *Tab.* 31. habetur, quae variationes sunt floribus differentes. vide & *Plukn. Almag. pag.* 267. & *Amalth. pag.* 156. Nymphaea Indica, flore incarnato, NELUMBO Zeylonensium, & Tamara *H. Malab. Amm. Char. pl. pag.* 490. Nymphaea Indica major, Taratti. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 11. *cap.* 50. NELUMBO Zeylonensibus vocatur. hujus virtutes medicas cum synonymis habet etiam *Dale* in *Pharmacol. supplem. pag.* 218. ad Fabam Ægyptiam Officinarum, & Characteristicam notam *Linnaeus in char. pl. gen. pag.* 149. *Grimm. in Labor. Ceyl. pag.* 131. ad caput de Nymphaea haec habet: Exinde proveniunt nobis Aqua, Syrupus, Conservae, Ol. coctum: quae omnia maxime sunt usitata tum in Medicina, tum in Chirurgia. Aq. Syrup. & Conserv. fluxus ardentes, calidas febres, & Cephalalgias curandi virtutem habent. item sanguinis vomitum, Haemorrhagiam, & fluxus mulierum. Oleum inservit & Inflammationibus, Ulceribus & Combustionibus. in Clysteribus ingrediuntur, ut emolliant & tormina mitigent acrium excretionum.

OCYMUM Zeylanicum perenne, odoratissimum, latifolium. *Nobis. Tab.* 80. *Fig.* 1. Ocymum Zeylanicum perenne, frutescens, folio Calaminthae non nihil simili. *Par. Bat. Pr. pag.* 358. Ocymum Zeylanicum, frutescens, folio Calaminthae *Hermanni* apud *Ray. tom.* 3. *pag.* 290. Basilicum Zeylanicum, latifolium, odoratissimum. *Mus. Zeyl. pag.* 35. Cottam *H. Malab. tom.* 10. *Tab.* 77. quae in notis Nepetae, seu Menthae Catariae affinis, Indica, flore candido. vide & *Commel. Fl. Malab. pag.* 47.

Caulis nostrae plantae est simplex, bipedalis, quadragonus, hirsutus; folia ad radicem subrotunda, utrinque acuminata, crenata, villosa, petiolis tenuibus insidentia, folia caulis oblonga, angustiora & breviora, petiolis uncialibus cauli adfixa, quem terminat spica triplex, laxa, flores reflexos, pendulos gerens, qui cum seminibus eodem modo,



OCYMUM Zeylanicum, annuum, inodorum. Herb. Hart.

OCYMUM Zeylanicum perenne, odoratissimum, latifolium. Nobis.

do, ut in reliquis Ocymi fpeciebus, fefe habent. Communicavit nobiscum hanc Botanices & Botanicorum Mecaenas D. *Georg. Cliffortius.*

Ocymum Zeylanicum, perenne, odoratiffimum, anguftifolium. *Nobis.* Ocymum Zeyl. perenne, odoratiffimum. *D. Hermans* apud *Ray. tom.* 3. *pag.* 290. Ocymum Maderasp. frutefcens, gratiffimi odoris, flore parvo, cauliculis villofis. *Plukn. Phyt. Tab.* 208. *Fig.* 4. an Ocymum frutefcens, perenne, flore parvo. *Breyn. Prodr.* 2. *ibidem*? quod apud *Ray. loco cit.* a priori diftinguitur, & fequenti modo breviter defcribitur: Folia parva funt, Calaminthae minora, longiora, acutiora, per margines ferrata, pediculis fatis longis innixa. Flores in fummo caule in fpicam longam, anguftam digefti, nullis foliis intermixti funt.

Ocymum Zeylanicum perenne, foliis anguftioribus. *Herm.* apud *Ray. tom.* 3. *pag.* 290. an Ocymum pratenfe, Indicum, odore Calaminthae. *Muf. Zeyl. pag.* 51? apud *Ray.* a prioribus & haec diftinguitur, atque fequentem in modum defcribitur. Folia huic, quam praecedenti funt longiora paulo, longioribus pediculis haerentia. Flores majores, fpicae autem non tantum in fummo caule, fed etiam in ramulis è foliorum alis exeuntibus proveniunt. Floris galea eft bifida, fubviridis, labium album, anguftum, parvum.

Ocymum Zeylanicum, annuum, inodorum. *Herb. Hart. Tab.* 80. *Fig.* 2. Ocymum forte Zeylanicum, vulgare. RATHATALA Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 41.
Tota haec planta hirfuta eft, folia gerens ovata, crenata, fubrotunda, laeviffime hirfuta, petiolo unciali infidentia: Caulis quadragonus, hifpidus, hirfutus, viridis. Calices & flores Ocymi; fed qui ad alterum latus magis funt flexi, quam in aliis fpeciebus.

Ocymum Zeylanicum, *Karnitbolefcbi* Malabarorum, KOLLAN-KOLLA Zeylonenfium. *Muf. Zeyl. pag.* 52. ubi additur; fpecificum eft in Cephalalgia, Cinghali facculo indunt, & capiti imponunt.

Ocymum Indicum, odoratiffimum, *Mangiriquam Clufii* TALA-KOLA Zeylonenfium. *Muf. Zeyl. pag.* 61 & 67. Mangiriquam apud *Clufium* occurrit in *exot. pag.* 239. ad caput de *Anil.*

ONO-

ONOBRYCHIS Zeylanica, monophyllos, caule triangulo, petiolis foliorum alatis. *Nobis. Tab.* 81. Onobrychis Zeylanica, Aurantii folio. *Petiv. Hort. ſicc. in Ray. tom.* 3. *append. pag.* 247. *no.* 16. Hedyſarum Zeylanicum, Aurantii folio. *Nobis ſupra pag.* 120. Hedyſarum Monophyllum, flore coeruleſcente. *Hart. Catal. ſemin.* Huc usque fere inpreſſio hujus operis jam erat abſoluta, quum Hortum Medicum perambulanti, & plantas exoticas in Hypocauſtis examinanti forte fortuna ſeſe obſerebat elegans haec, & nunquam antea mihi viſa planta, quam ex ſeminibus quondam ex Zeylona ab *Hartog* transmiſſis hoc anno protulit Hortus Medicus, quae licet nondum perfecta ſit, nec flores fructusque in hunc usque diem dederit, hac occaſione, quum a nullo Botanicorum hucusque deſcriptam, vel expreſſam invenerim, & publico offerre, ejusque figuram cum brevi deſcriptione huic operi inſerere debui, & volui.

Quae ex radice fibroſa plurimos ſimul attollit ramos, majores minoribus interpoſitos, qui in ſpithamalem longitudinem hoc anno excrevere, quorum caules ſunt ſcabriuſculi, ſubhirſuti, purpuraſcentes, triangulares, & ſulcati, folia alterna emittentes, quae ex eorum alis ſquammulas duas foliaceas oblongas, acutas, ſtrigoſas producunt: folia haec petiolis inſident ſeſquiuncialibus, viridibus, foliaceis, membranula ſcilicet tres circiter lineas lata totum petiolum undique ambiente, unde alatus penitus eſt, ad cujus ſupremum producitur folium latum, ſubrotundum, acutum, Aurantii forma proxime conveniens, quod ſuperius viride & ſcabrum, inferius pallidum, & laeviter hirſutum obſervavi, & licet haec planta flores fructusque nondum examinandos praebuerit, certus tamen ſum ex toto ejus habitu ad *Hedyſarum* ablegandum eſſe, ut annus forte ſubſequens, quum floreat haec planta, determinabit, cujus in poſterum data occaſione flores fructusque deſcribam & exhibebo, ſin examinare illos licuerit; interim qualis ſit, hac rara contenti ſitis, Botanophili, planta.

ORCHIS caule ad ſummum folioſo. *Nobis.* Orchidis ſpecies, caule ad ſummum folioſo. *Muſ. Zeyl. pag.* 22.

ORCHIS caule cubitali; ſpica parva, longa, rara. *Nobis.* Orchidis ſpecies, caule cubitali, ſpica parva, longa, rara. *Muſ. Zeyl. pag.* 23.

ORCHIS



ONOBRYCHIS *Zeylanica, monophyllos, caule triangulo, petiolis foliorum alatis. Nobis.*



ORNITHOPODIUM Zeylanicum, arborescens, Lavandulae foliis, flosculis rubellis. Nobis.

ORCHIS Zeylanica, facie Gladioli, bulbo pyramidali, compreſſo, viridi, ſuccoſo. NARIALA Zeylonenſibus. *Muſ. Zeyl. pag.* 63.

ORNITHOGALUM Zeylanicum, macrorizon. DYABAERALYA Zeylonenſibus. *Muſ. Zeyl. pag.* 55 & 56.

ORNITHOPODIUM Zeylanicum, arboreſcens, Lavandulae foliis, floſculis rubellis. *Nobis. Tab.* 82. Spartium Zeylanicum, arboreſcens, flore parvo, rubello. *Herb. Hart.* Orobus Zeylanicus, glaber, flore rubro. *Par. Bat. Pr. pag.* 359. & *Plukn. Almag. pag.* 273.
Planta eſt fruteſcens, caule glabro, laeviſſime hirſuto, rotundo, cinereo; ramos hinc inde ſpargens plurimos, in minores absque ordine diviſos. Folia ad gemmas erumpunt plurima, in quibusdam ſolitaria, forma & colore foliorum *Lavandulae* oblonga, pediculis brevibus adfixa, integerrima, nervo longitudinali proveniente ſubtus firmata, undique villo albicante veſtita: in ſummis ramulorum prodeunt floſculi in ſpicam brevem, denſam congeſti, qui calicibus quinquedentatis, minimis inſident; flores ſunt minimi, rubelli, quibus ſuccedunt ſiliquae plurimae, teretes, articulatae, in quinque articulos diſtinctae, diſſepimentis parvis, laeviter compreſſis, ad ſemina protuberantibus: Siliquae ipſae ſunt laeviter incurvatae, ſubhirſutae, plurimae in capitulum collectae, ſemina recondentes ſubrotunda, glabra, ſplendentia, nigra.

OROBUS Indicus, ABRUS *Alpini* dictus, fructu coccineo, macula nigra notato. *Nobis.* Orobus Americanus, fructu coccineo, macula nigra notato. *Tournef. inſt. pag.* 393. Vicia Zeylanica, tota parte dulceſcens, fructu coccineo, rotundo, hilo nigro notato. *Herb. Hart.* Glyzyrrhiza Indica, fructu coccineo, rotundo, hilo nigro notato. *Muſ. Zeyl. pag.* 16. Glyzyrrhiza Indica, ſiliquis & ſeminibus Piſi coccineis, hilo nigro notatis. *Par. Bat. Pr. pag.* 337. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 33. Cicer Indicum, fructu rubro, macula nigra notato, vel ABRUS. *Amm. Char. pl. pag.* 338. ABRUS *Alpini*, qui partim Phaſeolus, partim Cicer, fructu rubro, macula nigra notato. *H. Oxon. pag.* 71. *Amm. Char. pl. pag.* 241. Abrus frutex, Zaga. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 7. *cap.* 31. & Vicia Africana *Cluſ. exot. lib.* 4. *pag.* 15. Piſum Indicum, coccineum, hilo nigro notatum, ABRUS *Alpini. Amm. H. Boſian. pag.* 28. Phaſeolus alatus, ſive Abrus minor, fructu

 cocci-

coccineo, macula nigra notato. *Moris. hist. pl. part.* 2. *pag.* 67 & 71. *Amm. Char. pl. pag.* 514. Pisum Indicum, minus, coccineum. *C. B. Pin. pag.* 343. Abrus *Alpini de plant. Ægypt. cap.* 21. *pag.* 32. Phaseolus Indicus *Bontii pag.* 136. Pisum Americanum, coccineum, aliis Abrus *J. B. tom.* 2. *lib.* 17. *pag.* 263. Konni *H. Malab. part.* 8. *Tab.* 39. qui Phaseolus alatus, major, fructu coccineo, macula nigra notato. *Commel. in notis.* & *Fl. Malab. pag.* 53. Abrus Officinarum. *Samuel Dale Pharmac. supplem. pag.* 182. qui hujus duas facit species, ut & etiam *Pluknetius*; quae tamen ab *Hermanno* pro una habetur. Primo ABRUS vulgaris, a plurimis jam denominatus, a *Pluknet.* vocatur Phaseolus arborescens, alatus, & volubilis major, Orientalis, fructu coccineo, hilo nigro notato in *Phyt. Tab.* 214. *Fig.* 5. & *Almag. pag.* 294. dein Phaseolus alatus, minor, Americ. Glycyrrhizae sapore, & siliquis Orobi, seminibus nigris, hilo coccineo notatis. *ibidem.* & *Phyt. Tab.* 210. *Fig.* 6. ubi siliquarum Figurae exhibentur, & Viciae folia ipsi adscribit. sed Glyzyrrhizae sapor priori ab *Hermanno* & aliis etiam adtribuitur, ut patet ex *Mus. Zeyl. pag.* 16. ubi dicitur: tota planta dulcissimo est sapore, maxime radix, ex qua succum Glyzyrrhizae vix cedentem decoxi. &c. *Sloan. in Catal. pl Jam. pag.* 70. has etiam conjungit; ubi vocatur Phaseolus Glyzyrrhizites, folio alato, piso coccineo, atra macula notato, ubi *pag.* 70, 71 & 221. plurima hujus vide synonyma multo labore congesta, & optimam ejus etiam Figuram in *Hist. Jam. part.* 1. *pag.* 180. *Tab.* 112. *Fig.* 4, 5, 6. OLINDA & OLIDA Zeylonensibus dicitur.

OXYS Indica, Tamarindi foliis, floribus umbellatis. *Nobis.* Oxalis lutea, flosculis & seminibus; quae herba sentiens Bontii; & Herba viva *Acostae. Mus. Zeyl. pag.* 5 & 37. apud *Bontium* occurrit *pag.* 120. & Herba viva *Acostae* apud *Clus. in exot. pag.* 290. descript. apud *Acost.* edit. Ital. *pag.* 181. & apud *Clus. cap.* 55. Herba viva, angustifolia, Zeylanica. *Breyn. Prodr.* 22. *pag.* 55. Herba sentiens, Daun-Tacot-Manusia. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 8. *cap.* 79. ubi icon & descriptio cum aliis Mimosae speciebus. Herba viva foliis Polypodii. *C. B. Pin. pag.* 360. & *Fl. Malab. pag.* 35. Herba viva foliis & floribus, longis pediculis uni thyrso insidentibus, Ambonica. *Rumph. Eph. Germ. anni* 11. *observ.* 32. Oxoides Malabarica, sensitiva, caule viridi, glabro, flore luteo, majore. *Garcin. Act. Angl. ann.* 1730. *pag.* 377. *Tab.* 2. & Oxys Indica, non acida, Tamarindi foliis sentientibus, umbellatis, floribus

bus in fummo pediculo luteis, umbellatis. *Herbar. Garcin.* qui hac infcriptione mecum illam communicavit: Acetofella herba, Mimofae foliis, fentiens. *Herb. Herm.* Pentaphylloides Zeylanicum, erectum, Mimofae foliis, flore luteo. *Herb. Hart.* Mimofa humilis Indiae Orientalis, fimpliciter pinnatis Tamarindi foliis, floribus coronariis, flavis, lituris rubris eleganter ftriatis. *Plukn. Almag. pag.* 252. & *Mantiff. pag.* 131. ubi varia infuper hujus fynonyma inveniuntur. Todda-Vaddi. *H. Malab. part.* 9. *Tab.* 19. ubi vide notas & Totta-Vari *Zanon: Tab.* 61. *pag.* 199. NIDIKUDDA Zeylonenfibus, quod pronunciatur NIDIKUMBA; a *Nidi* dormire & *Cumba* fomnum, nam plantulae folia tacta, quafi dormientia placide decumbunt ac flacfefcunt, ut notatur in *Muf. Zeyl. pag.* 5. Generis hujus characterem habet *Linnaeus in Char. gener. pl. pag.* 134. ubi OXALIS vocatur. Defcriptioni *H. Malab.* pauca fubjungam, Figuram non addens; quum a variis jam bene exhibita fit, & in *Rumphii Herbar. Ambon.* fatis ample defcripta in pofterum inveniri poterit. Radix itaque noftrae plantae eft tenuis, fibras undique capillares fpargens, e qua caulis oritur femipedalis, fimplex, nudus, laevis, in fummitate caulis ex unico veluti centro craffiufculo progerminant petioli, quibus folia plurima, decem vel plura pinnarum paria, adfiguntur fine impari, inter foliorum ortum plures pedunculi tri- vel quadriunciales proveniunt, longitudine fere foliorum, apice gerentes capitulum fquammofum; inter fingulam fquammam prodit alius pedunculus breviffimus, unicum fuftinens florem.
Flores & filiculae in *H. Malab.* accurate fatis defcriptae funt; fed notandum, quod fi fructus ad juftam maturitatem pervenerit, cum impetu, & fatis magna vi femina fua explodat, ut in loco natali faepius *Dnus Garcin* fefe obfervaffe mihi afferuit, ita ut vera haec *Oxidis* fit fpecies, quae in omnibus fere Indiae locis invenitur, & occurrit, atque egregiis etiam pollet viribus; radix enim decocta calculofis fummopere prodeft, ac femina ad apoftemata externe, interne ad Gonorrhaeam conducunt.

OXYS flore luteo, vulgaris, minor, Zeylanica. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 80. Oxys lutea, Indica, Daun Affan, Kitfyl. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 8. *cap.* 64. ubi cum illa *Cluf. lib.* 6. *rar. pl. pag.* 59. eadem habetur. Trifolium acetofum, Zeylanicum, corniculatum, flore luteo, ÆMBULLAEBILYA Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 60. Trifolium filiquofum, rotundifolium, glabrum, floribus luteis è Maderaspata.

 Plukn.

Plukn. Phyt. Tab. 231. *Fig.* 4. Trifolium acetofum, corniculatum, luteum, minus repens, & etiam procumbens. *Moris. hift. pl. pag.* 180. & *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 90. ubi plurima hujus exhibentur fynonyma.

PABA foliis incifis *Muf. Zeyl. pag.* 6. ubi dicitur, pronunciatur *Paniba.* & infervit ad fepes ftruendas.

PABA foliis non incifis. *Muf. Zeyl. ibidem.*

PADHULWANASSA. *Muf. Zeyl. pag.* 6. a *Padhul* quod aurificem, & *Wanaffa* quod inpotentiam denotat, & eft quafi dictum *aurifex non poteft.* quia aurifices omnium rerum imagines praeter hujus plantae poffunt exprimere; ut notatur in *Muf. Zeyl.*

PAELAE. *Muf. Zeyl. pag.* 24.

PALMA Indica, vinifera, fructibus urentibus, folio Adianthi faccharum praebens. *Muf. Zeyl. pag.* 44. an Palma vinifera, fructu ex arboris trunco fpinofo. *C. B. P. pag.* 307? Palma humilis ex infula Macafaria, Indiae Orientalis, nucleo plerumque gemello, Nucis Mofchatae inftar verficolore, KITTIEL Zeylonenfibus dicta. *Plukn. Almag. pag.* 277. an Palma foliorum pediculis fpinofis, fructu pruniformi, luteo, oleofo? *Sloan. Cat. pl. Jam pag.* 175. ubi recenfetur pro Palma, ex cujus fructibus Oleum, vinum, acetum &c. extrahuntur: huc fpectat Schunda-Pana *H. Malab. part.* 1. *Tab.* 11. quae eft Palma Indica, folio bicompofito, fructu racemofo. *Ray. hift. pl. pag.* 1365. & *Fl. Malab. pag.* 50. & Palma dactylifera, fructu acerrimo. *Plum. nov. pl. gen. pag.* 3. cum qua proxime convenit Saguafter major, Nibum Befoar. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 1. *cap.* 14. Caryota hoc genus a *Linnaeo in tractat. de Mufa Cliffort. pag.* 12. vocatur, ubi accuratiffime ejus notae characterifticae recenfentur. primusque eft, qui Palmarum fpecies in varias claffes feu genera diftinxit, intricatasque illarum notas in eleganti illo tractatu explicavit, & in ordinem redegit. & Kettule *Robert. Knox hift. Ceyl. edit. Belg. pag.* 21. ubi ita defcribitur: Recto adfurgit haec arbor trunco, fed non tam alta, nec ita craffa eft, ac *Coccigera* arbor, lignum non ultra tres digitos craffum, durum, folidum, & grave: intus nihil aliud reperitur, nifi medulla alba, ut in arbore *Tallipot.* Succum dat, qui vocatur *Tellegie*, dulciffimus hic eft, & jucundi

jucundi ſaporis, maximeque proficuus corpori humano, verum non aqua fortior, nec inebrians eſt hic ſuccus, bis de die petunt ex hac arbore illum, & ſi optima ſit arbor, ter de die; vulgaris arbor duodecim, quaedam ſexdecim praebet amphoras, immo aliae plures uno de die, hunc ſuccum coquunt, & conficiunt inde ſaccharum rubrum *Jaggory* illis dictum, quod etiam arte quadam albiſſimum reddi poteſt. Arbor haec KITULAETHA & KITUL Zeylonenſibus dicta eſt. *Kitulraena* ejus fructus, & *Kitulmala* ejus flores vocantur. ut notatur in *Muſ. Zeyl.*

Palma Indica TAL & TALGHALA dicta, fructu carnoſo, dulci & eduli putamine incluſo. *Muſ. Zeyl. pag.* 49. Pro Carim Pana haec a Dom. *Syen.* habetur in *notis* ad *H. Malab. part.* 1. *pag.* 12. ubi vocatur Palma coccifera, complicato folio, fructu minore. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 49. quae eſt Palma coccifera, folio plicatili, flabelliformi, foemina, Carimpana *H. Malab.* Palmera Brava foemina Luſitanis. *Ray. in hiſt. pl. pag.* 1366. ſed ab hac arbore TAL ſeu TALGHAHA diverſam eſſe dicit. Carimpana haec a *Plumier.* in *nov. pl. gen. pag.* 2. vocatur Palma coccifera, complicato folio, fructu minore, *Pauli Hermans.* & *Linnaeo* in *tractat. de Muſa Cliffort. pag.* 13. eſt Boruſſus foemina, ubi nota ejus characteriſtica exhibetur. cujus mas eſt Ampana *H. Malab. part.* 1. *Tab.* 10. quae *Plumierio* eſt Palma Malabarica, floſculis ſtellatis, fructu longo, ſquamato.

Hujus fructus cum carne exteriore *Talghaedi* Zeylonenſibus vocantur. & *Talaetha* oſſiculum fructus carni ſeu putamini incluſum, ut notatur in *Muſ. Zeyl. pag.* 49.

Palma Zeylanica, folio longiſſimo & latiſſimo, TALA & TALAGHAS dicta. *Muſ. Zeyl. pag.* 54. Palma montana, folio plicatili, flabelliformi, maximo, ſemel tantum frugifera, *Ray. hiſt. pl. pag.* 1367. *Plukn. Almag. pag.* 277. Codda-Panna, ſeu Palma montana, Malabarica. *H. Malab. part.* 3. a *Tab.* 1. ad 13. ubi in notis Palma montana, Malabarica, folio magno, complicato, acuto, flore albo, racemoſo, fructu rotundo *ibidem* & *Commel. Fl. Malab. pag.* 50. ut & *Plumier. nov. pl. gen. pag.* 3. & in notis *pag.* 6. a *Joh. Commel.* huic jungitur Arbor foliis ſex brachiorum longis, cujus folio extenſo tres quatuorve viri in itinere operiuntur, ut pluvias non metuant. *Casp. Bauh. in Pinac.* Corypha haec a *Linnaeo in tract. de Muſa Cliffort. pag.* 11. vocatur. Talli-

pot a *Knox* vocatur in *defcript. infal. Ceyl. pag.* 20. cujus defcriptionem Latine verfam tradit *Ray. in hift. pl. pag.* 136. TALAGHAS h. e. arbor TALA & TALAGAYA Zeylonenfibus dicitur.

PALMA Indica, Coccifera, angulofa, *C. B. P. pag.* 508. *Par. Bat. Pr. pag.* 361. *Muf. Zeyl. pag.* 50. *Plukn. Almag. pag.* 275. *Ray. hift. pl. pag.* 1356. *Sloan. Cat. pl. Jamaic. pag.* 132. *Hift. Jam. vol.* 2. *pag.* 8. *Commel. Fl. Malab. pag.* 50. apud quos plurima invenies fynonyma. Palma major Coccifera, Tenga *H. Malab. H. Beaum. pag.* 33. *Plum. nov. pl. gen. pag.* 2. Palma nucifera, Indica, major. *Jonft. dendr. pag.* 145. Palma, five Nux Indica, vulgaris Cocos ferens. *Parkins Theat. pag.* 1596. Inaia Guacuiba, vulgo Cocos. *Pifon. pag.* 130. Coccus *Cluf. lib.* 1. *aromat. cap.* 26. *pag.* 191. & *Linnaei in tract. de Mufa Clifort. pag.* 11. Coccus Officinarum. *Dale Pharm. fupplem. pag.* 258. ubi vide reliqua. Arboris hujus elegantes occurrunt Figurae in *H. Malab. part.* 1. *Tab.* 1, 2, 3, 4. nomine Tengae, ubi confule notas, & *Joh. Freyer in itiner. per Indiam.* hujus etiam bonam habet Figuram & defcript. *pag.* 9 & 10. nec non *Rumph.* in *Herbar. Ambon. lib.* 1. *cap.* 1. ubi Palma Indica major, Coccifera, Cocos & Calappa vocatur, qui amplam hujus arboris habet defcriptionem & optimas etiam Figuras. Cocos five arbor Crepitaculorum a *Grimm. in Labor. Ceyl. pag.* 101. vocatur. ubi haec habet: Praeter fuam fatis agnitam utilitatem fuppeditat nobis in gratiam Medicinae, Chirurgiae & Alchimiae pulcherrimum quoddam acetum deftillatum, quod in quibusvis cafibus melius eft quam Acetum Vini. &c. Oleum recens e putaminibus ejus expresfum optime commendatur, etiam pro Chirurgia, praefertim in aduftionibus, etenim valde refrigerans eft & dolorem mitigans, ubi porro bonum unguentum ad aduftiones praefcribit: Cocos haec nobis infervit loco lactis, Amygdalarum, pro fluoribus alvi, refrigerat & moderatur acrimonias lutofarum materiarum in vifceribus. Optimum etiam eft in Gonorrhaea, Urinae ardoribus, quos cito pacificat. & Oleum recens expreffum aeque bonos effectus operatur, quam Oleum Amygdalarum. POLGHAHA haec arbor Zeylonenfibus dicitur.

PALMA Indica, minor, fructu *Areca* dicto, vulgaris. *Muf. Zeyl. pag.* 51. Palma Arecifera, nucleo verficolore, Nuci Mofchatae fimilis. *Par. Bat. Pr. pag.* 361. *Fl. Malab. pag.* 50. ubi varia adfunt fynonyma. a *Plukn. in Almag. pag.* 257. & *in Phyt. Tab.* 309. *Fig.* 4. exprimitur, quae cum

Caunga.

Caunga *H. Malab. part.* 1. *Tab.* 5, 6, 7, 8. vix quadrat. Palma, cujus fructus feffilis *Faufel* dicitur *C. B. P. pag.* 510. *Plum. nov. pl. gen. pag.* 2. Palma Faufilifera. *Jonft. dendr. pag.* 151. Palma, cujus fuccus infpiffatus, *Terra Japonica* feu *Catechu* Officinarum *Dale. Pharm. pag.* 386. ubi varias auctorum opiniones de ea tradit, quas collegit *Wedelius in Ephemer. German. ann.* 2. *obf.* 128. Faufel, feu Areca, Palmae foliis. *J. B. tom.* 1. *pag.* 389. Nux Faufel, feu Pinangh *Bont. pag.* 90. Areca, feu Faufel, five Avellana Indiana, verficolor *Park. Theat. pag.* 1642. *Ray. hift. pl. pag.* 1363. Pinanga Areca, feu Nux Faufel, Pinangh. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 1. *cap.* 5. ubi elegans Figura cum ampla defcriptione, & aliis hujus fpeciebus inveniuntur. &c. PUWAK-GHAHA Zeylonenfibus dicitur.

PALMA Indica, minor, regia, fructu *Areca* dicto, rubente. *Muf. Zeyl. pag.* 66. Palma, cujus fructus oblongus, faufel fimilis *C. B. Pin. pag.* 510. Secunda haec fpecies Pinangae fylveftris, globofae a *Rumph. in Herb. Ambon. lib.* 1. *cap.* 7. defcripta, ut fi editum fuerit hoc opus, melius conftabit. LENATAESI haec proprie dicitur Zeylonenfibus.

PALMA Dactylifera, major, & Dactylus vulgo. *Par. Bat. Pr. pag.* 360. Palma major *C. B. Pin. pag.* 506. *Muf. Zeyl. pag.* 69. *Plum. nov. pl. gen. pag.* 2. Palma Dactylifera. *Linfchot. part.* 4. *Ind. Orient. Fig.* 14. Palma *J. B. tom.* 1. *pag.* 351. & *Ray. hift. pl. pag.* 1352. Palma vulgaris. *Park. Theat. pag.* 1545. Palma Dactylifera, major, vulgaris. *Jonft. Dendr. lib.* 2. *pag.* 138. ubi reliquos adlegatos vide auctores, nec non apud *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 174. qui innumera fere habet fynonyma. & *Hift. part.* 2. *pag.* 111. Haec eft *Phoenix* veterum apud *Kaemph. in amoenit. exot. pag.* 669. qui quam ampliffime & accuratiffime hujus, & etiam aliarum fpecierum, hiftoriam & figuram dedit. hujus character exactiffime definitur a *Linnaeo* in *tract. de Mufa Clif-fort. pag.* 12. ad PHOENIX *Kaemph.* INDI & MAHAINDI Zeylonenfibus.

PALMA Dactylifera, minor, humilis, fylveftris, fructu minore. *Par. Bat. Pr pag.* 361. *Muf. Zeyl pag.* 69. *Plukn. Almag. pag.* 277. Palma Dactylifera, minor, Zeylanica, humilis. *Muf. Zeyl. pag.* 66. de hac vide *Kaemph. in amoenit. exot. pag.* 667. & *H. Malab. part.* 3. *Tab.* 22, 23, 24 & 25. ubi Katou-Indel vocatur, & in notis Palma fylveftris,

Mala-

Malabarica, folio acuto, fructu Pruni facie. vide & *Fl. Malab. pag.* 50. HININDI Zeylonensibus dicitur.

PANAGHAS. *Mus. Zeyl. pag.* 5.

PAPAYA, foemina. *Nobis.* Papaya. *Mus. Zeyl. pag.* 66. Papaya Melo-peponis effigie. *Plum. pag.* 659. Pepo arborescens, seu Papaya Orientalis, foemina sive fertilis. *Col. in Rech. pag.* 870. *Par. Bat. Pr. pag.* 362. & *Fl. Malab. pag.* 51. Arbor Melonifera. *Mus. Zeyl. pag.* 58. & *Bontii pag.* 159. Papaya Peruviana. *J. B. tom.* 1. *pag.* 147. *Mus. Zeyl pag.* 60. Papayamaram *H. Malab. part.* 1. *Fig.* 15. ubi *pag.* 24. vide notas, & *Merian. insect. Surin. pag.* 40. Papaya major, flore & fructu majoribus, pediculis curtis insidentibus. *Sloan Cat. pl. Jam. pag.* 202. qui plurima habet synonyma. vide & *Hist. Jam. vol.* 2. *pag.* 164. Mamaera Foemina *Park. Theat. pag.* 1649. *Ray. hist. pl. pag.* 1370. PAEPOL & PAPOLGHAHA Zeylonensibus.

PAPAYA mas. *Boerh. Ind. Hort. Lug. Bat. part.* 2. *pag.* 170. Mamaera mas. *Parkins. Th. pag.* 1649. *Clus. cur. poster. pag.* 80. Pepo arborescens mas seu sterilis. *Par. Bat. Pr. pag.* 362. *Fl. Malab. pag.* 52. Amba Paya *H. Malab. part.* 1. *Tab.* 15. ubi in notisPapaya Orientalis mas seu sterilis a *Commel.* vocatur. Pinoguacu mas. *Pison pag.* 159. Quum auctores has separavere, & nos eos secuti fuimus, est autem proprie una eademque arbor, ut Cannabis mas & foemina est una eademque planta. Unde & alii melius has combinarunt, ut fecit *Plukn. in Almag. Botan. pag.* 145. ubi vocatur Ficus arbor utriusque Indiae Platani foliis, μονοτελεχής, fructu Mali Cydonii aut Melonis magnitudine, & utriusque Figuras exhibet in *Phyt. Tab.* 278. *Rumphius in Herbar. Ambon. lib.* 1. *cap.* 44. utrasque conjungens describit, & simul etiam exhibet earum figuras, nomine Papajae Maris & Foeminae.

PARONYCHIA foliis ad genicula confertis, acutis, floribus umbellatis. *Nobis. Tab.* 65. *Fig.* 2. Limonium Zeylanicum, folio minutissimo, habitu toto quasi argenteo. *Herb. Hart.* Gramen pratense, Gallii folio, umbella alba, florida, Amaranthoide. *Mus. Zeyl. pag.* 42. Gramen Zeyl. pratense, Gallii foliis, umbella alba, sparsa, Amaranthoide. *Herb. Herm.* Gramen Zeylanicum, album, parvum, umbellatum. *Mus. Zeyl. pag.* 64. Amarantus Zeylanicus, umbellatus, folio Lari-

Laricis, umbella fere candida. *Muſ. Zeyl. pag.* 29. Amarantus folio tenuiſſimo, incano, Molluginem aemulante, umbellatis floribus, incarnatis, rigidis, Zeylanica. *Boccone. Muſ. pag.* 44. *Tab.* 39. Elichryſo affinis herba Indica, Polygonoides, ramoſior, foliolis caulium nodos radiatim ambientibus, coma paleacea, flore albo, lituris aureis ſtriato. *Plukn. Phyt. Tab.* 86. *Fig.* 6. Polygonum ſericeum, ramoſius, Indicum, foliolis Gallii inſtar caulem cingentibus &c. *Mantiſſ. pag.* 154. KIRIHAENDA Zeylonenſibus.

Ex radice cinerea, fibrilloſa, ſatis firma pro Plantae magnitudine, oritur caulis teres, articulatus, pubeſcens, cui folia ad articulos plura adnaſcuntur, decem, plura, vel pauciora, Linariae aut Molluginis forma, acuminata, ſquammis albicantibus ejusdem formae mixta: Rami ad articulos interdum emittuntur ſolitarii, quo magis verſus ſummitatem, eo frequentiores; ad ſummum autem caulis nulla fere folia conſpiciuntur, ſed caulis dichotome dividitur, & flores confertos, tanquam in umbella continet. Horum florum calix eſt quinquefolius, oblongo-acutus, albus, nitidus, inmarceſcens, petala quinque omnium minima, vix viſibilia, ſubrotunda, ſtamina florum itidem quinque, minima, ſemen unicum apparet fere triquetrum, breve, unde proxime ad Paronychias, licet cum Polygono in plurimis etiam conveniat. Exilitas autem florum examen vix permittentium effecit, ut tot ac tam variis inſignita ſit haec planta nominibus, nec hactenus bene expreſſa fuerit.

PATSJOTTI Zeylanica, Lauro-Ceraſi folio laeviter ſerrato. *D. Petiv. Act. Phil. Lond. vol.* 22. *no.* 271. *pl.* 98. & apud *Ray. tom.* 3. *dendr. pag.* 49. Katou-Patsjotti. *H. Malab. part.* 5. *Tab.* 7. qui eſt Frutex baccifer, Malabaricus, fructu, calice excepto, ſulcato, tripyreno. *Ray. hiſt. pl. pag.* 1572. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 30. huc ſpectat Arbor Africana, ſubrotundo folio, margine denticulis acutis aſperato, floribus pentapetalis, atro-purpureis. *Plukn. Phyt. Tab.* 263. *Fig.* 1 & 2. ſeu Baccifera Indica, fructu umbilicato, racemoſo, monopyreno. *Ray. hiſt. pl. pag.* 1498. & Patsjotti *Malab. Commel. Fl. Malab. pag.* 12 & 51.

PEPO Indicus, reticulatus, ſeminibus albis, major. *H. L. Bat. pag.* 482. Cucurbita Zeylanica, reticulata, major, ſeminibus albis, *Luffa* Arabum *Veſling. Muſ. Zeyl. pag.* 62. Cucumis Ægyptius, reticulatus,

 ſive

five Luffa Arabum. *Veflin. in Alpin. pag.* 48. ubi ejus Figura cum defcript. *Moris. Hift. pl. tom* 2. *pag.* 35. Cucumis, rectius Pepo Ægyptius, reticulatus, feu Luffa Arabum. Vefling. *Ray. hift. pl. pag.* 640. WAETHAKOLU Zeylonenfibus.

PEPO Indicus, reticulatus, feminibus albis, minor, TITTAWAETHA Zeylonenfibus. *H. L. Bat. pag.* 482. *Ray. hift. pl. pag.* 1874. Cucurbita Zeylanica, reticulata, minor, feminibus albis. *Muf. Zeyl. pag.* 63. ubi WATTAKOLA Zeylonice dicitur.

PEPO Indicus, reticulatus, feminibus nigris, minor. *H. L. Bat. pag.* 482. *Plukn. Almag. pag.* 286. Pepo Zeylanicus, reticulatus, & fulcatus, femine nigro, *Par. Bat. App. pag.* 11. *Ray. hift. pl. tom.* 3. *pag.* 332. ubi ejus defcriptio. Luffa Zeylanica, fructu oblongo, femine nigro. *D. Tilly.* quo nomine ab egregio illo Botanico miffa fuere hujus plantae femina.

PERICLYMENUM Indicum, foliis maculatis, latioribus, Laurinis. *Nobis.* Periclymenum Zeylanicum, herbaceum, foliis variegatis, diverficoloribus maculis ornatis. *Par. Bat. Pr. pag.* 363. *Muf. Zeyl. pag.* 37. *Plukn. Phyt. Tab.* 212. *Fig.* 6. Tsjude-Maram *H. Malab. part.* 6. *Tab.* 60. Periclymenum Sinenfe, variegatum, flore fanguineo, amplo, quod Lignum Colubrinum optimum, Zeylanicum, Hermanni *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 82. *Commel. Fl Malab. pag.* 52. qui Frutex Indicus, flore papilionaceo, fanguineo, foliis pinnatis, fructu viduus. *Ray. hift. pl. pag.* 1733. Clematis Indica, foliis Lentifcinis, candidis maculis adfperfis. *C. B Pin. pag.* 301. Ligni Colubrini tertium genus. *Garziae ab Horto pag.* 164 a plurimis auctoribus huic Periclymeno pro fynonymo juncta fuit Clematis Indica, foliis Perficae, fructu Periclymeni. *C. B. P.* & Lignum Colubrinum primum & laudatiffimum *Garziae.* quod plane ab hoc diverfum eft, quippe quod nec habeat folia variegata, nec flores magnos fanguineos in fpica collectos; fed folia glabra, viridia, & flofculos parvos, pentapetaloides perfecte ut *Liguftri.* unde & illam ad *Liguftrum* reduximus, ubi fupra ejus defcriptio & Figura juxta plantam *Herbar. Herman.* in ipfa Zeylona ab illo viro collectam confuli poteft, quae multum ab hac planta differt, & puto huic convenire tertium Ligni Colubrini genus *Garziae*, nec non Clematis



PIPER, qui Saururus foliis septinerviis, oblongo-acuminatis. Nobis.

PERIPLOCA foliis angustis, acutis, glabris. Nobis.

matis Indica, foliis Lentifcinis variegatis *C. B. P.* quod fi *Garziae* defcriptio perfectior, & abfoluta effet, pro certo determinari melius poffet.

PERICLYMENUM Indicum, foliis maculatis, anguftioribus, Salicinis. *Nobis.* Periclymeni; fpecies, foliis maculatis ex monte Adami, quae Colubrina Zeylanica. *Muf. Zeyl. pag.* 55. an Periclymeno Sinenfi variegato fimilis frutex, longo, angufto folio, variegato, Sinicus. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 82. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 52? quod eft Tsjere-Maram *H. Malab. part.* 6. *Tab.* 61. NAGHAWAELI Zeylonenfibus, a *Nagha* Colubro appellato, cujus ictus hujus plantae folia mirifice & fpecifice fanant.

PERIPLOCA foliis anguftis, acutis, glabris. *Nobis. Tab.* 83. *Fig.* 1. Periploca Zeylanica perfoliata, Salicis folio. *Herb. Hart.*
Sarmentofa haec planta caulem habet rotundum, cinereum, fcabrum, tuberculis minimis plurimis obductum, ex cujus geniculis folia fere feffilia, bina fibi oppofita proveniunt glabra, fuperne laete viridia, inferne pallida & cinerea, oblonga, acuta, integra, venofa, ad horum alas apparent flofculi arcte cohaerentes, plurimi, calicibus minutiffimis contenti pentapetaloides, ftamina minima, quinque coalita, cum gemino piftillo minimo habentes, quibus fuccedunt filiquae, ut in aliis hujus fpeciebus.

PERSICA Indica, fructu villofo *Manghas* vocato. *Muf. Zeyl. pag.* 54. Perficae fimilis putamine villofo, AMBA Zeylonenfibus. *ibidem.* & *C. B. Pin. pag.* 440. reliqua vide fupra ad *Mangiferam* arborem. *pag.* 152.

PHASEOLUS vifcofus, fpicato flore, ac fructu villofo. *Nobis. Tab.* 84. *Fig.* 1. Hedyfarum Zeylanicum, triphyllum, rotundiori folio, flore coeruleo. *Herb. Hart.* Hedyfarum Zeylanicum, trifoliatum, vifcofum, Phafeoli folio fubrotundo, filiculis compreffis, hirfutis. *Muf. Zeyl. pag.* 36.
Gerit haec Phafeoli fpecies caules villofos, e purpureo nigricantes, villis undique tenuiffimis tanquam lanugine quadam obductos, rotundos, vifcofos; folia ex illis erumpunt unciali, firmo, fimilique cum caule fuffulta pediculo, terna, fubrotunda, bina inferiora oppofita, & minora, tertium fuperius & majus in acutiorem apicem de-

finit. Folia haec parte fuperiore funt glaberrima, venofa, obfcure virentia, inferiore vero incana & lanuginofa. Caulis fummum terminant flores in longiffimis fpicis porrecti, parvi, papilionacei, coerulefcentes, gemini oppofiti, fat magnis calicibus contenti, & pediculis fere femiuncialibus fuffulti, quibus fuccedunt filiculae tenues, incanae, hirfutiffimae, & undique quafi molli lanugine obductae, in acutiffimum mucronem definentes, quae quum juftam in noftra planta nondum acquifiverunt maturitatem, de earum magnitudine, feminibusque nihil dicimus: in omnibus tamen cum reliquis Phafeoli fpeciebus convenit haec planta.

Phaseolus Zeylanicus, tomentofus, Salviae foliis, lobis parvis, oblique articulatis, alter. *Muf. Zeyl. pag.* 7. Phafeolus Zeylanicus, Salviae foliis fubrotundis, mollibus & hirfutis. *Par. Bat. Pr. pag.* 364. Orobus Phafeoloides Zeylanicus, foliis Salviae, rotundis, incanis, fubhirfutis. *ibidem. pag.* 359. Phafeolus minor, Bisnagaricus, foliis argenteo-villofis, filiquis torofis, brevibus, fpadicea hirfutie pubefcentibus, fructu parvo, Scaraboide, nigro. *Plukn. Phyt. Tab.* 52. *Fig.* 3. an Nir-Pullari *H. Malab. part.* 9. *Tab.* 36? WAELUNDU & WAELUNDUWAEL Zeylonenfibus.

Phaseolus exiguus, glaber, Trifolii foliis, filiqua plana, compreffa, *Nobis. Tab.* 84. *Fig.* 2. Phafeolus Zeylanicus, minimus, flore rubello, filiqua minima. *Herb. Hart.*

Caules hujus plantae funt filiformes, tenuiffimi, longiffimi, laeves; folia unciali fpatio remota nafcuntur terna, Trifolii figura ac forma, fubrotunda, magis tamen obtufa & fere deltoidea, petiolis tenuiffimis infidentia; ex foliorum autem ala enafcitur petiolus communis, triuncialis, flores continens fecundum longitudinem pofitos, parvos, rubellos, papilionaceos, qui tandem abeunt in filiquas parvas, obtufas, planas, glabras, nigras, difpermas, rarius trifpermas, quae femina continent fubrotunda, reniformia, glabra, nigra, fplendentia.

Phaseoli villofi fpecies, BUMUM & BUNCAE Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 22. forte Phafeolus Maderasp. cauliculis pilofis, fcandens, Paffiflorae modo trilobatus &c. *Plukn. Almag. pag.* 292. *pl.* 5. & *Phyt. Tab.* 120. *Fig.* 7. BUNUM dicitur a *Bu*, quod notat capillos teneros, feu villos; hujus & alia datur fpecies laevis, fine villis, ut notatur in *Muf.*



PHASEOLUS exiguus, glaber, Trifolii foliis, siliqua plana, compressa. Nobis.

PHASEOLUS viscosus, spicato flore, ac fructu villoso. Nobis.

Muf. Zeyl. qui eft forte Phafeolus Maderasp. foliis glabris, trilobatus, floribus exiguis, longis petiolis ex eodem puncto gemellis. *Plukn. Phyt. Tab.* 214. *Fig.* 3.

Phaseolus Indicus, AVARAPALU dictus. *Muf. Zeyl. pag.* 49. Phafeolus Indicus, lobis bullatis, dorfo trifido alato. *ibidem.* & *pag.* 53. Phafeolus Zeylanicus, fylveftris minor, lobis hirfutis, torofis *D. Hermans* apud *Ray. tom.* 3. *pag.* 438. ubi additur, Folia huic fatis lata funt, apicibus fubrotundis. Flores e foliorum, alis exeunt plures fimul in pediculis communibus, brevibus, minimis, foliolis fuppofitis. Huc fpectat Phafeolus erectus, minor, filiqua tereti, ventricofa, pallide flavefcente, femine albo. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 72. & *Hift. Jam part.* 1. *pag.* 183.

Phaseolus fylvaticus, filiquis anguftis. *Muf. Zeyl. pag.* 43. Phafeolus Zeylanicus, tenellus, filiquis anguftis. *ibidem. pag.* 44. an Paeru *H. Malab. part.* 8. *Tab.* 41? qui Phafeolus Indicus, trifoliatus minor, flore coeruleo, fructu minore, in notis vocatur *pag.* 81. & *Fl. Malab. pag.* 54. Phafeolus Indicus, trifoliatus, minor, flore coeruleo, filiqua longa, anguftiffima, fabis membranis transverfis diffeptis, apud *Ray. tom.* 3. *pag.* 444. WALLUNAE Zeylonenfibus. *Lunae* notat fpeciem Phafeolorum longiffimorum.

Phaseolus fylvaticus, lobis anguftis, longiffimis. *Muf. Zeyl. pag.* 43. quae prioris varietas habenda, vel forte eadem.

Phaseolus Zeylanicus, fylveftris, maximus, *Muf. Zeyl. pag.* 44. an Bara-Mareka *H. Malab. part.* 8. *Tab.* 44? qui Phafeolus Indicus, trifolius, filiqua longa, grandi, fabis efculentis. *Ray. tom.* 3. *pag.* 445. ut & Phafeolus maximus, filiqua enfiformi, nervis infignita, & femine albo, membranula inclufo. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 68. ubi plura habet fynonyma. MAHAUWARUPALU Zeylonenfibus.

Phaseolus Zeylanicus, marinus, folio pingui, & craffo. *Muf. Zeyl. pag.* 43. Phafeolus Zeylanicus, marinus. *ibidem. pag.* 44. Phafeolus Zeyl. marinus, craffus, an Flos Thomeus? *ibidem. pag.* 54. Phafeolus Indicus, maritimus, perennis, foliis craffis, fubrotundis, minor. *Par. Bat. Pr. pag.* 364. & *Fl. Malab. pag.* 53. Catu Bara. Mareca *H. Malab. part.* 8. *Tab.* 45. qui Phafeolus trifolius, Indicus, filiqua grandi,

 recurva,

recurva, fabis craffis, ovalibus, noxiis. *Ray. tom.* 3. *pag.* 446. huc fpectat Phafeolus maritimus, rotundifolius, flore purpureo, filiqua brevi, criftata, femine fufco, ftriato. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 69 &c. *Strantrottang* Vulgo. MUNDUMAE Zeylonenfibus.

PHASEOLUS marinus, floribus flavis, folio molli, albo, eduli, Zeylanicus. *Muf. Zeyl. pag.* 68. Phafeolus maritimus, folio molliori. *ibidem, pag.* 27. ÆTHAKOLA Zeylonenfibus.

PHASEOLUS erectus, caule & folio rigidis, flore pallide luteo, filiqua craffa & ampla. *Boerh. Ind. in Octavo pag.* 152. qui femine eft variegato, & idem femine albo, in ejus *Ind. H. L. B. part.* 2. *pag.* 28. Phafeolus orthocaulis *Fabii Colum.* an fructus niger Coriandro fimilis *C. B. Muf. Zeyl. pag.* 48? Phafeolus Perficus, orthocaulis, filiquis hirfutis, Lupino minoribus *ibidem. pag.* 63. hujus videtur varietas. Phafeolus orthocaulis, Mungo Perfarum, Turcarum Mafc, Hispanorum Max, *Fab. Col. in Recch. pag.* 887. ubi icon & defcript. & *Amm. Char. pl. pag.* 480. Phafeolus erectus, hirfutus, caule quinquangulari, auriculato, flore viridi, lutefcente, filiqua in roftrum incurvum definente. *Plukn. Almag. pag.* 290. Mungo *Cluf. lib.* 2. *cap.* 21. MUN & MUNG Zeylonenfibus.

PHASEOLUS Zeylanicus, leguminofus, lobis longis, anguftiffimis, MAE-MUNG, Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 67. Phafeolus hirfutus, flexicaulis, *Mungo* affinis, caule tereti &c. *Plukn. Almag. pag.* 290. MAE-MUNG hoc eft *Mung* volubilis. *Mung* enim denotat Phafeolum orthocaulem, ut dicitur in *Muf. Zeyl. pag.* 67.

PHASEOLUS Zeylanicus, lactefcens, fructu fufco, fplendente, figura renum KIRIPUSWAEL Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 49. an Phafeolus minor, lactefcens, flore purpureo? *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 71 & *Hift. Jam. part.* 1. *Tab.* 114. *Fig.* 4. vide & *Ray. hift. pl. pag.* 442. ubi ejus defcriptio. KIRIPUSWAEL, id eft *Puswael* lactefcens, ut explicatur in *Muf. Zeyl. loco citato.*

PHASEOLUS Zeylanicus, MEKARAL dictus. *Muf. Zeyl. pag.* 59.

PHASEOLUS Zeylanicus, minor, fructu parvo, albo. *Heift. Cat. pl. H. Acad. Jul. ann.* 1731. *pag.* 17.

PHA-

PHASEOLUS Indicus, fructu ex albo, & nigro variegato. *Muf. Zeyl. pag.* 59. an Phafeolus peregrinus, octavus, feu anguftifolius alter, fructu ex albo & nigro vario. *C. B. P. Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 67. & *Hift. Jam. part.* 1. *pag.* 176?

PHASEOLUS Indicus, hortenfis, aureo fructu, fpadiceo hilo, oblongo, albo prominente. *Muf. Zeyl. pag.* 60. Lablab fpadiceum *ibidem*. Phafeolus Zeylanicus femine duro, fufco, lituris fpadiceis variegato. *Plukn. Almag. pag.* 291. Phafeolus Guinenfis, fructu fufco, fpadiceo. *C. B. Pin. pag.* 341. HINDAMINI Zeylonenfibus.

PHASEOLUS Indicus, lobis utraque extremitate fimbriatis. IRIWYA Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 63.

PHASEOLUS Indicus, lobis villofis, pruritum excitantibus. *Muf. Zeyl. pag.* 60. Phafeolus Indiae Orientalis, filiquis plurimis, hirfutie pungentibus, faba magna Oftream referente. forte Kaku-Valli *H. Malab. part.* 8. *Tab.* 36. apud *Plukn. Almag. pag.* 292? Kaku-Valli *H. Malab.* a *Commel.* in notis vocatur Phafeolus Indicus, filiqua majore pungente & in *Fl. Malab. pag.* 53. apud quos reliqua vide fynonyma, & *Ray. hift. pl. tom.* 3. *pag.* 444 ut & *Sloan. Catal. pl. Jam. pag.* 68. planta quarta, quae eft Phafeolus Brafilianus, frutefcens, lobis villofis, pungentibus, maximis. *Par. Bat. Pr. pag.* 363. &c. MANGULKARANDU Zeylonenfibus.

PHASEOLUS Zeylanicus, lobis undiquaque pilofis, fructu lucido, nigro. *Muf. Zeyl. pag.* 67. Phafeolus Orientalis, pruritum excitans hirfutie filiquarum, fructu nigro, fplendente. *Plukn. Almag. pag.* 292. Phafeolus utriusque Indiae, lobis villofis, pungentibus, minor. *Par. Bat. Pr. pag.* 364. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 69. Phafeolus Zurattenfis, villofus, filiqua hirfuta, pungente. *Parkin Moris. hift. Oxon. pag.* 69. *Amm. H. Bofian. pag.* 27. & *Char. pl. pag.* 467. Phafeolus Zurattenfis, filiqua hirfuta *Couhage* dicta. *Ray. hift. pl. pag.* 887. & *tom.* 3. *pag.* 444. & *Fl. Malab. pag.* 53. Phafeolus filiqua hirfuta *Parkins Theat. pag.* 1056. ADSARYAPALA Zeylonenfibus, ab *Adfari*, quod fabrum ferrarium notat, forte quod femina fint nigri coloris.

PHASEOLUS Indicus, herbaceus, lobis villofis pungentibus, minor. *Muf.*

Muf. Zeyl. pag. 69. Phafeolus Americ. foliis molli lanugine obfitis, filiquis plurimis hirfutie pungentibus, femine fufco, punctato, *Plukn. Phyt. Tab.* 214. *Fig.* 1. Phafeolus hirfutus, virgatus, prurigineus. *Plum. Cat. pl. Amer. pag.* 8. Phafeolus Indicus, filiquis anguftis, hirfutis, fabis fpadiceo fufcis, membranis intercedentibus fejunctis, *Ray. tom.* 3. *pag.* 444. Putsja-Peru *H. Malab. part.* 8. *Tab.* 37. qui eft Phafeolus Indicus, hirfutus, flore luteo, filiqua angufta, parva, hifpida. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 82. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 53. Phafeolus fylveftris, minor, flore minimo, filiquis longis, teretibus, alba lanugine hirfutis. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 71. Cacara, pruritus. Cacara Gattal, Maagde-kruyt. *Rumph. Herbar. Ambon. lib.* 9. *cap.* 34. ubi a capite 20 plurimas defcribit & depingit Phafeolorum fpecies. WANDURUMAE Zeylonenfibus.

PHASEOLUS arboreus, tetraphyllus, Zeylanicus, Horti Regii aulae Hampton. *Plukn. Phyt. Tab.* 211. *Fig.* 5. & *Ray. tom.* 3. *pag.* 438.

PHASEOLUS Zeylanicus, folio longo, filiqua tenui, femine parvo, pallido. *Boerh. Ind. H. L. Bat. part.* 2. *pag.* 29.

PHASEOLUS Zeylanicus, folio longo, filiqua tenui, femine violaceo, pallido. *Boerh. ibidem.* Phafeolus Zeylanicus, femine parvo, violaceo. *Heift. Catal. pl. H. Acad. Jul. ann.* 1732. *pag.* 17. ubi & Phafeolaftrum, flore ex coeruleo, & albo vario, filiqua tenui, tereti, femine parvo, violaceo, vocatur.

PHASEOLUS Zeylanicus, filiquis radiatim digeftis. *Dillen. H. Elth. pag.* 315. *Tab.* 235. *Fig.* 304. &c.

PHYLLITIS repens, fcandensve, foliis longis, anguftis. *D. Scherard.* apud *Ray. tom.* 3. *pag.* 52. ubi ejus defcriptio. Lingua Cervina forte fcandens, anguftis & undulatis foliis. *Plum. Cat. pl. Amer. pag.* 15. Phyllitis forte minor, fcandens, foliis anguftis. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 15. & *Hift. Jam. part.* 1. *pag.* 73. & *Plukn. Phyt. Tab.* 290. *Fig.* 3. & *Almag. pag.* 156. &c.

PHYLLITIS minor, fcandens, Salicinis foliis, acuminatis, viridibus *D. Scherard* apud *Ray. tom* 3. *pag.* 53. & *Bobart. Hift. Oxon. tom.* 3. *pag.* 558. Phyllitidi fcandenti affinis minor, graminifolia, folio oblongo,

go, acuminato, foliorum pediculis alis extantibus auctis. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 15. & *Hist. vol.* 1. *pag.* 75. *Tab.* 27. *Fig.* 2. huc fpectat Lingua Cervina fcandens, & ramofa, Citrii foliis minor. *Plum. Cat. pl. Amer. pag.* 15.

PIHAEMBURU adnafcens arboribus putridis. *Muf. Zeyl. pag.* 2.

PIPER, qui *Saururus* foliis feptinerviis, oblongo-acuminatis. *Nobis. Tab.* 83. *Fig.* 2. Piper Indicum, fylvaticum. *Muf. Zeyl. pag.* 20 & 24. Piper Zeylanicum, fylveftre. *Herbar. Gronov.* qui nobiscum hanc plantam a *D. Scherardo* quondam acceptam communicavit. Piper longum arboreum, altius, folio nervofo, minore, fpica graciliore & breviore. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 44. & *Hift. Jam. vol.* 1. *pag.* 134. *Tab.* 87. *Fig.* 1. *Plukn. Mantiff. pag.* 151. Piper longum, fylveftre. *Ray. tom.* 3. *pag.* 641. ubi elegantem Piperis longi in genere ex hiftoria naturali *Sloane* vide defcriptionem. Amolago *H. Malab. part.* 7. *Tab.* 16. quod Piper longum, anguftiffimum, ex Florida. *C. B. Pin. pag.* 412. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 54. ubi & alia vide fynonyma. an Piper fpica longa, gracili. *Plukn. Phyt. Tab.* 215. *Fig.* 2? cujus in *Almag. pag.* 297. vide fynonyma. an Planta Julifera, aromatica, in uliginofis crefcens locis *D. Banift.*? huc & pertinet Sirium Decumanum, Siri Tallang. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 7. *cap.* 24. vel Siriboa ejusdem *lib.* 9. *cap.* 3. WALLANRADHU & WALMIRIS Zeylonenfibus. De hoc annotatur in *Muf. Zeyl. pag.* 20. quod folia inponantur vulneribus fordidis, & quod fint inftar foliorum *Beteles* tribus nervis donata. qui plures & quidem feptem numero diftincti in noftra apparent planta. Cujus folia funt fcabra, lata, acuto-oblonga, folitaria, alternatim provenientia, pediculis brevibus cauli adhaerentia; qui caulis farmentofus eft, fcaber, angulofus, nigricans, geniculatus, ubi flores e directo foliis opponuntur, ab altera nempe caulis parte, ubi folia erumpunt, provenientes, qui duplo longioribus fpicis infident fpicati, minimi, arctiffime collecti, minima femina dantes in unam quafi caudam aggregata, perfecte inftar Ranunculi illius, qui Cauda Muris vulgo dicitur.

PIPER rotundum ex Malabara, foliis latis, quinquenerviis, albicantibus. *Muf. Zeyl. pag.* 32. quod forte Piper Benghalenfe. *ibidem. pag.* 64. Molago-Codi *H. Malab. part.* 7. *Tab.* 12. quod Piper rotundum, ni-

grum, & album. *C. B. Pin. pag.* 411. *Commel. Fl. Malab. pag.* 54. *Parkins Theat. Botan. pag.* 1603. Piper nigrum *Cluſ. aromat. lib.* 1. *cap.* 22. *pag.* 183. Peponero *Acoſt. pag.* 15. Lada, aliis Molanga, five Piper mas & foemina. *Piſon. Mantiſſ. arom. pag.* 180. qui docet album & nigrum ejusdem plantae eſſe fructus, album ſcilicet ante inſolationem decorticari; quod confirmatur ex *H. Malab.* ubi dicitur, *cortice nigro ablato, ſit Piper album.* &c.

PLANTA folia habens oblongo-rotunda, forſan *Telelu* ſeu Cochleariae ſpecies, KERATYA dicta. *Muſ. Zeyl. pag.* 19.

PLANTA foliis geminatis, ex oppoſito longis pediculis inter bina folia capreolo donatis. *Muſ. Zeyl. pag.* 26. An Clematis Myrſinites, amplioribus foliis, Americana, forte Tety-Pote-iba Braſilienſibus, ſeu Vitis arbuſtina *Piſonis pag.* 250. apud *Plukn. Phyt. Tab.* 163. *Fig.* 2? NARAWAL & OKUWAEL Zeylonenſibus.

PLANTA parva, foliis Hyacinthi, floribus in umbella parvis. *Muſ. Zeyl. pag.* 27.

PLANTA pluribus foliis triquetris, inſtar Graminis Cyperini ſummitate foliorum in plurima folia biuncialia diviſis. *Muſ. Zeyl. pag.* 27.

PLANTA ſcandens, foliis latis, ſubrotundis, in acumen deſinentibus, ſubtus lanuginoſis, quatuor nervis donatis. *Muſ. Zeyl. pag.* 27.

PLANTA ſemine Althaeae. *Muſ. Zeyl. pag.* 31.

PLANTA ſpicata, floribus coeruleis HULUNAYKOLA dicta. *Muſ. Zeyl. pag.* 32. & *pag.* 2 & 4. Sic vocatur, quod folia ejus referant formam alicujus Colubri capellati minoris, *Hulunay* dicti. *pag.* vero 21. alia hujus ſpecies memoratur, quae longe humilior eſt, ac ſpica ſemunciali.

PLANTA ſcandens, Hederaceis foliis, Zeylanica. *Breyn. Eph. Germ. ann.* 4 & 5. *obſerv.* 137. & *Ray. hiſt. pl. pag.* 1914.

PLANTAGINELLAE aureae Alopecuroidi Braſilianae ſimilis, Zeylanica. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 84. *Plukn. Mantiſſ. pag.* 152. Plantaginella vero aurea Alopecuroides, Braſiliana, foliis gramineis ab eo exhibetur in *Cent. pag.* 108. ubi ejus iconem vide ac deſcriptionem.

PLA-



POLYGALA *frutescens Lavandulae folio viridi, flore coeruleo. Nobis.*

PLATANUS Zeylanica, pilulis fetaceis, miniatis, Cerafi magnitudine in fpica difpofitis. GAEDAWAKKA Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 25.

PLUMBAGO Zeylanenfis, folio fplendente Ocymaftri, flore lacteo. *Boerh. Ind. H. L. Bat. part.* 1. *pag.* 77. Lychnis Indica, fpicata, Ocymaftri foliis, fructibus oblongis, lappaceis, radice urente. *H. Amft. tom.* 2. *pag.* 169. Lychnis Indica, fpicata, Ocymaftri folio, fructibus hifpidis, flofculis albis, radice urente. *Muf. Zeyl. pag.* 10 & 51. Lepidium dentillaria dictum, flore albo parvo. *ibidem pag.* 32. ELARATHNETHUL Zeylonenfibus. *Cuddi-Veru* Malabaris. *Ela* denotat album, *Rathnethul* vero aliam fpeciem huic fimilem, radice autem & floribus diverfam. ut notatur in *Muf. Zeyl. pag.* 10. Quae eft

PLUMBAGO Zeylanica, folio fplendente Ocymaftri, flore rubro. *Herb. Hart.* RATHNETHUL *Muf. Zeyl. pag.* 51. ubi dicitur: radix recens dulcefcit, acris eft, & corrodens, unde veficulis excitandis frequens eft. Cinghali eam contufam inponunt vulneribus a Colubris, aliisque venenatis inflictis. Generis hujus Characterem habet *Linnaeus in Char. pl. gen. pag.* 44.

POLYGALA frutefcens Lavandulae folio viridi, flore coeruleo. *Nobis. Tab.* 85. Polygala Zeylanica, Rorismarini folio, flore coeruleo. *Herb. Hart.* Peculiare huic frutici eft, quod ubi inferior craffiorque ramorum pars e trunco exit, ibi penitus fit albicans & fplendens, usque ad exortum foliorum, ubi enim illa progerminant, rami omnes viridi teguntur cortice, qui plurimi diffufi, & vario modo fparfi, tenues emittuntur, foliolis fparfis nunc folitariis, nunc oppofitis inftructi: Folia autem funt integra, oblonga, viridia, glabra, majora, ad quorum infertionem faepe etiam minora propullulant; flores ex alis foliorum folitarii provenientes, petiolis infident tenuiffimis, qui funt papilionacei, coloris coerulei, admodum caduci. reliqua ut *Polygalae.*

POLYPODIUM exoticum, folio Quercus *C. B. Pin. pag.* 359. *Muf. Zeyl. pag.* 7 & 71. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 85. Polypodium Indicum. *Cluf. exot. lib.* 4. *cap.* 17. Panna-Kelengo-Maravara. *H. Malab. part.* 12. *Tab.* 11. quod Polypodium Indicum, foliis latiffimis. *Commel. in notis.* & *Fl. Malab. pag.* 55. Polypodium Indicum, Simbar. *Rumph.*

 Herb.

Herb. Ambon. lib. 10. *cap.* 55. BEDURU & BENDURU Zeylonenſibus *Muſ. Zeyl. pag.* 7. ubi dicitur: Folia inferiora Quercus faciem habent, ſuperiora Polypodii noſtratis. *Grimm. in Labor. Ceyl. pag.* 124. ad caput de Polypodio Indico haec habet: ad uſum Europaeorum tranſportatur, ſyrupum nobis exhibet, qui multum confert in morbo Gallico, Scabie, Ulceribus corroſivis, Morbis Melancholicis, Cachexia, Ictero & ſimilibus, vel ſolus vel cum aliis Medicamentis commixtus.

POLYPODIUM vario modo diviſum; acutum, & obtuſum. *Nobis. Tab.* 86. Polypodium ex locis opacis gloreoſis. *Herb. Herman.* huc ſpectat Filix Hemionitis trifida, & quinquefida, bullatis foliis, ex Inſula Johanna. An forte de genere Polypodiorum? *Plukn. Mantiſſ. pag.* 82: quae in *Amalth. pag.* 94. vocatur Filix Hemionitis, Phymatodes, id eſt, cum exanthematis pulverulenta, foliis trifidis & quinquefidis, ſegmentis anguſtioribus in acutiſſimum & valde prolixum mucronem abeuntibus, ex Inſula Joanna. cujus Figura exhibetur in ejus *Phytogr. Tab.* 404. *Fig.* 5. quae eadem cum *Fig.* 1. *illius Tabulae* videtur.

Noſtrae plantae folia ex radicibus petiolo tenui adſurgunt enſiformia, nunc obtuſiora, nunc acutiora, integerrima; Prope baſin duae, interdum unica lacinia eadem cum folii forma ad latera progerminat: Nervus folii craſſus per totam ejus longitudinem, & lacinias extenditur. Radix autem in tenuiſſima filamenta expanditur.

POLYPODIUM caule ſimplici, foliis ſimplicibus, variis, longis, ſerratis. *Nobis. Tab.* 87. Polypodium Zeylanicum, folio inferiori tripartito, ſuperiore ſingulari, longo, ad finem ſerrato, intermedio vero folio dupliciter diviſo. *Herb. Hart.* Filix Zeylanica, Polypodii facie. *Muſ. Zeyl. pag.* 35. Filicula Cheuſanica, ſeu Hemionitis multifido folio, tenuiſſime ſerrato, ad margines ſeminifera. *Plukn. Amalth. pag.* 94. *Phyt. Tab.* 407. *Fig.* 2. BENDURU Zeylonenſibus.

Variat haec admodum planta, prout rami ſunt adultiores & frugiferi, vel non: in prioribus folia ſunt longiſſima, tenuia, contracta, & ad finem tantum eorum ſerraturae apparent; in junioribus & nondum frugiferis folia ſunt lata, expanſa, ubique ſerrata. Caulis caeterum eſt ſpithamalis vel longior, folia pinnatim exeunt e caule, ſuperius ſimplicia, inferius communiter gemina, rarius terna, inferiori ſcilicet breviori. Pinnae ſecundum longitudinem ſerratae ſunt, magis tamen verſus



POLYPODIUM vario modo divisum; acutum, & obtusum. Nobis.



POLYPODIUM *caule ſimplici, foliis ſimplicibus, variis, longis, ſerratis. Nobis.*

verfus apicem: ad margines laterum prodeunt flofculi, ac femina pulverulenta, ibique retrotrahitur folium, adeoque ferraturam excludit.

PORTULACA minima aizoides, HINGHEDA dicta. *Muf. Zeyl. pag.* 62. forte Brami *H. Malab. part.* 10. *Tab.* 14. quae Glaux Indica, Portulacae folio, flore majore dilute coeruleo, albicante colore. *Commel. in notis* & *Fl. Malab. pag.* 33.

PORTULACA marina, major, baccifera. *Muf. Zeyl. pag.* 67. an Bafella *H. Malab.* fupra propofita? *pag.* 44.

POTHA. *Muf. Zeyl. pag.* 6. quae Elephantum efca *ibidem. pag.* 24. de qua dicitur: firmiffime adnafcitur arboribus, & maceriis, uti Hedera, fructus fert rotundos, rubros, edules, inftar Fragariae, ut notatur *pag.* 6.

PRUNUS Indica, fylveftris, fructu flavo, pyriformi, DEMATHA Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 3. Tani *H. Malab. part.* 4. *Tab.* 10. ubi vide notas, & quae Prunus Indica, racemofa, fructu pyriformi. *Ray. hift. pl. pag.* 1547. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 57. Fructuum putaminibus utuntur Cinghali loco Beteles, ut notatur in *Muf. Zeyl.*

PRUNUS Indica, fructu nigro, Olivae magnitudine, Jambolons *Acoftae*, MADAN Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 8. Jambolons defcripta breviter reperitur apud *Acoft. lib. aromat. pag.* 299. *in octavo*. huc fpectat Prunifera vel Nucifera, feu Nuci-Prunifera arbor Americ. praecelfa, anguftis Lauri foliis, laete virentibus, *Maftichen* odoratam fundens. *Plukn. Almag. pag.* 307. *Phyt. Tab.* 217. *Fig.* 5. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 180. & *Ray. tom.* 3. *Dendr. pag.* 42. ubi defcriptio.

PRUNUS Zeylanica, Lauri folio, VERALU Cinghalenfibus. *D. Hermans* apud *Ray. tom.* 3. *Dendr. pag.* 42. Prunus racemofa Celaftri folio. *Muf. Petiv. no.* 672. Sequenti modo breviter apud *Ray.* defcribitur. Flores veluti fpicati, plures fimul in communi pediculo è ramis undique exeunt nullo ordine. Folia Pruni, fed breviora, rotundiora & circa margines ferrata.

QUAMOCLIT foliis tenuiter incifis, & pinnatis. *Tournef. inft. pag.* 116. *Plum. Cat. pl. Amer. pag.* 3. Convolvulus elegans, tenuifolius, five

Indicus pennatus, *Munting Phyt. pag.* 505. Quamoclit, vel Convolvulus pennatus; foliis Myriophylli aquatici, exoticus, *Fabii Columnae. Amm. H. Bofian. pag.* 29. ubi defcriptio. & *Char. pl. pag.* 535. Convolvulus pennatus exoticus, rarior. Quamoclit apud *Fab. Columm.* occurrit *in obf. pag.* 72. Jasminum Millefolii folio *C. B. Pin. pag.* 398. *Muf. Zeyl. pag.* 47. Quamoclit, five Jasminum Americanum *Cluf. Cur. poft. pag.* 9. Quamoclit, five Convolvulus tenuifolius. *J. B. tom.* 2. *lib.* 15. *pag.* 177. Convolvulus tenuifolius, five pennatus Americanus. *Parkins Theat. pag.* 170. Convolvulus exoticus, annuus, foliis Myriophylli, feu Millefolii aquatici, flore fanguineo. *Moris hift. tom.* 2. *pag.* 20. *Commel. Fl. Malab. pag.* 21. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 58. Tsjuria-Caranti *H. Malab. part.* 11. *Tab.* 60. Flos Cardinalis, Bonga Tali. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 9. *cap.* 52. RATHABABA Zeylonenfibus, quod pronunciatur *Ratabamba* h. e. *Bamba* exotica; dicitur enim ex peregrinis locis miffam effe in Zeylonam, ubi fponte crefcit Alia *Bambae* fpecies non florens, Adianthi foliis, ut notatur in *Muf. Zeyl. pag.* 47. hujus generis characterem vide apud *Linnaeum in char. pl. gen. pag.* 47. qui novo nomine IPOMOEA hoc genus vocavit.

RADIX AMORIS Lufitanis; IRAMUSU Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 51. ubi additur; temperata eft radix, moderate adftringit, confortat, & fpiritus refocillat, ufus quoque in affectibus arthriticis & doloribus abdominis. Radix amoris a Portugalenfibus *Res de amour* vocata. *Grimm. Labor. Ceyl. pag.* 128. ubi haec habet: Planta eft graminofa, quae longe repit fuper terra, vel fi quid ipfi adjacet, cum eo convolvitur, & afcendit. Radix eft aromatica, maxime cum Caryophyllata noftra conveniens quoad faporem & odorem.

RHAMNUS Zeylanicus, folio fubrotundo, glabro, caulibus hirfutis, fpinis exiguis, ad ramorum & foliorum ortum exafperatus, flofculo fpadiceo, bacca nigra. *Nobis. Tab.* 88. Acaciae forte cognatus e Maderasp. frutex, Vitis Ideae Bengalenfis noftrae foliis, & ramulis alternis ad foliorum ortum fpinis exiguis exafperatus. *Plukn. Phyt. Tab.* 122. *Fig.* 4. huc & fpectat Lycium foliis fubrotundis, integris, fpinis & foliis ex adverfo fitis. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 171.
Pluknetii Figura cum noftra planta in plurimis convenit, fed quum flore fructuque deftituatur, incertum an eadem: noftram ex *Herbario* Clariff. *Hermanni* publici juris facimus, plantae vero nullum, quae fola fuit,



RHAMNUS Zeylanicus, folio ſubrotundo, glabro, caulibus hirsutis, spinis exiguis, ad ramorum & foliorum ortum exaſperatus, flosculo ſpadiceo, bacca nigra. Nobis.



RHUS *Zeylanicus trifoliatus, Phaseoli facie, floribus copiosis, spicatis. Nobis.*

fuit, quam fine nomine repperi, adfcriptum erat nomen, inftituto autem examine inveni veram effe *Rhamni* fpeciem, quae ramos habet tenues, flexiles, fubhirfutos, ramulos minores alternatim emittens, qui ramuli fimplices funt, ac foliis alternatis, glabris undique inftruuntur, quorum fingulum exacte ovatum, femiuncialis longitudinis, integerrimum, venis oppofitis conftans, petiolis linealibus infidet: ad fingulum folii egreffum fquammula quaedam rigida, aculeata, folium firmat, in folii autem ala fructificatio fit. Petiolo enim lineali folitarius infidet flofculus fpadiceus tetrapetalus, quem fubfequitur bacca nigra, cujus diameter tres lineas continet.

RHUS Zeylanicus trifoliatus, Phafeoli facie, floribus copiofis, fpicatis. *Nobis. Tab.* 89. Phafeolus Indicus, arborefcens, monofpermos, in lobo rubente, unicam proferens fabam. *Herb. Herm.* Phafeolus Indicus, arborefcens, monofpermos. *Muf. Zeyl. pag.* 39. Phafeolus arborefcens, Indicus, monofpermos, in filiqua rubente unicam tantum fabam proferens. *ibidem. pag.* 54. Phafeolus trifoliatus, frutefcens, monococcos, fructu adipofa mucagine. *Muf. Zeyl. pag.* 16. Arbor trifoliata, filiquofa, farmentofa, unicam continens fabam. *ibidem. pag.* 30. Phafeolus arborefcens, Zeylanicus, monocarpos *Hermanni*, RADELISAWAEL Zeylonenfibus apud *Ray. tom.* 3. *pag.* 438. ubi breviter fic defcribitur: Planta eft erecta, lignofa, trifolia, flores in fummis ramulis geftans, in virgis erectis, ramofis, numerofiffimos, qui quales fuerint in ficca a Dom. *Scherardo* communicata difcernere non potui, ad Phafeolum tamen, me judice, minus apte refertur. in *Muf. Zeyl. pag.* 16. RADALYA vocatur, quod pronunciatur *Radelie* a *Radah* quod lavatorem fignificat, ubi & fructus dicitur monococcos adipofa mucagine, unde dubito, an haec non fit varietas alterius, & de fucco illius plantae dicitur, quod membrorum fracturas fanet.
Noftra autem planta eft arborefcens, ligno conftans duro, rigido, cortice nigricante veftito, folia gerens fparfa, triplicata, fingulo petiolo communi infidentia, ovata, integra, craffa, & ut videtur, perennia: in apice caulis racemus florum inaequalis & divifus progerminat, flores gerens parvos, fubhirfutos, plurimos, ut in reliquis Rhois fpeciebus, quorum characterem exactiffime defignatum vide apud *Linnaeum in Char. pl. gen. pag.* 84.

RICI-

RICINOIDES Indica, folio lucido, fructu glabro, *Grana* TIGLIA Officinis dicto. *Herb. Hart. Tab.* 90. Ricinus arbor, fructu glabro, *Grana Tiglia* officinis dicto. *Par. Bat. Pr. pag.* 370. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 58. Ricinus arbor, Indica, caustica, purgans. *Muf. Zeyl. pag.* 15. Lignum Moluccense, seu Pavana *Garziae ibidem. pag.* 30. Granum Moluccanum, Bori. *Rumph. Herbar. Ambon. lib.* 6. *cap.* 49. Pignoli di Maluco *Acoſt. edit. Ital. pag.* 237. Quauhayohuatli tertia, seu semine arboris cucurbitinae, nuclei Pinus forma, purgante. *Hernand. Hiſt. Mexioc. pag.* 87. Ricinus arbor, fructu glabro, *Grana Tiglia* Officinis dicto, cujus *Lignum Moluccenſe* & incolis *Pavana* vocatur. Cadel-Avanacu *H. Malab. Amm. Char. pl. pag.* 305 & 410. Ricinus Indicus, foliis subrotundis, mucronatis, glabris, pediculis longis insidentibus, fructu oblongo, glabro. *Bobart. tom.* 3. *Hiſt. Oxon. pag.* 349. Pinus Indica, nucleo purgante. *C. B. Pin. pag.* 492. Pinei nuclei Moluccani, & Lignum Pavana, *Acoſt. hiſt. arom. pag.* 278. & apud *Cluſ. cap.* 57. Ricinus Americanus *Cluſii* in *Monard. pag.* 320. ubi fructus depicti. Lignum Moluccense *Pavana* dictum, fructu Avellanae. *J. B. tom.* 1. *pag.* 342. Lignum Moluccense. *Acoſt. lib. arom. cap.* 34. apud *Cluſ.* Ricinus Orientalis, cujus fructus sunt *Pinei Nuclei Moluccani* a nobis putati, & *Grana Tilli* Officinarum. Cadel Avanacu *H. Malab. part.* 2. *Tab.* 33. *Plukn. Almag. pag.* 320. Variis sub nominibus plantam hanc vide propositam, & descriptam apud *Ray. hiſt. pl. pag.* 1803, 1830, 1855. & *tom.* 3. *pag.* 112 & 666. de hujus ligno, & fructu vide *Samuel Dale Pharmac. pag.* 128. *Japalu* Malabaris dicitur. GAJAPALA, NEPALAM & WAYAPALI Zeylonensibus. a *Wayya*, qui illis morbus frigidus est, nervos & artus occupans, atque contrahens; cui hujus fructus medentur. *Gaya* victorem significat. *Pala* regem, qui olim his usus fuit. Fructus purgant violentissime, reliqua vide in *Muſ. Zeyl pag.* 15. & apud caeteros adlegatos auctores, quorum nullus hujus famosae plantae bonam dedit figuram, in *H.* enim *Malab.* nulli flores, & soli tantum fructus exhibentur, unde meliorem hic cum brevi ejus descriptione proponimus figuram.

Frutex hic caules gerit simplices, qui nascuntur sine ramis lateralibus, apice flores in spicam longam collectos gerentes. Folia nonnulla caulem exeunt ovato-oblonga, acuta, integra, laevia, pediculis uncialibus adnexa; ad radicem spicae duo rami egrediuntur ejusdem staturae cum caulis, & sic continuatur secundum aetates. Inferioris

spicae



RICINOIDES *Indica, folio lucido, fructu glabro,*
Grana TIGLIA *Officinis dicto. Herb. Hart.*

Flores fummos ramulos terminant fpicati, qui conftant ex calice quinquefolio, petalis quinque, ftaminibus viginti Piftilla in aliis floribus inter fquammulas fparfa inveniuntur. Fructus deficiunt; fed juxta defcriptionem, quae apud *Ray tom.* 3. *pag.* 113. occurrit, funt fructus parvi, rotundi, exterius villofi, & Ricinorum ritu in tres partes per maturitatem fe aperiunt, & tria femina inclufa Cannabinis aequalia demonftrant, ubi haec jungitur fubfequenti; quae vix differt, quum tantum fint varietates, nam major, vel minor non multum mutat plantam, quum vero *Hermannus* tanquam diverfas habuerit, & illas ita notare hic convenit.

RICINOIDES, arbor aromatica, Circaeae foliis media, WALKAPPETHYA Zeylonenfibus dicta. *Nobis.* Ricinus Indicus, frutefcens, Laccam fundens. WALKAPPETHYA Zeylonenfibus *Hermanni. Ray. tom.* 3. *pag.* 113. Arbor Zeylanica, aromatica, acris, Laccam fundens, media, WALKAPPETHYA dicta. *Muf. Zeyl. pag.* 46. Arbor Zeylanica, acris, odorata, Laccam fundens, media, WALKAPPETHYA, id eft *Kaeppethya* farmentofum; *ibidem. pag.* 11. ubi additur: Laccam rubram & pellucidam, fed perpaucam ex incifo hujus cortice non raro collegi.

RICINOIDES, arbor aromatica, Circaeae foliis, minima, HINKAEPPETHYA dicta. *Nobis.* Arbor Zeylanica, aromatica, acris, Laccam fundens, minor. HINKAEPPETHYA Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 40 & 46. Generis hujus characterem exactiffime definitum vide apud *Linnaeum in Char. pl. gen. pag.* 288. ad CROTON.

RICINOKARPOS Zeylanica, hirfuta, foliis lanceolatis, ferratis. *Nobis Tab.* 92. Urtica Zeylanica, Hieracii folio, flore lutefcente, fructu tripartito. *Herb. Hart.* Urtica Indica major, tricoccos, vehementer urens. *Muf. Zeyl. pag.* 18. Urtica Indica, tricoccos, Zeylanica, KAHABILYA Zeylonenfibus, Schorigenam *H. Malab. Muf. Zeyl. pag.* 31. Urtica frutefcens, Malabarica, *Schorigenam* dicta, *Ray. hift. pl. pag.* 160. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 69. Ricini fpicati fpecies, foliis hirfutis. *Muf. Zeyl. pag.* 25? an vero ad priores Ricinoides haec proprie fpectat? Ricinus Althaeae folio molli, & incano, longiore & acutiore, Maderasp. *Plukn. Phyt. Tab.* 120. *Fig.* 5. apud *Moris. tom.* 3. *pag.* 349. defcribitur, fed ibi caulis glaber dicitur, quum in noftra planta & illa

H.



RICINOKARPOS Zeylanica, hirsuta, foliis lanceolatis, serratis. Nobis.

H. Malab. fit hirfuta admodum & urens. *D. Petiver. in act. Phil. Lond. vol.* 22. *no.* 244. *pag.* 318. hanc plantam eandem effe cum Schorigenam *H. Malab.* afferit, quod & confirmatur in *Ray. tom.* 3. *pag.* 112. hanc *D. Sloane* etiam habet, a quo vocatur Urtica racemofa, urens, fruticofa, anguftifolia, fructu tricocco. *in Catal. pl. Jam. pag.* 38. & *Hift. vol.* 1. *pag.* 43. *Tab.* 16. *Fig.* 1. Schorigenam in *H. Malab.* exhibetur *part.* 2. *Tab.* 39. quae a noftra foliis latioribus differt, & duae proprie hujus plantae videntur effe differentiae, una fcilicet latifolia, altera anguftifolia, ut patet ex *Muf. Zeyl. pag.* 18. ubi Urtica Zeylanica, tricoccos, anguftifolia, altera, KAHABILYA dicta, occurrit. Atque haec cum noftra proprie conveniret planta, cujus caulis eft rectus, lignofus, rarius ramofus, villo flavefcente undique tectus, ftriatus; Folia alternatim prodeunt lanceolata, ferrata, ferraturis diftinctis, acutis, quae verfus foliorum apicem definunt: Folia caeterum villis flavefcentibus, ftrigofis afpera funt. Ex alis foliorum oritur petiolus, qui fuftinet plures flofculos, quorum inferior eft foemina, reliqui fuperiores funt mares; ulteriorem defcriptionem in *H. Malab. loc. cit.* vide accuratiffimam, quae in omnibus noftrae penitus convenit plantae, licet illa *H. Malab.* habenda effet latifolia, noftra vero anguftifolia; quum vero in *Muf. Zeyl.* eadem nomina Zeylanica utrique fint data & juncta, non video rationem, cur hic fepararem; fi quis autem duas velit facere plantas, & eas fejungere per me licet. KAHABILYA & WALKAHABILYA vocantur, quod pronunciatur *Kahambelya.* a *Kala* quod prurire fignificat; haec enim tacta cutis pruriginem excitat, ut notatur in *Muf. Zeyl. pag.* 18.

RACINOKARPOS Indica, glabra, fructus in acetabulis gerens. *Nobis.* Mercurialis Zeylanica, tricoccos, cum acetabulis. *H. L. Bat. App. pag.* 686. ubi icon & defcriptio *Muf. Zeyl. pag.* 2. *Cat. Hort. Amft. pag.* 231. *Ray. hift. pl. pag.* 1854. & *tom.* 3. *pag.* 108. *Petiv. act. Phil. Lond. vol.* 22. *no.* 287. *pl.* 18. Mercurialis Maderasp. acetabulata, folio rotundo minore. *ibidem vol.* 19. *no.* 198. quae eadem cenfetur cum Mercuriali Hermaphroditica dicocco, feu Julifera & fructum ferente. *Banift. Cat. Stirp. Virgin.* apud *Ray. hift. vol.* 3. *append.* Cupameni *H. Malab. part.* 10. *Tab.* 81. quae Urticae folio, planta, flore albicante, fpicato, cui paffim thecula bicornea infidet, foliis in fummitate caulem ambientibus. vocatur a *Commel. in notis pag.* 161. & *Fl. Malab. pag.* 70 & 44. Urtica Malabarica, tricoccos. *Ray. tom.* 3. *pag.* 107. KUPA-MENYA

 Zey-

Zeylonenſibus dicitur, a *Kuppa* quod fumetum notat, ubi copioſe creſcit, & *Menya* cor, quaſi amans fumetum. Duae hujus proprie ſunt ſpecies, prior habet folia rotunda, mucronata, poſterior oblonga, mucronata, paululum hirſuta; ut notatur in *Muſ. Zeyl. pag.* 2. Quaeque eſt

RICINOKARPOS Indica, hirſuta, foliis Urticae vulgaris, fructus in parvis acetabulis gerens. *Nobis.* Cynocrambe Indica, tricoccos, major, hirſuta. *Herb. Herm.* Mercurialis tricoccos, Hermaphroditica, ſeu ad foliorum juncturas ex foliolis criſtatis julifera ſimul, & fructum gerens. *D. Baniſter.* apud *Pluknet. Phyt. Tab.* 99. *Fig.* 4?

Caulis noſtrae plantae, quae laeviter hirſuta, eſt ſimplex, longus, inaequalis, ad folia enim extrorſum vergit; folia per gradus, vel alternatim ſemiunciali ſpatio remota e caule exeunt, pediculis biuncialibus inſidentia, ovato-acuminata, crenata, ad apicem caulis conferta, ex ſingula foliorum ala petioli communes oriuntur, fere digitales, ſolitarii, vel plures ſimul, ad latera undique floſculis ſtipati, inferius foemininis, ſuperius maſculinis, ſub foemininis foliola ſubrotunda, amplexicaulia, ſerrata, parvum acetabulum conſtituentia ſubjiciuntur; peracta floreſcentia flores maſculini decidunt, foeminini autem excreſcunt in fructum trilocularem, tricoccum, adeoque omnia, ut in *Ricinokarpo Boerhavii*, cujus notas vide definitas in ejus *Ind. H. L. Bat. part.* 1. *pag.* 254. Hybridae enim ſeu ſpuriae ſunt hae plantae, mediae inter Urticam, Mercurialem, & Ricinum, quum ſingularum harum plantarum multa habeant adtributa.

RICINOKARPOS Indica, hirſuta, foliis Urticae vulgaris, rotundioribus & minoribus. *Nobis.* Cynocrambe Indica, tricoccos, KUPPAMENYA *Herb. Herm.* & *Muſ. Zeyl. pag.* 28 & 29. Welia-Cupameni *H. Malab. part.* 10. *Tab.* 83. Urticae folia ſpicata, Indica, ſpicis longis, erectis, floſculis & ſeminibus crebrioribus. *Ray. tom.* 3. *pag.* 107. Urtica mortua Daun Guttae Matti *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 10. *cap.* 39. Urtica minor, iners, ſpicata, folio ſubrotundo, ſerrata, fructu tricocco. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 38. & *Hiſt. vol.* 1. *pag.* 125. *Tab.* 82. *Fig.* 3.

RICINOKARPOS Indica, Betonicae folio. *Nobis.* Urtica Zeylanica, tricoccos, Betonicae folio ÆTHAHAMBILYA Zeylonenſibus. *Muſ. Zeyl. pag.* 68. huc & ſpectat Urtica racemoſa, humilior, iners, *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 38. & *Hiſt. vol.* 1. *pag.* 124. *Tab.* 82. *Fig.* 2.

Vide-



RICINOKARPOS Zeylanica, urens, Mercurialis folio, floribus ex alis spicatis. Nobis.

URINARIA Indica, erecta, vulgaris. Par. Bat.

Videtur mihi haec eadem cum priori planta, licet ab *Hermanno* diverfis nominibus fuerint collectae, utrasque ficcatas fervo, ut verum fatear, nullam differentiam externe obfervare poffum, forte una planta erit mas, altera foemina, feu una fpicata, tefticulata altera.

RICINOKARPOS Indica, glabra, Mercurialis folio, *Nobis.* Mercurialis Indica, tricoccos *Herb. Herm.* Urtica Zeylanica, fylveftris, Mercurialis facie. *Herb. Hert.* quae eft Pee-Cupameni *H. Malab. part.* 10. *Tab.* 82. quae Urticae folio, flore tetrapetalo racemofo, capfula triquetra *ibidem* vocatur, & in *Fl. Malab. pag.* 69. vide & *Ray. tom.* 3. *pag.* 107. Mercurialis Maderasp. tricoccos, acetabulis deftituta, forte Pee-Cupameni *H. Malab. Plukn. Phyt. Tab.* 205. *Fig.* 4.

Tres Cupameni fpecies ex *H. Malab.* adductae & noftris plantis pro fynonymis junctae adeo cum iis conveniunt, ut perfuafiffimus fim, easdem re vera effe plantas, uti ficcatarum, quas fervo, plantarum cum *H. Malab.* iconibus comparatio, quum earum defcriptio admodum manca fit, me & alios, qui has plantas videre, docuit, unde & omnium icones hic addere fupervacuum duxi, praefertim quum partes floriferae & frugiferae in his plantis adeo minutae fint, ut in exficcata exprimi bene haud facile poffint, & in *H. Malab.* fatis bene & accurate infculptae fint.

RICINOKARPOS Zeylanica, urens, Mercurialis folio, floribus ex alis fpicatis. *Nobis. Tab.* 93. *Fig.* 1. Urtica Zeylanica urens, Mercurialis flore & habitu *Herb. Herm.* huc fpectat Urtica racemofa, fcandens, anguftifolia, fructu tricocco. *Sloan. Hift. Jam. pag.* 123. *Tab.* 82. *Fig.* 1. qui Ricinus parvus, urens, Urticae folio *Banift. Cat. ftirp. Virgin.*

Quum hanc plantam apud nullos invenerim auctores, quae folummodo ex foliorum alis flores fructusque profert, ejus iconem cum brevi defcriptione exhibemus. Cujus caulis eft fimplex, erectus, laevis, folia ad caulem fparfa, alterna, lata, oblonga, profunde & obtufe ferrata, tenuia, laevia, urentia, pediculis biuncialibus infidentia. Petioli ex foliorum alis tenues, inferius foemineos fuftinentes, fuperius flofculos mafculinos deciduos gerunt, uti in aliis hujus fpeciebus.

RICINUS Zeylanicus, femine minimo. *Heift. Cat. pl. H. Acad. Jul. ann.* 1731. *pag.* 18.

RICINUS Americanus, Nhambu-Guacu *Pisonis* HAERANDA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag.* 53. Nhambu Guazu sive Ricinus Americanus apud *Pisonem* occurrit *pag.* 180. qui est Ricinus Americanus, fructu racemoso, hispido. *Jonst. Dendr. p.* 217. & *Sloan. Cat pl. Jam. pag.* 38. ubi plurima invenies synonyma. Palma Cristi vulgo vocatur; cum qua convenit Avanacu & Pandi-Avanacu *H. Malab. part.* 2. *Tab.* 32 & *pag.* 60. ubi vide notas, & *Fl. Malab. p.* 58. ubi Ricinus Africanus, maximus, caule geniculato rutilante. *H. Reg. Paris. p.* 127. cum eo jungitur: vide & *Plukn. Almag. pag.* 319.

RICINUS arbor Zeylanica, dulcis, MAHAPATIGHAHA Zeylonensibus. *Mus. Zeyl. pag.* 65. an Ricinus dulcis arborescens, Americanus, Populnea fronde argentea, seu foliis Populi nigrae argenteis *Breynii Plukn. Phyt. Tab.* 220. *Fig.* 5. *Almag. pag.* 320. Ricinus fructu arbor, Curassavica, foliis Zizyphi argenteae Zeylanicae *Par. Bat. Pr. pag.* 370. Ne mirum videatur Lectoribus, plantas Americanas hic inter Zeylonenses enumerari, in utrisque enim terrae plagis saepius eaedem occurrunt, quod ab aliis etiam jam observatum est, sic & *Pluknetius* rariorum ille summus plantarum exoticarum indagator loquitur in *Almag. pag.* 111. ubi scribit: Experientia nos docuit, quamplurimas Indiae Orientalis plantas in America etiam reperiri, quod & idem testatur se observasse Clariss. *Commelinus* in loco quodam ad *H. Malab.* quem memini quondam me legisse.

RIZOPHORA Indica, sive Inhame rubra, caule alato, Scammonii foliis nervosis, conjugatis, *Par. Bat. Pr. pag.* 370. *Plukn. Almag. pag.* 321. Rizophora foliis nervosis, in acumen desinentibus & prima *Par. Bat. Pr. Mus. Zeyl. pag.* 20. Katsyl-Kelengu *H. Malab. part.* 7. *Tab.* 38. ubi *Commelinus* in notis addit, species est Batatti sylvestris ex Ceylona transmissa, ubi radices a porcis, aliisque animalibus comeduntur. Battata sylvestris, Indica, foliis Smilacis, laevibus, caulibus alatis, flore vidua, pro fructu glandes tuberosas ad exortum foliorum emittens. *Ray. tom.* 3. *pag.* 134. Volubilis nigra, radice alba aut purpurea, maxima, tuberosa, esculenta, farinacea, caule membranulis extantibus alato, folio cordato, nervoso. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 46. ubi plurima invenies synonyma, ut & in *Hist. Jam. vol.* 1. *pag.* 139. Ubium pomiferum, Aluno. *Rumph. Herb. Amboin. lib.* 9. *cap.* 11. qui varias hujus habet species, WELALA Zeylonensibus haec dicitur; variat



ROS SOLIS *ramosus, caule folioso. Nobis.*

ROS SOLIS *foliis circa radicem in orbem dispositis. Nobis.*

SPHAERANTHOS *purpurea, alata, serrata. Nobis.*

variat radice alba & rubra, ut notatur in *Parad. Batav.* & a *Pluknet.* rubrum habet *Samuel Dale in Pharm. fupplem. pag.* 150. Rizophoram Zeylanicam fequenti modo defcribit *Amm. in Char. pl. pag.* 211. Eft tuberifera, fcandens, caulibus farmentofis, quibus ad genicula e regione foliorum inftar Scammonii nervoforum, & acuminatorum, tubera fubrotunda, in radices abeuntia, cohaerent.

RIZOPHORA Zeylanica, Scammonii folio fingulari, radice rotunda, tuberofa. *Par. Bat. pag.* 217. ubi icon & defcriptio. Katu-Katfyl *H. Malab. part.* 7. *Tab.* 36. Battata fylveftris, foliis Smilacis nervofis, flore vidua, fructu triangulari compreffo, difpermo. *Ray. tom.* 3. *pag.* 133. Rizophora Indica, Bryoniae nigrae fimilis, ad foliorum ortum verrucofa. *Plukn. Phyt. Tab.* 220. *Fig.* 6. KATHUWALA Zeylonenfibus; hujus quoque radix comeditur; & ejus decoctum cum pulvere radicum Chinae ulcera mundificat & fanat.

ROSSAKINDA an Ibati Pifonis? *Muf. Zeyl. pag.* 27. Ibati Brafilienfium a *Pluknet.* idem habetur, ac Apocynum amplexicaule, frutefcens, Brafilianum cortice, albo, fungofo. *Par. Bat. Pr. pag.* 313. ut conftat ex ejus *Almag. pag.* 37. &c.

ROS SOLIS ramofus, caule foliofo. *Nobis. Tab.* 94. *Fig.* 1. Ros Solis Zeylanicus, ramofus, foliolis roridis, pennatis. *Muf. Zeyl. pag.* 63. Saxifraga Zeylanica, mufcofa, minutiffimo folio, flore albo. *Herb. Hart.* Acara-Puda *H. Malab. part.* 10. *Tab.* 20. quae Alfine Myriophylli folio, flore carneo *ibidem in notis.* KANDULAESSA Zeylonenfibus, a *Kandula* h. e. lachryma, quia foliola rore humida guttulas tanquam lachrymas repraefentant.

Radix hujus plantulae eft tenuis, articulata, fibrofa, emittens caulem femipedalem, tenuiffimum, ramofum, e quo folia alternatim egrediuntur tenuiffima, & fuperius ad dimidiam circiter partem villofis crinibus tecta. Ex foliorum alis emergunt petioli longitudine foliorum, interdum longiores, qui flores tres vel plures, aliquando vero folitarios in minutioribus petiolis continent. Folia fuperius reflectuntur, caetera inveni, ut in reliquis *Ros Solis* fpeciebus.

ROS SOLIS foliis circa radicem in orbem difpofitis. *Nobis. Tab.* 94. *Fig.* 2. Ros Solis Zeylanicus, foliis rotundis in orbem expanfis, villofis,

Herb.

Herb. Herm. Ros Solis Indicus, folio rotundo. WATHAESSA Zeylonenſibus. *Muſ. Zeyl. pag.* 18. ubi additur: hujus plantae uſus, ut in Europa, ſic in Zeylona decantatus eſt, Sal hujus plantae ſpecificum eſt in obſtructionibus Hepatis, Lienis, ac Meſenterii. Characterem hujus generis habet *Linnaeus in Char. pl. gen. pag.* 89. alio vocabulo hoc genus nominans DROSERAM.

Folia hujus plantae ad radicem plurima in orbem ſupra ſtrata ſunt ſita, a baſi tenuiſſima ſenſim dilatata, obtuſiſſima, hirſutiſſima. Caulis ſimplex eſt, digiti aut majoris longitudinis, verſus apicem floribus quinque ad decem inſtructus: E radice interdum alter recens caulis prodit, priori diſſlorato.

RUBEOLA Zeylanica ELARATHMUL dicta. *Muſ. Zeyl. pag.* 1. Rubeola maritima, Indica, Molluginis folio, radice rubente. *ibidem. pag.* 22. ELARATHMUL dicitur ab *Ela* album, *Rat* rubrum, & *Mul* quod radicem denotat. *Tsjada* & *Tseya* Malabaris & Luſitanis vocatur. Lintea hujus radice rubro tinguntur colore, ut notatur in *Muſ. Zeyl.*

RUBEOLA Zeylanica, foliis latioribus RATMUL dicta. *Muſ. Zeyl. pag.* 8.

RUBIA Zeylanica, ſylveſtris, quadrifolia, major. *Hert. Catal. ſemin.*

RUDHUMETI & RANAHAENDYA, flore coeruleo, Calcitrapae facie. *Muſ. Zeyl. pag.* 18. prima denominatio deſumpta eſt a *Rudu* quod Oryzae palea eſt, & *Meti* terra, ſeu humus, in qua naſcitur, ſordido enim creſcit loco. Altera RANAHAENDYA h. e. flos Cochleari ſimilis. *Haenda* enim cochlear ſignificat.

SAGITTARIA Zeylanica, floribus ex medio caulis prodeuntibus. *Muſ. Zeyl. pag.* 71. Sagittariae ſpecies, flores ex medio caulis ferens. *ibidem. pag.* 24. Sagittariae quodammodo ſimilis planta Maderasp., floribus medio caule quaſi ex utriculo prorumpentibus. *Plukn. Phyt. Tab.* 220. *Fig.* 8. SABARA & DYAHABARALA Zeylonenſibus.

SALSAPARILLA. *Grimm. Labor. Ceyl. pag.* 126. ubi dicit: duo ſunt ipſius genera, quae uſui adhibentur, tantumque eorundem habemus, quantum nobis eſt neceſſe, & Europaeis commode carere poſſumus. *Smilacis* infra propoſitae forte ſpecies ſunt.

SAM-

SAMBUCUS humilis, Zeylanica, PAWATHA Zeylonenfibus. *Par. Bat. Pr. pag.* 373. Sambucus antidyfenterica, Zeylanica, humilis, *Muf. Zeyl. pag.* 3. Pavate *Acoftae ibidem.* quae apud eum reperitur defcripta *pag.* 256. *in octavo.* Sambucus forte Barbadenfibus dicta, foliis fubincanis &c. *Plukn. Phyt. Tab.* 221. *Fig.* 6. quae eft Groffulariae fructu, non fpinofa Malabathri foliis, fubtus niveis, fructu racemofo in Umbellae modum difpofito. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 165. & *Hift. vol.* 1. *pag.* 40.

Sambucus Zeylanica, odorata, aromatica. *Muf. Zeyl. pag.* 14. an Arbor Baccifera laurifolia, aromatica, fructu viridi, calyculato, racemofo? *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 165. Sambucus Indica, MINAI vocata. *Grimm. Labor. Ceyl. pag.* 109. ubi haec habet: Radix iftius arboris corticem nobis exhibet, qui valde aromaticus eft; fuccus aut pulvis ejus optimum eft remedium adverfus fluxus ventris, deprimit bilem acrem, & effervefcentiam, dolores demulcet, ftomachum & vifcera confortat. Fructus per coctionem dant oleum, cui eadem virtus ineft. Cortex per deftill. dat Ol. & Aq. in quibus eadem vis continetur, praeterquam quod adhuc virtutem fpecialem obtinent in Gonorrhaea & renum affectibus. in *Muf. Zeyl. pag.* 14. vocatur MINDI & MIDI. ubi & notatur, quod ex ejus radice deftilletur Oleum aromaticum.

Sambucus Zeylanica, inodora, frugiperda, GURULLA Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 40. cum qua eadem videtur Sambucus Zeylanica, inodora, PURULAE Zeylonenfibus. *ibidem. pog.* 60.

SAPONARIA arbor, Zeylanica, trifolia, femine Lupini. *Par. Bat. Pr. pag.* 373. *Muf. Zeyl. pag.* 69. Saponaria arbor, trifoliata, Zeylanica. *H. Beaum. pag.* 37. Saponaria arbor, Indica. *Amm. H. Bofian. pag.* 32. Saponaria arbor trifolia, Indica, *H. L. Bat. pag.* 536. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 60. ubi jungitur cum Prunifera, fructu racemofo, parvo, nucleo faponario. *Ray. hift. pl. pag.* 1548. huc fpectat Purinsji *H. Malab. part.* 4. *Tab.* 19. ubi *pag.* 44. *in notis* vide varios fructus, quibus Indi faponis loco utuntur. an Arbor Prunifera, fphaerulas faponarias ferens, tetraphylla, ex India Orientali. *Plukn. Phyt. Tab.* 14. *Fig.* 6? & *Almag. pag.* 47. CONGHAS noftra Zeylonenfibus dicitur.

SCABIOSA Conyzoides, foliis latis, dentatis, femine amaro, lumbricos enecante. *Nobis. Tab.* 95. Scabiofa Zeylanica, capitulis foliofis, femine Sementinae, feu Zedoariae, lumbricos enecante. *Herb. Herm.* Scabiofa Zeylanica, capitulis foliofis, femine amaro, lumbricos enecante. *Muf. Zeyl. pag.* 66. Serratula Indica, major, capitulo foliofo. *Bobart. Hift. pl tom.* 3. *pag.* 134. Jaceae & Serratulae adfinis, capitulis Baccharidis, foliis Trachelii, Zeylanica. *Breyn. Prodr.* 1. *pag.* 39. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 36. Serratula Indica, major, latifolia, mollis *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 90. *Ray. tom.* 3. *Dendr. pag.* 17. *Commel. Fl. Malab. pag.* 61. Eupatoria Conyzoides, odorata, folio crenato, molli, fubincano. *Plukn. Phyt. Tab.* 87. *Fig.* 2. Synonyma haec vulgo huic junguntur plantae, ut fupra ad *Jaceam pag.* 123. monuimus. Cum qua & convenit Scabiofa Indica, capitulis foliaceis, major. *Muf. Zeyl. pag.* 34. Scabiofa Conyzoides Americ. latifolia, capitulis & floribus albidis, parvis. *Par. Bat. Pr. pag.* 374. Cattu-Schiragam *H. Malab. part.* 2. *Tab.* 24. quae Scabiofa Indica, arborea. *Ray. hift. pl. pag.* 1443. *Amm. Char. pl. pag.* 322, 428 & 557. huc fpectat Chryfanthemum Maderasp. latifolium, Scabiofae capitulis parvis. *Plukn. Phyt. Tab.* 159. *Fig.* 4. & Carduo-Cirfium minus, anguftifolium, capitulis plurimis, amplioribus, fparfis e Maderasp. *Plukn. Phyt. Tab.* 154. *Fig.* 4. quae foliis eft integris, quo a noftra planta folummodo differt. Caulis noftrae plantae eft ftriatus, fcaber, lignofus, ftraminei coloris, folia alternatim inordinato fitu exeuntia, ovalia, utrinque acuminata, per marginem dentato-ferrata, fuperiora anguftiora, acutiora, media latiora, inferiora obtufiora. Rami nonnulli verfus fummitatem floribus folitariis inftruuntur, ramis geminatis vel ternis. Florum calix eft fquammofus, oblongus, anguftus, obtufus, femina pappofa funt, ftriata, coronula fetacea, breviffima & tenuiffima inftructa.

SCABIOSA Indica, capitulis foliofis, minor. *Muf. Zeyl. pag.* 34. Scabiofa ramofa, capitulis parvis *ibidem pag.* 43. Scabiofa Conyzoides, anguftifolia, capitulis, & floribus parvis. *Par. Bat. Pr. pag.* 374. *Plukn. Phyt. Tab.* 109. *Fig.* 1.

SCORZONERA Zeylanica, bulbofa. *D. Scherard.* apud *Ray. tom.* 3. *pag.* 108. ubi defcribitur fequenti modo; Flores in hac fpecie longis pediculis nudis non infident, fed caulis ad ipfum usque florem foliis crebris veftitur, ut folia florem veluti ambiant; a *Vaill. in act. Reg. Paris.*



SCABIOSA Conyzoides, foliis latis, dentatis, semine amaro, lumbricos enecante. Nobis.



SENECIO *Zeylanica, foliis oblongis, integris, oppositis. Nobis*

SENECIO *Indica, foliis ternis, crenatis. Nobis.*

Paris. ann. 1721. *pag.* 271. etiam citatur; Convenit forte cum Scorzonera bulbofa, Biftortae minimae foliis, Virginiana, *Plukn. Phyt. Tab.* 59. *Fig.* 4. hujus generis characterem habet *Linnaeus in Char. pl. gen. pag.* 241.

SEDUM Zeylanicum, fpicatum, luteum, majus. *Muf. Zeyl. pag.* 43. Sedum fpicatum, maximum, Indicum. *ibidem pag.* 58. Sedum Zeylanicum, flore luteo. *ibidem pag.* 63.

SELAGO Indiae Orientalis, five Plegmaria admirabilis, Zeylanica. *Breyn. Cent. pag.* 180. ubi ejus defcriptio, & elegantiffima Figura. *Ray. hift. pl. pag.* 1852. Selago Indiae Orientalis, granulis orbicularibus. *Breyn. Cent. pag.* 183. ubi dicit natam hanc plantam in infula Zeylan, e caudice vetuftae cujusdam arboris *Jacae*.

SELAGO Indiae Orientalis, granulis trigonis. *Breyn. Cent. pag.* 182. Equifetum arboreum, fquammatum, Ruttu-Ruttu-Caju *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 10. *cap.* 63. ubi tres hujus defcribuntur fpecies. Tama-Poulpaalsja-Maravana *H. Malab. part.* 12. *Tab.* 14. ubi prolixa & elegans hujus plantae, ejusque virtutum exftat defcriptio. *Lycopodii* hae videntur fpecies, quo forfan ablegandae.

SENECIO Indica, foliis ternis, crenatis. *Nobis. Tab.* 96. *Fig.* 1. Senecio Zeylanica, inodora, minor, flore purpureo, pappofo. *Herb. Hart.* Senecio Zeylanica, foliis fubrotundis, crenatis, floribus ex purpura coeruleis. *Muf. Zeyl. pag.* 31. Conyza Indica, inodora, minor, flore purpureo, pappofo. *Herb. Herm.* & *Muf. Zeyl. pag.* 2. ubi male cum Crifta Pavonis *Breynii* jungitur. Senecio Indicus, Atriplicis folio. *Moris. Tab.* 17. *fect.* 7. *Fig.* 7. ubi foliis folitariis exprimitur. MONARA-KUDHUMBYA in *Muf. Zeyl. pag.* 2, & 31. haec, ut videtur, vitiofe vocatur, quum Criftae pavonis Breynii hoc nomen proprie convenit, ut patet fupra *pag.* 79. quod a *Monara*, quod Pavonem & *Kudhumbya*, quod criftam denotat, derivatur, cui flos Criftae pavonis fimilis eft. unde & delendum hoc nomen erit.

Caulis hujus plantae eft fesquipedalis, teres; folia fecundum caulem fparfa, terna utcunque fimul numero, duo inferiora quadruplo minora, ejusdem tamen formae, funt fcilicet fere ovata, obtufe ferrata, vel crenata, glabra, petiolis longiffimis vario ordine infidentia: Cau-

 lis

lis terminatur in racemum florum ſparſum, cui floſculi inſident tenuiſſimis, & longiſſimis petiolis ſuffulti, in tres quatuorve communes pediculos communiter diviſi; floſculi autem ſunt compoſiti, pappoſi, diſciflori, ut in aliis hujus ſpeciebus.

SENECIO Zeylanica, foliis oblongis, integris, oppoſitis. *Nobis. Tab.* 96. *Fig.* 2. Senecio Zeylanica, minor, foliis oblongis, glabris, non crenatis, floſculo albo, pappoſo. *Herb. Hart.* Conyza Indica, inodora, minor, floſculis albis, pappoſis. *Herb. Herm.*

Ex radice tenui, fibrilloſa, coadunata, albicante, oritur caulis ſemipedalis, glaber, tenuis, ſimplex, e quo rami alternatim ſimplices itidem proveniunt, qui binis foliis oppoſitis, oblongis, glabris, viridibus, integerrimis, ex quatuor foliorum paribus conſtructi gaudent, folia autem breviſſimis pediculis adfiguntur, ita ut in minoribus ramis ſeſſilia fere appareant. Floſculi, qui in noſtro ſpecimine deſunt, ſine dubio, ut in priori planta, eodem modo proveniunt, colore forte differentes, caeterum ambae hae plantae videntur annuae, ut plurimae Senecionis ſpecies.

SENECIO Indiae Orientalis, ampliſſimis Lampſanae foliis. *Plukn. Almag. pag.* 343. Senecio Zeylanica, flore purpureo, habitu Sonchi. *Hart. Catal. ſemin.* Erigeron Zeylanicum, Lampſanae foliis. *Breyn. Cent. pag.* 140. & *Moris. Tab.* 10. *Sect.* 7. *Fig.* 5. *Ray. hiſt. pl. pag.* 294. hujus generis characterem dedit *Linnaeus in Char. pl. gen. pag.* 251.

SENNA quadrifolia, ſiliqua plana, hirſuta, flore aureo, ſanguineo. *Nobis. Tab.* 97. Senna Zeylanica, perelegans, flore rubello, caule & ſiliqua hirſutis. *Hart. Catal. ſemin.* Senna Orientalis, tetraphylla, *Abſus* dicta. *H. L. Bat. pag.* 558. Senna ſpuria, tetraphylla, ſiliqua lata, compreſſa. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 149. Loto adfinis Ægyptia, ſemine atro ſplendente, ſeu Abrus Alpini, flore aureo, lineolis ſanguineis perfuſo. *Muſ. Zeyl. pag.* 41. & *Herb. Herm.* Loto adfinis Ægyptia. *C. B. Pin. pag.* 332. Abſus Trifolii floribus, foliis Orobi glabris. *J. B. tom.* 2. *lib.* 17. *pag.* 361. Abſus *Alpin. de pl. Ægypt. cap.* 31. *pag.* 97. Senna exigua, Maderasp. ſeu tetraphylla, ſiliquifera, glabra, florum pediculis ad foliorum exortum prodeuntibus. *Plukn. Phyt. Tab.* 60. *Fig.* 1. & in *Almag. pag.* 341. reliqua vide ſynonyma. ut & apud *Ray. tom.* 3. *pag.* 451. GHASDAMINI Zeylonenſibus dicitur.

In



SENNA *quadrifolia, siliqua plana, hirsuta, flore aureo, sanguineo. Nobis.*





SENNA *vigintifolia, siliquis teretibus. Nobis.*

In *Pluknet*. *Figura* caeterum optima, flores hujus plantae deficiunt, & filiquae deformes admodum etiam infculptae; glaberrimae enim & breviffimae exhibentur, quum fint fubhirfutae, planae, bivalves, variis interftitiis femina occludentibus diftinctae; flores autem ex alis foliorum proveniunt parvi, plures fimul, purpurafcentes, lineolis rubris diftincti, pentapetali, decem ftaminibus quinque minoribus, & quinque majoribus inftructi. Planta autem ipfa eft humilis, caulem brevem, ramofum, hirfutum gerens, cui folia vario modo petiolis uncialibus infiftentia pinnata adnectuntur; pinnae autem e duplici pari conftant fine inpari, quae funt ovatae, tenues, integerrimae, glabrae, venofae.

SENNA vigintifolia, filiquis teretibus. *Nobis*. *Tab*. 98. Senna Orientalis, fruticofa, *Sophera* dicta *H. L. Bat. pag*. 557. *Plukn. Almag. pag*. 342. Galegae adfinis, *Sophera* dicta. *C. B. Pin. pag*. 352. & *Herb. Herm*. Galega Indica, heccedecaphyllos, quae Senna Zeylanica, major, *Amm. H. Bofian. pag*. 15. & Sophera Lentifci foliis. *Honor. Bell*. & *Profp. Alpin. Amm. H. Bofian pag*. 34. Sophera Lentifci foliis *Amm. Char. pl. pag*. 575. Sopherae congener planta, filiquis compreffis, hirfutis, feminibus atris, lucidis, floribus aureis. *Muf. Zeyl. pag*. 56. Sophera Indiae Orientalis. *Breyn. Prodr*. 1. *pag*. 51. Ponnam-Tagera *H. Malab. part*. 2. *Tab*. 52 vide & notas ad *H. Malab. part*. 1. *pag*. 96. habetur haec vulgo pro Sophera *Alpini*, quae Securidaca Ægyptiaca a *Parkins. Theat. pag*. 1089. vocatur, qui & totam *Alpini* figuram in fuum conjecit opus, unde *Plukn in Almag. pag*. 342. & *Moris tom*. 2. *pag*. 78. illam cum hac noftra conjungunt, quantum autem Sophera *Alpini*, a Senna Orientali fruticofa, differat, fola comparatio *noftrae*, & *H. Malab*. cum *Alpini Figura*, quae apud eum in *plant. Ægypt. pag*. 84. *cap*. 25. exhibetur, ftatim docebit, unde & hae etiam diftinguendae funt, vide & *Ray. tom*. 3. *Dendr. pag*. 109. huc fpectat Flos Flavus, Cambang Curung. *Rumph. Herb. Ambon. lib*. 6. *cap*. 28. quae ab eo cum Ponam Tagera *H. Malab*. jungitur, ut & Gallinaria fpecies prima, Utta Maru. *Rumph. Herb. Ambon. lib*. 8. *cap*. 68. quae pro Tagera *H. Malab. part*. 2. *Tab*. 53. ab eo habetur. huc & pertinet Senna Occidentalis, odore Opii virofo, Orobi Pannonici foliis mucronatis, glabris. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag*. 148. & *hift. vol*. 2. *pag*. 48. *pl*. 22. qui hanc cum Sophera *Alpini* conjungit. MAHATORA Zeylonenfibus.

Rami noſtrae plantae ſunt lignoſi, laeves, teretes, in floriferas divaricationes ſuperius deſinentes, e quibus per uncialia ſpatia folia alternatim exeunt compoſita juxta rachim fere pedalem ex decem paribus ſine impari, ſingula autem foliorum pinna oppoſita eſt, ſeſſilis fere, oblongo-acuta, integerrima, glabra, & acuminata; ex ſinu foliorum compoſitorum proveniunt pedunculi flores paucos proferentes, e quibus unica communiter perficitur ſiliqua triuncialis teres, cum parvo acumine, racemus autem florum terminat ſingulum ramum, qui conſtat pedunculis alternatim egreſſis, ſemiuncialibus, in alios minores pedunculos & proprios deſinentes, quibus ſingulis flos unicus inſidet aureus, calice quadrifolio, oblongo, patente, deciduo contentus, gerens petala quinque, oblonga, concava, cum decem ſtaminibus crocei coloris, quorum quinque longiores ſunt, & ſtylo ſimplici, deorſum inflexo gaudens.

Senna Zeylanica, foliis obtuſis, ſemine longiore. *Hart. Catal. ſemin.*

Senna Zeylanica, flore umbellifero, luteo, magno, ſemine plano. *Hart. ibidem.*

Senna Zeylanica, ſpicata, flore luteo, maximo, fructu quadrangulari. *Hart. ibidem.* & *Heiſt. Catal. pl. Acad. Jul. ann.* 1731. *pag.* 26.

Senna Zeylanica, flore luteo, magno, ſemine plano. *Hart. Catal. ſemin.*

SESBAN ex inſula Zeylan. *Breyn. Prodr.* 1. *pag.* 47. quae eſt Galega Ægyptiaca, ſiliquis propendentibus longiſſimis & anguſtiſſimis. *H. L. Bat. pag.* 267. Sesban Ægyptiacum, ſive Securidaca Ægyptiaca articulata. *Parkins. Moris. hiſt. pl. part.* 2. *pag.* 79. reliqua vide ſupra ad *Galegam pag.* 103.

SHERARDIA repens, nodiflora. *Vaill. de ſtruct. Fl. pag.* 49. ubi vide, quae eſt Verbena nodiflora, foliis minoribus, viridibus. *Moris tom.* 3. *pag.* 419. Verbena nodiflora. *C. B. Prodr. pag.* 125. ubi icon & deſcriptio & *Pin. pag.* 269. *Muſ. Zeyl. pag.* 66. *J. B. tom.* 3. *pag.* 444. Verbena repens, nodiflora. *Parkins. Theat. pag.* 675. *Foelie de Raala* Luſitanis dicitur. HIRIMANADAETTA Zeylonenſibus, id eſt orbiculus dentatus, folia enim orbiculata & dentata ſunt inſtar orbiculi illius ferrei, dentati, quo Indi medullam Nucis Indicae extorquent ad praeparan-



SINAPISTRUM *Zeylanicum, pentaphyllum, viscosum, flore flavo.* **Herb. Hart.**

parandum lac Coccineum ex nuce *Cocco*. Lufitani hunc orbiculum vocant *Raala*, ut notatur in *Muf. Zeyl. pag.* 56.

SINAPISTRUM Zeylanicum, pentaphyllum, vifcofum, flore flavo. *Herb. Hart. Tab.* 99. Eryfimum Indicum, pentaphyllum, flore flavo. *Herb. Herm.* RANMANISSA Zeylonenfibus vocatur.

Caulis hujus plantae eft rotundus, craffus, altus, villofus & vifcofus, varios emittens ramos, quibus folia compofita, digitata quinque fimul in uno centro infident petiolis vifcofis, uncialibus, alternis, fingula autem pinna eft oblonga, lata, glabra, integerrima. Ex alis vero foliorum petiolus uncialis oritur fuftinens florem quadripetalum, qui abit in filiquam bivalvem, unicapfularem fine fepto intermedio, duplici vero feminum ferie conftantem, qua eft triuncialis, oblique extrorfum ftriata, teres, acuta, hirfuta & vifcofa, ut tota etiam planta laeviter hirfuta eft, & admodum vifcofa.

SINAPISTRUM Zeylanicum, triphyllum, & pentaphyllum, vifcofum, flore flavo. *Boerhav.* apud *Martin. Cent.* 1. *Dec.* 3. *pag.* 25. quae non nifi foliorum varietate a praecedenti differt, & vocatur Papaver corniculatum, acre, triphyllum, Indicum, floribus luteis, vifcofum, RANMANISSA Cochinenfibus dictum a *Plukn. in Almag. pag.* 280. Eryfimum, feu Sinapiftrum Indicum, triphyllum, vifcofum, flore flavo. *Muf. Zeyl. pag.* 13. Eryfimum Indicum, triphyllum *ibidem pag.* 29. Anci-Veela *H. Malab. part.* 9. *Tab.* 23. Sinapiftrum Indicum, triphyllum, flore carneo, non fpinofum. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 80. & *Hift. Jam. vol.* 1. *pag.* 194. *Tab.* 124. *Fig.* 1. Trifolium fpicatum, Mexiocanum *Hernand.* apud *Recch. pag.* 284. & Memeya de Tepon-than *ibidem. pag.* 384.

SINAPISTRUM Indicum, fpinofum, foliis quinque, fex, feptemve numero incertis. *Nobis.* Sinapiftrum Indicum, quinquefolium, floribus incarnatis. *Muf. Zeyl. pag.* 1. Eryfimum Indicum, pentaphyllum, fylveftre, flore pallide incarnato, *ibidem. pag.* 30. Sinapiftrum Indicum, majus, quinquefolium, afperum, & quafi fpinofum, flore carneo. *Scherard.* apud *Ray. tom.* 3. *pag.* 419. Tareriaya. *Markgr. lib.* 1. *cap.* 16. *pag.* 34. Sinapiftrum Ægyptium, heptaphyllum, flore carneo, majus, fpinofum. *H. L. Bat. pag.* 564. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 80. Papaver corniculatum, acre, quinquefolium, Americanum, flore carneo,

carneo, majus, ſpinoſum. *Plukn. Almag. pag.* 280. Pentaphyllum peregrinum, ſiliquoſum, bivalve, majus. *Moris. hiſt. pl. part.* 2. *pag.* 288. Lagonſa alba, ſive eſculenta, Bredomamma. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 8. *cap.* 66. WELAKOLA Zeylonenſibus dicitur, quod loca inculta notat, ubi plurimum creſcit.

SINAPISTRUM Indicum, pentaphyllum, flore carneo, minus, non ſpinoſum. *H. L. Bat. pag.* 564. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 80. Sinapiſtrum pentaphyllum, flore albo. *Plum. Cat. pl. Amer. pag.* 6. Pentaphyllum peregrinum, ſiliquoſum, bivalve, minus. *Moris. Hiſt. pl. part.* 2. *pag.* 288. Papaver corniculatum, acre, quinquefolium, Ægyptiacum, minus, flore carneo, non ſpinoſum. *Plukn. Almag. pag.* 280. Pentaphyllum ſiliquoſum, Arabicum, albidum. *Parkins. Theat. pag.* 397. Lupinus Ægyptius, ſylveſtris. *Veſling. obſerv. in Alpin. pag.* 69. qui idem eſt cum Quinquefolio ſiliquoſo *Alpini de plant. exot. pag.* 322. ut Figurarum comparatio docet. vide & *Amm. Char. pl. pag.* 536. Caara-Veela *H. Malab. part.* 9. *Tab.* 24. quod Pentaphyllum ſiliquoſum, Malabaricum in notis vocatur. & a *Commel. Fl. Malab. pag.* 51. Lupino Arabico Ocome direi, Pentafillo peregrino, *Ponae Ital. pag.* 102. Pentaphyllum ſiliquoſum, Syriacum. *Munting. pl. Cult. pag.* 558. Laganſa rubra. *Rumph. Herbar. Ambon. lib.* 8. *cap.* 67.

SINAPISTRUM triphyllum, pumilum, glabrum, floſculo purpureo, ſiliqua membranacea. *Nobis. Tab.* 100. *Fig.* 1. Eryſimum minimum, triphyllum, flore purpureo, fiſtuloſo. *Herb. Herm.*

Ex radice tenuiſſima, longa, raras fibrillas emittente, cinerea, oritur caulis ſesquipedalis, nunc rectus & ſolitarius, velut in alia, quam ſervo, planta, procumbens, & paulo ſupra terram in varios ſeſe ramulos dividens, ſubhirſutos, tenues, quibus vario ordine folia adcreſcunt lata, glabra, integerrima, venoſa, tria in uno centro concurrentia, & communi petiolo ſemiunciali ſuffulta, e quorum communiter alis floſculi parvi, ſolitarii, fiſtuloſi, magno calice quadrifido & perpetuo contenti oriuntur, coloris purpurei, qui ſiliquas dant longas, planas, glabras, inſtar membranae translucentes, bivalves, plurima ſemina vario modo & ordine ſita continentes, quae ſunt ſubrotunda, convexa parte gibba, concava vero excavata, & fere reniformia, ſed rotundiora, minutiſſima, glabra, ſplendentia, fuſca.

SINA-



SINAPISTRUM Zeylanicum, viscosum, folio solitario, flore flavo, siliqua tenui. Nobis.

SINAPISTRUM triphyllum, pumilum, glabrum, flosculo purpureo, siliqua membranacea. Nobis.

SINAPISTRUM Zeylanicum, vifcofum, folio folitario, flore flavo, filiqua tenui. *Nobis. Tab.* 100. *Fig.* 2. Eryfimum Indicum, filiquofum, folio fimplici, flore flavo. *Herb. Herm.* Sinapiftrum Indicum, Acetofae vulgaris folio, filiquis longis. *Muf. Zeyl. pag.* 10. Eryfimum Zeylanicum, monophyllum, fylveftre, quod Sinapi fpecies. *ibidem. pag.* 29. Papaver corniculatum, acre, fingulari folio, Malabaricum, Tsjeru-Veela. *H. Malab. part.* 9. *Tab.* 34. *Plukn. Almag. pag.* 280. RANMANISSA Zeylonenfibus. *Ravara* aurum fignificat, flores enim hujus funt crocei. ut notatur in *Muf. Zeyl. pag.* 10. Caulis hujus plantae eft pedalis, teres, hirfutus, ftriatus, verfus apicem duos magnos emittens ramos; folia gerens alterna, fparfa, oblonga, acuminata, integra, hirfuta & vifcofa, fimilibus petiolis femiuncialibus infidentia. Ex alis fuperiorum foliorum flores enafcuntur ut plurimum folitarii, quadripetali, calice quadrifolio, & tenui pedunculo fuffulti, quibus deciduis fructus feu filiqua enafcitur teres, longa, bivalvis: facie fua externa, ut & filiqua tenui ad Eryfimum proxime accedit haec planta.

SISYNRICHIUM Zeylanicum, flore coeruleo, parvo, gramineis foliis. *Par. Bat. Pr. pag.* 376. & *Plukn. Almag. pag.* 347. & *Phyt. Tab.* 224. *Fig.* 6. Sifynrichium Zeylanicum, flore pallide coeruleo, foliis gramineis, carinatis, longis, *D. Hermans* apud *Ray. tom.* 3. *pag.* 558. Sifynrichii fpecies. *Muf. Zeyl. pag.* 27.

SMILAX Indica, fpinofa, folio Cinnanomi, Pfeudo-China quibusdam *Muf. Zeyl. pag.* 22. Smilax Zeylanica, fpinofa, Lauri folio *Hart. Catal. femin.* Planta Cinnamomi folio, trinervia, Convolvulacea, flofculis parvis, mufcofis, racematim in julis, feu nucamentis difpofitis. *Muf. Zeyl. pag.* 31. China fpuria, nodofa. *C. B. P. pag.* 247. Smilax Virginiana, fpinis innocuis armata, latis Canellae foliis, radice arundinacea craffa & carnofa. *Plukn. Phyt. Tab.* 110. *Fig.* 5. huc fpectat Legno della China. *Acoft. edit. Ital. pag.* 60. & Smilax afpera, fructu nigro, radice nodofa, magna, laevi, farinacea, *China* dicta. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 105. ubi quamplurima vide fynonyma. & *Hift. Jam. vol.* 1. *pag.* 231. *Tab.* 143. *Fig.* 1. KABOLOSSA & RIRIBUNNAWAEL Zeylonenfibus dicitur. *Riri* fanguis eft. *Bonaiva* bibere. Spinulae enim horum farmentorum quafi bibunt fanguinem tangentium. Fert haec planta radicem, a radiculis fuis tenuibus farmentofis


tofis purgatam, *Chinae* forma & virtute proximam, ut notatur in *Muf. Zeyl.*

SMILAX foliis peltatis, cordato-oblongis, floribus minutiffimis & copiofiffimis. *Nobis. Tab.* 101. Mechoacannae fimilis, radix Zeylanica, Afthmatica. *Herb. Herm.* Planta fcandens, folio Convolvuli obtufo, umbilicato, KAHIPISSAN Zeylonenfibus, *ibidem. pag.* 21. quae eft Convolvuli fpecies alia. *Muf. Zeyl. pag.* 27. quam vide fupra ad Convolvulum *pag.* 74. huc fpectat Kattu-Kelengu *H. Malab. part.* 7. *Tab.* 37. & Pfeudo-China Ambonica, Caju-Tsjura-Utan. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 9. *cap.* 61. ubi alba & nigra defcribitur. KAHIPISSAN Zeylonice audit, cujus fignificationem vide *fupra pag.* 74.

Caulis noftrae plantae volubilis eft, tenuis, lignofus, folia fparfa, remota, folitaria, petiolo biunciali infidentia, cordato-oblonga, bafi laeviffime finuata, nitida, integerrima; petiolus non ad bafin folii adnectitur, fed femiunciali fpatio a bafi remoto inferitur, & folium umbilicatum feu peltatum conftituit: Petioli autem florum pedales, vel longiores ramis pluribus lateralibus, omnibus tenuiffimis, conftructi funt, quibus flores minutiffimi undique adfiguntur, & fquammulae nonnullae multifidae, fere capillaceae, ad divaricationem ramulorum cum petiolis enafcuntur. Flofculi autem funt minutiffimi, fextifidi, piftillum unicum, ftamina nulla dantes in nonnullis, fed in aliis fimilibus, ubi piftillum deeft, ftamina obfervantur.

SOLANUM Indicum, fpinofum, frutefcens, maximum, villofum totum, fructibus croceis. *Muf. Zeyl. pag.* 25. Solanum Indicum, fpinofum, maximum, ac villofum totum. *ibidem. pag.* 31. Solanum pomiferum, fpinofum, foliis maximis, angulofis, lanuginofum valde, MALA-BATTOD Zeylonenfibus. *Ray. tom.* 3. *pag.* 353. ubi fic defcribitur: Tota planta lanugine fordide flavicante, denfa, obducta eft: Caulis fpinulis brevibus, crebris obfitus; fpinulae etiam coftae foliorum mediae, & nervis lateralibus innafcuntur rariores. Folia angulofa funt, non tamen admodum profunde diffecta. Flores caulibus brevibus pediculis adnafcuntur, perianthiis villofiffimis excepti: MALABATHU in *Muf. Zeyl.* vocatur.

SOLANUM Zeylanicum, fpinofum, folio amplo, incano, ad pediculum ftrictiori. *Plukn. Phyt. Tab.* 226. *Fig.* 6. Solanum forte fpinofum, pomi.



SMILAX foliis peltatis, cordato-oblongis, floribus minutissimis & copiosissimis. Nobis.

pomiferum, Indicum, album, feu foliis Hyofchyami albi majoris. *Breyn. Prodr.* 1. *pag.* 49. Solanum fpinofum, incanum, foliis finuatis, flore Borraginis, fructu luteo, ovuli Gallinacei forma & magnitudine. *Triumf.* apud *Boerh. Ind. H. L. B. part.* 2. *pag.* 68. Solanum pomiferum, Indicum, fpinofum, Borraginis flore, fructu croceo, candicans, maxime tomentofum. *H. L. Bat. pag.* 573. *Commel. Fl. Malab. pag.* 63. Juripeba Foemina *Pifonis pag.* 181. Ana-Schunda. *H. Malab. part.* 2. *Tab.* 35. Trongum agrefte, Trong-Pra. *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 8. *cap.* 48. huc fpectat Solanum bacciferum, caule & foliis tomento incanis, fpinofis, flore luteo, fructu croceo minore. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 107. ubi & alia occurrunt fynonyma, & *Hift. Jam. vol.* 1. *pag.* 236. *Tab.* 144. *Fig.* 3. Solanum tomentofum, Verbafci folio, parvo fructu, flavefcente. *Plum. Cat. pl. Amer. pag.* 4.

Solanum Indicum, Pomum de Hiericho dictum, Borraginis flore, foliis profunde laciniatis. *Muf. Zeyl. pag.* 34. Solanum pomiferum, frutefcens, Africanum, fpinofum, nigricans, Borraginis flore, foliis profunde laciniatis. *H. L. Bat. pag.* 573. ubi ejus icon & defcriptio. *Amm. H. Bofian. pag.* 34. & *Plukn. Phyt. Tab.* 226. *Fig.* 5. cujus in *Almag. pag.* 351. reliqua vide fynonyma. huc fpectat Solanum fpinofum, pomiferum, Indicum, fructu echinato, foliis Cardui, five Acanthi fpinofi. *Breyn. Prodr.* 1. *pag.* 50. & Solanum Africanum, fpinofum, arborefcens, nigricans, pomiferum, venenatum, perenne, foliis profunde laciniatis. *Amm. H. Bofian. pag.* 8. & *Char. pl. pag.* 338. a quo pro Chunda *H. Malab. part.* 2. *Tab.* 37. habetur. TIBBUTHU Zeylonenfibus vocatur.

Solanum Indicum, fpinofum, flore Borraginis, fructu croceo, rotundo, Perficae magnitudine, Pomum de Hiericho dictum. *Muf. Zeyl. pag.* 43. Solanum pomiferum, Indicum, fpinofum, Borraginis flore, fructu croceo. *H. L. Bat. pag.* 573. & *Fl. Malab. pag.* 63. Solanum forte fpinofum, Indicum, nigrum. *Breyn. Prodr.* 1. *pag.* 50. quod cum Cheru Schunda *H. Malab. part.* 2. *Tab.* 36. ab eo jungitur. Pomum de Hiericho; Melongenis congener, *J. B. tom.* 3. *lib.* 34. *pag.* 619. Solanum fpinofum, fructu rotundo. *C. B. P. pag.* 167. *Plukn. Almag. pag.* 350. Schunda. *H. Malab. part.* 2. *Tab.* 37. ELABATHU Zeylonenfibus. Variat haec fpecies fpinis violaceis, ex albo virentibus, & aureis, ut notatur a *Pluknet.* & in *H. L. Bat.*

SOLANUM frutefcens, villofum, foliis undulatis, mollibus, fubtus incanis, fpinis flavefcentibus, armatum. *Nobis. Tab.* 102. Solanum Indicum, frutefcens, fpinofum, Borraginis flore, fructu croceo, rotundo, minimo. *Muf. Zeyl. pag.* 65. & *Herb. Herm.* Solanum Indicum, Borraginis flore, folio molli, lanuginofo, longis aculeis flavefcentibus armato. *Schol. Botan. pag.* 143. Solanum fpinofum, Indicum, Borraginis flore, fructu croceo, rotundo, minutiffimo. Cheru-Schunda *H. Malab. Amm. H. Bofian. pag.* 8. Cheru-Schunda *H. Malab. part.* 2. *Tab.* 36. quod eft Solanum fruticofum, Indicum, fructu rubro. *Tournef. inft. pag.* 149. & Solanum Indicum, fpinofum, fructu minimo miniato, glabro. *Ray. hift. pl. pag.* 1876. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 63. TUBUTHU Zeylonenfibus dicitur. Frutex hic lignofus eft, corticem habens purpureum, villis brevibus, ex albo flavefcentibus undique ita obfitum, ut flavefcens penitus appareat, ex hoc rami vix numerofi, longiores, faepius fimplices, teretes, villofi proveniunt, qui folia gerunt interdum oppofita, interdum folitaria, mollia, venofa admodum, fuperius obfcure virentia, inferius candida, villofiffima, ad nervum maximum, per mediam folii partem decurrentem fpinis acutiffimis ab utroque latere inftructa, petiolis uncialibus innixa, ex ovato acuminata, finuofa, margine repando: Aculei autem funt compreffi, offei, acuminati, flavi, per totam plantam fparfi, maxime in caule & petiolis, rarius in venis majoribus foliorum, ubi acutiores & tenuiores. Petioli flores fuftinentes e caule hic & illic exeunt, flores quatuor, quinque, vel plures aliis minoribus petiolis gerentes. Flores funt Solani vulgaris, cujus & bacca eft magnitudinis, coloris fulphurei, vel crocei.

SPHAERANTHOS purpurea, alata, ferrata. *Nobis. Tab.* 94. *Fig.* 3. Sphaeranthos folio oblongo, major. *Vaill. Act. Reg. Paris. ann.* 1719. *pag.* 382. Jacea Zeylanica, folio oblongo, ferrato, flore purpureo. *Herb. Hart.* Scabiofa Indica, major, caule & pediculis foliofis. *Plukn. Phyt. Tab.* 312. *Fig.* 6. Scabiofa Indica major, crifpatis foliis, alato caule, Malabarenfis. *Plukn. Almag. pag.* 335. & Scabiofa minor, alato caule Maderasp. *ibidem:* quae eft Scabiofae capitulo, Chryfanthemi *Myconi* foliis, alato caule Maderaspatenfis. *Plukn. Phyt. Tab.* 108. *Fig.* 7. Omnes has *Pluknetii* Scabiofas unam eandemque plantam effe, nec aliter quam aetate differre adfirmat *D. Petiv. in act. Phil. Lond. no.* 244. *pag.* 332. Quum tertia junioris plantae fit fpeci-



SOLANUM frutescens, villosum, foliis undulatis, mollibus, subtus incanis, spinis flavescentibus, armatum. Nobis.

fpecimen, fecunda & prima adultioris, uti videre eft apud *Ray. tom.* 3. *pag.* 235. ubi & tertia vocatur Conyza Orientalis, alato caule, flore globofo. *Bobart.* Adaca-Manjeu *H. Malab. part.* 10. *Tab.* 43. quae in notis planta Indica, alato caule, folio crenato, pilofo, & vifcofo, flore glomerato, purpureo vocatur. & *Fl. Malab. p.* 55. & Corymbiferis affinis, caule alato, floribus in fpicis, feu capitulis, fquamofis feminibus infidentibus. *Ray. tom.* 3. *pag.* 241.

Quum haec planta adeo variet tam ratione aetatis, quam variatione loci & coeli, noftram quoque Infulae Zeylanae indigenam, & ibi excretam proponimus, quae in plurimis Indiae locis provenit & invenitur, atque ob fingulare ejus caput fphaericum, quo a Jacea aliisque hujus congeneribus differt, Sphaeranthos a *Vaill.* vocatur, cujus notam Characterift. vide in *act. Reg. Paris. loc. cit.*

Caulis noftrae plantae eft fere pedalis, fimplex, craffiusculus, foliis inftructus alternatis, obtufis, oblongis, ferratis, verfus bafin attenuatis, marginibus dentatis, a bafi per caulis dorfum percurrentibus, unde alatus apparet caulis, & crispus. Ex alis foliorum enafcuntur ramuli valde rari, tenues, unicus vel alter, quibus flos petiolo unciali infidet compofitus, ovatus, calice fquammofo communi inftructus, qui deorfum petiolum marginibus percurrit, & eum crifpum reddit. Reliqua hujus defcriptio ex *H. Malab.* fuppleri poteft, quae huic noftrae plantae maxime convenit, & de qua virtutes Medicae egregiae ibi praedicantur.

STRAMONIUM Zeylanicum. *Muf. Zeyl. pag.* 69. Datura Zeylanica, violacea, *ibidem pag.* 41. Stramonia feu datura, pomo fpinofo rotundo, longo flore. *H. L. Bat. pag.* 583. & *Fl. Malab. pag.* 64. ubi alia fynonyma, & fpecies; cujus tres diverfae in *H. Malab.* nomine Humatu proponuntur *part.* 2. *Tab.* 28, 29 & 30. quae Daturae Malabaricae *Humatu* dictae prima, fecunda, & tertia fpecies apud *Ray. hift. pl. pag.* 749. denominantur, & defcribuntur. uti & *Rumph. in Herb. Amboń. lib.* 8. *cap.* 49. Stramoniam Indicam, feu Dutram albam, nigram, & rubram depingit & defcribit. Datura quoque occurrit apud *Cluf. lib.* 2. *cap.* 24. *Acoft. cap.* 53. & *in edit. Ital. pag.* 66. Tlapatl ab *Hernand. in Hift. Mexic. pag.* 278. vocatur, & noftra ANTENNA a Zeylonenfibus. Characterem hujus generis habet. *Linnaeus. in Char. pl. gen. pag.* 48. ad DATURAM.

STRATIOTES DYAPARADHAEL Zeylonenſibus dicta. *Muſ. Zeyl. pag.* 68. *Paradhael* vocantur folia decidua & ſicca, ſeu in terram, ſeu in aquam decidant: an vero haec planta ſit Stratiotes terreſtris, an paluſtris, me latet, unde & ipſi nulla jungo ſynonyma; acris caeterum eſt, & calidiſſima, ut dicitur in *Muſ. Zeyl.*

TAMARINDUS. *Muſ. Zeyl. pag.* 27 & 60. & *Parkins Theat. pag.* 237. *Bontii lib.* 6. *cap.* 4. *pag.* 94. *J. B. tom.* 1. *pag.* 422. *Ray. hiſt. pl. pag.* 1748. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 147. & *Hiſt. Jam. vol.* 2. *pag.* 45. Tamarindo *Acoſtae edit. Ital. pag.* 50. & apud *Cluſ. cap.* 21. & ejus *Aromat. lib.* 1. *cap.* 28. Siliqua Arabica, quae Tamarindus. *C. B. P. pag.* 403. Tamarindus Derelſide vocata *Alpin. de pl. Ægypt. cap.* 10. *pag.* 37. ubi ejus icon. & *Veſl. in Alp. pag.* 13. *Breyn. Prodr.* 1. *pag.* 51. Balam-Pulli, ſeu Maderam-Pulli *H. Malab. part.* 1. *Tab.* 23. ubi vide notas &c. Tamarindus, Aſſam Java *Rumph. Herb. Ambon. lib.* 2. *cap.* 32. qui varias hujus habet icones diverſis in locis, ſeu terris ad plantas depictas. Tamarindus arbor. *Grimm. Labor. Ceyl. pag.* 113. ubi dicitur, praeter pulpam, quae tam ad purgationes, quam ad Clyſteres nobis inſervit, poſſumus e floribus pulcherrimam Conſervam deſumere pro Stomachi, Hepatis, atque Lienis affectibus. &c. HYABILA & HIAEMBALA Zeylonenſibus. Hujus characterem habet *Linnaeus in char. pl. gen. pag.* 9.

TELKAPALA. *Muſ. Zeyl. pag.* 58. *Tel* Butyrum notat, *Ka* lucidum, & *Pala* Blitum ſeu Betam ſignificat; folia enim lucida ſunt & glabra inſtar Butyri.

TELU. *Muſ. Zeyl. pag.* 70. ubi dicitur; hujus caulis calefacti ſuccus expreſſus auribus obſtructis inſtillatur bono ſucceſſu.

THALICTRUM Zeylanicum, aquaticum. *Muſ. Zeyl. pag.* 36.

THLASPI Alſinoides, Indicum, trifoliatum, *Muſ. Zeyl. pag.* 57.

TINUS humilis, Zeylanica, foliis craſſis, venoſis. *Nobis. Tab.* 103. Ceraſus Zeylanica, humilis, craſſis, latisque foliis, flore fructuque umbellato, rubro. *Muſ. Zeyl. pag.* 43. Ceraſus Zeylanica, umbellata, rubra, foliis latis & craſſis *Hermanni. Herbar. Gronov.* ubi adſcriptum erat, refrigerat & humectat, ex fructibus Rob conficitur in ardentibus



TINUS humilis Zeylanica, foliis crassis, venosis. Nobis.





TITHYMALUS *Botryoides, Zeylanicus, cauliculis villosis. Herb. Herm.*

bus febribus proficuum. BADULAM Zeylonenfibus. *Tsahinagapalam* Malabaris vocatur. huc & fpectat Cerafo affinis arbor, baccifera, racemofa, flore albo, pentapetalo, fructu flavo, monopyreno, eduli, dulci. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 169. Folia hujus arboris funt craffa, ovalia, verfus bafin magis attenuata, integra, femper virentia, nitida, & glaberrima, venofa, ex caule alternatim breviffimis pediculis orta, fere feffilia; Flores in fummitate ramorum colliguntur plurimi, racemofi, umbellatim fere difpofiti, monopetali, rotati, quinquefidi, quinque ftaminibus cum tuba longa inftructi, calicibus minimis, quinquefidis contenti, coloris rubicundi, cujus & fructus funt, qui edules, refrigerantes, & humectantes habentur. ex quibus & Rob conficitur, ut fupra jam ex *Herbar. Gronov.* monuimus, qui elegantem hanc plantam infculpendam generofe nobis conceffit.

TITHYMALUS ramofiffimus, frutefcens, pene aphyllos. *Par. Bat. Pr. pag.* 381. *Bobart. hift. tom.* 3. *pag.* 337. Tithymalus arborefcens, caule aphyllo. *Plukn. Almag. pag.* 368. & *Phyt. Tab.* 319. *Fig.* 6. Tiru-Calli *H. Malab. part.* 2. *Tab.* 44. Tithymalus Indicus, frutefcens. *Ray. hift. pl. pag.* 1710. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 66. & *H. Amft. tom.* 1. *Fig.* 14. Offifraga lactea, Patta Tulang. *Rumph. Herb. Ambon. auctuar. cap.* 80.

TITHYMALUS Orientalis, articulatus, junceus, aphyllos. *Muf. Zeyl. pag.* 50. Tithymalus Orientalis, foliolis junceis *ibidem pag.* 54. Tithymalus Orientalis, articulatus, junceus, aphyllos, an piper longum, anguftiffimum ex Florida *C. B.* Felfel Tavil *Alpini Muf. Zeyl. pag.* 63. Piper longum anguftiffimum apud *C. B. P. pag.* 412. occurrit, & Felfel Tavil apud *Alpin. de pl. Ægypt. cap.* 30. *pag.* 96. huc fpectat Tithymalus Indicus, vimineus, penitus aphyllos. *Boerh. Ind. H. L. Bat. part.* 1. *pag.* 257. quae prioris diverfitas, ut & forte haec, quae MUNAKIRYA Zeylonenfibus dicitur.

TITHYMALUS Botryoides, Zeylanicus, cauliculis villofis, *Herb. Herm.* qui infculptus eft *Tab.* 104. Tithymalus Botryoides, Zeylanicus, hirfutus. *Muf. Zeyl. pag.* 31. Tithymalus Botryoides, Zeylanicus, repens, cauliculis villofis. *Commel. Cat. hort. Med. Amft. in oct. pag.* 351. Tithymalus Botryoides, major, Zeylanicus, procumbens, foliis & cauliculis villofis. *Plukn. Almag. pag.* 373. & *Ray. tom.* 3. *pag.* 428.

Tithy-

Tithymalus Indicus, annuus, dulcis Botryoides, geniculatus, *Par. Bat. Pr. pag.* 382. Tithymalus dulcis, Parietariae foliis hirſutis, floribus ad caulium nodos conglomeratis. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 82. & *Hiſt. Jam. vol.* 1. *pag.* 197. *Ray. tom.* 3. *pag.* 430. apud quos reliqua vide ſynonyma. Chamaecyſe Indiae utriusque, major, hirſuta. *Muſ. Petiv. no.* 758. Tithymalus Americanus, humifuſus, ſerratus, floribus in capitulum alis adhaerens congeſtis. *Plum. apud Tournef. inſt. rei herb. pag.* 88. Caulis hujus plantae ad radicem in plures cauliculos procumbentes dividitur, quorum quisque quadragonus, villis ſtrigoſis hirſutus, flaveſcens, quibus folia ſunt oppoſita, ovato-oblonga, obtuſe in ſummo ſerrata, ſcabra, petiolis fere nullis innixa: Flores alternatim ad genicula exeunt, brevi communi petiolo inſidentes & in capitula plurimi congeſti, formae & ſtructurae Tithymali vulgaris. &c.

Tithymalus Botryoides, erectus, florum capitulis conjugatis, & longiori pediculo inſidentibus. *Nobis. Tab.* 105. *Fig.* 1. Tithymalus Zeylanicus, exiguus, hirſutus, folio conjugato, florum capite globoſo. *Herb. Hart.* Tithymalus Botryoides, minor, Americanus, foliis hirſutis. *Plukn. Almag. pag.* 373. Tithymalus erectus, ſerratus, floribus in capitulum longo pediculo inſidens congeſtis. *Plum. Cat. pl. Amer. pag.* 2. Tithymalus Indicus, annuus, dulcis, floribus albis, cauliculis rubentibus & viridantibus. *Par. Bat. Pr. pag.* 381. *Plukn. Phyt. Tab.* 113. *Fig.* 2. Tithymalus erectus, acris, Parietariae foliis glabris, floribus ad caulium nodos conglomeratis. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 82. & *Hiſt. Jam. vol.* 1. *pag.* 197. *Tab.* 126: huc ſpectat Chamaecyſe Americ. major, floribus glomeratis, Cynocrambes folio glabra. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 31.

A priori differt haec planta, multoque tenerior ac minor, annua quoque eſt, cujus caulis eſt ſimplex, teres, villoſus, villis ruffeſcentibus, ſemipedalis; Folia ſunt oppoſita, oblonga, obtuſe & vix ſerrata, ex foliorum alis petioli unciales alterne provenientes continent floſculos plurimos, in capitulum geminum utcunque oppoſitum aggregatos, forma & ſtructura prioris.

Tithymalus erectus, floribus rarioribus, foliis oblongis, glabris, integris. *Nobis. Tab.* 105. *Fig.* 2. Tithymalus Zeylanicus, annuus, erectus, folio oblongo, conjugato. *Herb. Hart.* Tithymalus tenellus, Indicus, Chamaecyſes foliis, floſculis incarnatis. *Herb. Herm.* & *Muſ. Zeyl. pag.* 47.



Fig. 1. TITHYMALUS Botryoides, erectus, florum capitulis conjugatis, & longiori pediculo insidentibus. Nobis.

Fig. 2. TITHYMALUS erectus, floribus rarioribus, foliis oblongis, glabris, integris. Nobis.

Fig. 3. TITHYMALUS humilis, ramosissimus, hirsutus, foliis Thymi serratis. Nobis.

47. huc fpectat Tithymalus Botryoides, Maderasp. Hyperici foliis non crenatis, floribus ex alis uno verfu provenientibus. *Plukn. Phyt. Tab.* 43. *Fig.* 7. & Tithymalus arbor foliis Amygdali obtufis *Plum. Cat. pl. Americ. pag.* 1. & Coacica Brafilienfibus, Peplis major, flofculis albis. *Markgr. lib.* 1. *cap.* 9. *pag.* 15. KIRIWAENNA noftra Zeylonenfibus dicitur, quae caulem habet erectum, teretem, in quinque vel plura genicula divifum, glabrum, viridem, varie ramofum, ramis faepius bifidis, qui folia gerunt oppofita, ovalia, integra, in aliis laeviter & obtufe ferrata, utrinque glabra, viridia: ex alis foliorum prodit petiolus communis, uncialis, continens pauciores flofculos in fafciculum difpofitos, parvos, petioli hi floriferi alternatim exeunt ex alis, fcilicet ex alterutra ala, nunquam ex utraque, quo a *Pluknetii* planta differt.

Tithymalus humilis, ramofiffimus, hirfutus, foliis Thymi ferratis. *Nobis. Tab.* 105. *Fig.* 3. Tithymalus Zeylanicus, exiguus, ruber, folio Nummulariae. *Herb. Hart.* Tithymalus minimus, ruber, rotundifolius, procumbens. *Bobart. Hift. Oxon. tom.* 3. *pag.* 340. Tithymalus procumbens, Chamaecyfe villofa, major, caulibus viridibus. *Plukn. Almag. pag.* 372. Tithymalus exiguus, procumbens, Chamaecyfe dictus. *H. L. Bat. pag.* 602. quae Chamaecyfe *J. B. tom.* 3. *pag.* 667. dicitur, cui noftra maxime convenit, ut & Peplis Mariland. minima, ramofiffima, anguftifolia. *Ray. tom.* 3. *pag.* 431. & *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 83 Chamaecyfe Americana, minor, Paronychiae Hispanicae Clufii facie, foliis Serpilli ferratis. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 31. qui forte Tithymalus humifufus, floribus in capitulum alis adhaerens congeftis. *Plum. Cat. pl. Amer. pag.* 2.

E radice fibrofa, firma, craffiufcula, nigra, intus albicante oritur caulis tenuis, flexilis, fubhirfutus, qui paulo fupra terram erumpens plurimos dat ramos tenuiffimos, femipedales, alternatim exeuntes, & femiunciali fpatio fere remotos, qui etiam alternatim parvos ramulos fimili modo emittunt. Folia ad articulos & divifiones caulis conjugata funt, minima, Thymo vel Serpillo fere aemula, feffilia, ovata, laeviffime ferrata; e quorum alis flofculi prodeunt minutiffimi, in parva capitula collecti. Facies caeterum plantae eft Thymo, Serpillo, vel Acino proxima.

Tithymalus tenuifolius, aquaticus, foliis raris. DYANELLI Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 54.

TITTAGAEDI & TITTUWAEL. *Muf. Zeyl. pag.* 67. a *Titta* quod amarum notat, plantula enim grate amaricat.

TOTHYA fructum Cymbae fimilem ferens. *Muf. Zeyl. pag.* 48. a *Tothu* Cymba. dicitur & TOTHILA.

TRIBULUS terreftris, Zeylanicus, cauliculis villofis, fructu acuminato. *Nobis. Tab.* 106. *Fig.* 1. Tribulus Zeylanicus, terreftris, flore luteo, fructu fpinofiffimo. *Herb. Hart.* Tribulus terreftris, folio Ciceris, fructu aculeato, Zeylanicus. *Muf. Zeyl. pag.* 44. Tribulus terreftris, medius, Zeylanicus, *Commelini Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 100. Tribulus terreftris, Indiae Orientalis, foliis Viciae fubrotundis, & villofis. *Tournef. inft. pag.* 265. Tribulus terreftris incanus, Indicus, lanuginofus, paucioribus in foliis pinnulis, fructu pediculo longiori infidente. *Ray. hift. pl. tom.* 3. *pag.* 650. Tribulus terreftris, fructu turbinato, foliis lanuginofis. *Plum. Cat. pl. Amer. pag.* 7. Hujus generis characterem habent *Linnaeus in Char. pl. gen. pag.* 128. *Breyn. loc. cit.* & *Amm. Char. pl. pag.* 599.

Caulis noftrae plantae eft longus, pedalis, & ultra, hirfutus, coloris ftraminei. Folia e caule exeunt pinnata, fine inpari, quinque utcunque paribus compofita, in vulgari autem Tribulo pinnae crebriores ut plurimum funt. Pinnae hae funt oblongae, obtufae, integerrimae, fubhirfutae, virides. Ex fingula foliorum ala ramulus prodit ejusdem cum caule figurae, fed brevior, multo minor, & alternatim faepius pinnas fuas producens; Ex eadem ala in adultioribus ramis faepius flos unicus unciali petiolo infidens provenit, dimidio circiter major, quam in vulgari Tribulo, qui & fructum producit in inferiori parte brevibus fpinulis obfeffum, in fuperiori tribus, quatuorve longioribus aculeis armatum, tenuis porro hic fructus eft, oblongus, multumque a vulgaris fructu differens.

TRIFOLIUM procumbens, Zeylanicum, hirfutum, Loti facie. *Nobis. Tab.* 106. *Fig.* 2. Trifolium veficarium, repens, Phafeoli foliis hirfutis. *Muf. Zeyl. pag* 42. Lotus Zeylanica, fylveftris, repens, flore luteo. *Herb. Hart.* cum qua & convenit Lotus parva, Cretica, procumbens, incana, quaternis filiquis cruciatim difpofitis. *Plukn. Phyt. Tab.* 43. *Fig.* 3. Noftrae vero plantae filiculae haud ita propullularunt, ut pro certo concludere poffimus, an fint cruciatae. huc & fpectat Loto pen-



TRIFOLIUM procumbens, Zeylanicum, hirsutum, Loti facie. Nobis.

TRIBULUS terrestris, Zeylanicus, cauliculis villosis, fructu acuminato. Nobis.



VALERIANELLA *foliis nervosis, acutis, flosculis in caulium summo quasi umbellatis. Nob.*

pentaphyllo, filiquofo fimilis, Anonis non fpinofa, foliis inftar Cifti glutinofis & odoratis. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 74. & *Hift. Jam. vol.* 1. *pag.* 186. *Tab.* 119. *Fig.* 1. Characterem hujus generis habet *Linnaeus in char. pl. gen. pag.* 229. Caules noftrae plantae funt tenues, plures ad radicem fimul exeuntes, filiformes, rarius fubdivifi; fummis ramulis infident flores in capitula folitaria fquammulis inftructa collecti, coloris lutei, Folia funt Myrti, variae magnitudinis, oblonga, terna, alterna, vel oppofita, ad bafin petioli caulem vaginantia, hirfuta, & vifcofa, ut tota denique planta.

TRIOPTERIS Indiae Orientalis, feu Arbufcula Amygdalae nanae folio, difpermos, filiqua Thlaspeos Diofcoridis, ternis amplioribus extantibus alis donata, WAENELLA Zeylonenfibus dicta. *Plukn. Almag. pag.* 377. quam vide *fupra pag.* 55. ad Carpinum forte vifcofam &c.

VALERIANELLA foliis nervofis, acutis, flofculis in caulium fummo quafi umbellatis. *Nobis. Tab.* 107. WAERANYA Zeylonenfibus. *Herb. Herm.* & *Muf. Zeyl. pag.* 4.

Paluftris haec planta videtur, caulis enim ejus craffus, fungofus, glaber, fulcatus, & quadragonus eft, folia emittens unciali, aut fesquiunciali fpatio remota, pediculis brevibus fuffulta, bina fibi femper oppofita, ad quorum ortum vagina quaedam membranacea e caulium nodis erumpit, quae foliorum petiolos includit, aut e qua proveniunt petioli folia fuftinentes lata, glabra, venofa, integerrima, acuminata; caulis fummum terminant pediculi floriferi, communes, ex fuperiorum foliorum alis provenientes, nunc longiores, nunc triplo fere breviores, qui in fummo in proprios iterum pedunculos, ex alis minorum foliorum ortos dividuntur, & flofculos umbellatim quafi difpofitos fuftinent, quorum calix eft erectus, femiquadrifidus, anguftus, acutus, perpetuus, petalum floris unicum, tubulatum, erectum, calice paulo longius, acutum, femiquadrifidum, ftamina quatuor longitudine petalorum, piftillum fimplex, germen dans intra florem, uti in Tabula noftra apparet; ubi lett. A. calicem exhibet, B. petalum quadrifidum cum quatuor ftaminibus, C. piftillum cum Embryone.

VALERIANELLA paluftris, foliis nervofis, oblongis, flofculis ad caulium nodos, inter foliorum finus collectis. *Nobis. Tab.* 108. *Fig.* 1. Pulegium latifolium, Zeylanicum, aquaticum, inodorum, cauliculis atro-

 pur-

purpureis. *Herb. Herm.* an Veronicae affinis, Indiae Orientalis, Pulegii facie, calicibus tomentofis. *Plukn. Phyt. Tab.* 232. *Fig.* 7? Cujus autem folia funt rotundiora. Caulis noftrae plantae eft fimplex, pedalis, quadragonus, purpurafcens, ad quem folia funt oppofita, oblonga, feffilia, integra, nervofa; in finu foliorum oriuntur flofculi conglomerati, plurimi, inter quae ramulus enafcitur fecundum gradus aetatis. Singulus autem flofculus calicem habet quadridentatum, petalum erectum, quadrifidum, piftillum unicum, bifidum, qui fructum dat fubrotundum, bilocularem Valerianellae in omnibus fimilem.

VERBENA Indica, rotundifolia, fpicis comofis. *Muf. Zeyl. pag.* 58. an Bliti fuperius defcripti fpecies? an vero Verbena nodiflora, major, Indica, flore niveo. *Hermanni* apud *Moris tom.* 3. *pag.* 419?

VERONICA hirfuta, latifolia, Zeylanica, aquatica. *Muf. Zeyl. pag.* 29. Veronica Indica, Teucrii folio, Nanfchera-Canfchabu Malabaris dicta. *Commel.* in not. ad *H. Malab. part.* 10. *Tab.* 50. *Plukn. Almag. pag.* 384.

VERONICA Zeylanica, folio conjugato Rorismarini, flore albefcente. *Herb. Hart.* quae eft Parpadagam *H. Malab. part.* 10. *Tab.* 35. & Spergula Indica, major, flore candido. *in notis ibidem.* quae a noftra planta non differt, nifi quod flores faepius gemini communi petiolo in noftra proveniant planta, in hac autem femper folitarii.

VICIA foliis glabris, venofis, oblongis, floribus gemellis, planis. *Nobis. Tab.* 108. *Fig.* 2 Viciae elegans genus, PILAE Zeylonenfibus. *Herb. Herm.* Vicia Zeylanica, elegans. *Muf. Zeyl. pag.* 37. an Vicia peregrina, anguftiffimis foliis, filiqua lata, glabra. *Plukn. Phyt. Tab.* 233. *Fig.* 6?

Caulis noftrae plantae eft teres, flexilis, purpureus, ad genicula ramofus, folia pinnata, novem vel decem paribus pinnarum conftans; Pinnae omnes funt oblongae, obtufae, in fummo apice acutiffimo feu aculeo, qui nervi medii productio eft, ornatae, glabrae, utrinque virides, venofae; Ex aliis foliorum dependent flores gemini vexillo plano & lato conftantes. Siliqua deeft.

VICIA Indica, verminofa, foliis cordatis, flofculis fuaverubentibus. *Muf. Zeyl. pag.* 53. Vicia Indica, elegans, foliis oblongis, cordatis, floribus rubicundis, filiquis anguftis. *ibidem. pag.* 56. PANUPILAE Zey-



Fig. 1.

Fig. 2.

VICIA foliis glabris, venosis, oblongis, floribus gemellis, planis. Nobis.

VALERIANELLA palustris, foliis nervosis, oblongis, flosculis ad caulium nodos, inter foliorum sinus collectis. Nobis.





VITEX trifolia, floribus per ramos sparsis. Nobis.

Zeylonenfibus, a *Panuwa* quod vermiculos, feu quaevis infecta denotat, *Pilae* autem generale nomen eft pro omni genere *Viciae. ibidem.* hujus fpecies eft

Vicia Indica, verminofa, minor. HINPANUPILAE dicta. *Muf. Zeyl. pag.* 43.

Viscus fructibus oblongis, rubicundis, floribus oblongis, tubulofis. *Muf. Zeyl. pag.* 20. Vifcum forte Caryophylloides, minus, foliis prunae inftar candicantibus, flore tripetalo, purpureo, femine filamentofo. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 77. PILILA & UDHAWAEDHYA Zeylonenfibus.

VITEX trifolia, Indica, odora, hortenfis, floribus coeruleis, racemofis. *Muf. Zeyl. pag.* 48. Jasminum Indicum, cyneum, odore gravi, Syringae coeruleae facie. *ibidem.* Vitex trifolia, minor, Indica, *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 104. *Plukn. Almag. pag.* 390. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 69. Negundo foemina. *Acoft. edit. Ital. pag.* 211. Negundo arbor foemina. *J. B. part.* 2. *lib.* 15. *pag.* 189. & *Herb. Hart.* quae apud *Plukn. in Phyt. Tab.* 206. *Fig.* 5. exprimitur, ut & in *H. Malab. part.* 2. *Fig.* 11. Cara-Nofi dicta. & eft Piperi fimilis fructus ftriatus foemina, *C. B. P. pag.* 412. & Frutex Indicus, baccifer, fructu calyculato, monopyreno *Negundo* dicta. *Ray. hift. pl. pag.* 1575. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 31. NIKA Zeylonenfibus vocatur. *Nochile Lagondi* Malaic.

Vitex trifolia, odorata, fylveftris, Indica, *Muf. Zeyl. pag.* 47. Vitex trifolia, major. *Rauwolf. C. B. ibidem.* Negundo prior, feu Mas *Acoftae in octav. pag.* 286. & apud *Cluf. cap.* 38. Negundo Mafchio *Acoft. edit. Ital. pag.* 210. Negundo arbor, mas. *J. B. part.* 2. *lib.* 15. *pag.* 189. Vitex trifolia, minor, Indica, ferrata. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 104. *Plukn. Almag. pag.* 390. Negundo mas variorum. *Commel. Fl. Malab. pag.* 69. Bem-Nofi. *H. Malab. part.* 2. *Tab.* 12. WALNIKA Zeylonenfibus, id eft *Nika*, feu Vitex fylveftris. hujus generis character invenitur apud *Linnaeum in char. pl. gen. pag.* 186.

Vitex trifolia, floribus per ramos fparfis. *Nobis. Tab.* 109. Vitex Zeylanica, inodora, flofculis fpadiceis, tenellis. *Herb. Herm.*

Frutex hic caulem gerit lignofum, rectum, fcabrum, cinereo-fufcum,

qui variis locis ramulos floriferos emittit ejusdem cum caule formae, rigidos nempe & fuſcos, in florum corymbos itidem terminantes: Folia per ramos ſunt ſparſa, quae petiolo unciali inſident tria, foliolo ſcilicet unoquoque itidem petiolato. Figura foliorum eſt oblongo-acuminata, margine integro, viridia utrimque, glabra, floſculi ſpadiceum habent colorem; reliqua Viticis.

VITIS folio Cucurbitae, ſeu non ſinuato. *Muſ. Zeyl. pag.* 7. an Schembra-Valli. *H. Malab. part.* 7. *Tab.* 6? quae Vitis ſylveſtris ſpecies. *Commel. in notis.* & *Fl. Malab. pag.* 69. MALALABU Zeylonenſibus. *Labu* Luſitanis notat *Poveram*, id eſt Cucurbitam lagenae formam referentem.

VITIS IDAEA Zeylanica, odoratiſſima. *Tournef. inſt. pag.* 608. Myrtus Zeylanica, fructu niveo, molli, aromatico, dulci, odore Citri. *Muſ. Zeyl. pag.* 65. Myrtus Zeylanica, odoratiſſima, baccis niveis, monococcis. *H. L. Bat. pag.* 434. ubi icon, & deſcriptio. Liguſtrum Zeylanicum, arboreſcens, Myrti Laureae foliis. *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 75. Myrtus Zeylanica. *Boerh. Ind. H. L. Bat. part.* 2. *pag.* 255. Myrtus forte arborea, foliis Laurinis, aromatica. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 161. & *Hiſt. vol.* 2. *Tab.* 191. *Fig.* 1. MARANDA & MARADA Zeylonenſibus.

ULMI foliis non nihil ſimilis Zeylanica, capreolata. *D. Hermans.* apud *Ray. tom.* 3. *dendr. pag.* 128. ubi additur: Folia ramis conjugata adnaſcuntur, contra quam in Ulmo. Capreoli ex apice pediculorum, qui folium ſuſtinent, egrediuntur.

URALA. *Muſ. Zeyl. pag.* 50. id eſt *Ala* porcinum; *Ura* denotat porcum.

URINARIA Indica, erecta, vulgaris. *Herb. Hart. Tab.* 93. *Fig.* 2. & *Muſ. Zeyl. pag.* 11. ubi & Tithymalus non lacteſcens vocatur. Urinaria Zeylanica, erecta, JATHA-ÆMBULA Zeylonenſibus. *Par. Bat. Pr. pag.* 385. Kirganeli *H. Malab. part.* 10. *Tab.* 15. quae Vitis Idaeae affinis, flore hexapetalo ex albicante. *Commel. in notis.* & *Fl. Malab. pag.* 69. Fruticulus capſularis, hexapetalus, foliis brevioribus, ſubrotundis, & denſius ſtipatis. *Plukn. Phyt. Tab.* 183. *Fig.* 5.

E radice tenui, fibroſa, albicante oritur haec planta caule recto, viridi, tenui, lignoſo, rarius ramoſo, pinnas foliorum alternatim producente, quae pinnae etiam alternatim brevibus pediculis oriuntur,

ad



Fig. 2.

Fig. 1.

URTICA fatua, spicata, foliis floribusque petiolis longissimis donatis. Nobis.

URTICA pilulifera, foliis majoribus longissimis pediculis, minoribus brevibus pediculis donatis. Nobis.

ad quarum alas flofculi folitarii, herbacei, hexapetali proveniunt tenuiffimis infidentes pediculis, quae vafcula in tres communiter cancellos diftincta relinquunt, continentia minutiffima totidem femina triangula, unde ad *Tithymalum*, ni hujus generis fit, proxime accedit: *Hermanni* autem nomen huic plantae inpofitum retinuimus ob fingularem vim Medicam, qua Urinam pellere valet, Urinariae dictae.

URINARIA Indica, fupina, cauliculis rubentibus. *Muf. Zeyl.* 4 & 16. Urinaria Zeylanica, repens, cauliculis rubentibus. *ibidem. pag.* 37. Tsjeru-Kirganeli *H. Malab. part.* 10. *Tab.* 16. quod *in notis* Vitis Idaeae affinis, flore hexapetalo, rubefcente. *Commel.* & *Fl. Malab. pag.* 69. an Fruticulus capfularis, hexapetalus, brevioribus foliis & anguftis. *Plukn. Phyt. Tab.* 183. *Fig.* 6? PITHAWAKKA & BINKOHUMBA Zeylonice dicitur. de qua in *Muf. Zeyl.* notatur, quod fit planta humi jacens, foliis ac fructu vulgari paulo major, ac virtutibus validior. Flofculi funt pentapetali & herbacei, capfula in tres partes dehifcit, continens femina minutiffima, ex luteo albicantia: Febrifuga eft, & diuretica, decoctum ejus vehementer pellit Urinam, unde ei nomen. BINKOHUMBA vocatur a *Binko*, quod humum notat, cui ftrata jacet.

ULHAENDA. *Muf. Zeyl. pag.* 25.

UVA Zeylanica, fylveftris, Mali Armeniacae fapore, Uves de Mato Lufitanis. *Muf. Zeyl. pag.* 8 & 31. ubi pro Narum-Panel *H. Malab. part.* 2. *Tab.* 10. habetur. qui eft Frutex baccifer, fructu ad fingulos flores multiplici. *Ray. hift. pl. pag.* 1636. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 30. in *Muf. Zeyl. pag.* 8. defcribitur, quod fit Frutex farmentofus, foliis glabris, flofculis puniceis, ftellatis, fex feptemve uvas in racemo proferens, fubhirfutas, molles, cinereas, parvas, teretes, femiunciales, fapore vinofo Mala Armeniaca aemulante. PALUKAENA Zeylonenfibus dicitur. *Baala-Paletti. Colo-apocaro. Uves de Mato* Lufitanis. ut conftat ex *Muf. Zeyl. pag.* 31.

URTICA pilulifera, foliis majoribus longiffimis pediculis, minoribus brevibus pediculis donatis. *Nobis. Tab.* 110. *Fig.* 1. Urtica Zeylanica, minor, pilulas ferens, vulgaris facie. *Herb. Hart.* Urtica racemofa, pilulifera tricoccos. *Muf. Zeyl. pag.* 60. Urtica Zeylanica foliorum

pedi-

pediculis tenuiſſimis & longiſſimis, funiculis floriferis pariter tenuiſſimis, praelongis, raris floſculis donatis. *Ray. hiſt. pl. part.* 3. *pag.* 106. Lupulo vulgari ſimilis Indiae Orientalis, floribus in ſpicam, ex origine foliorum prodeuntem, diſpoſitis. *Plukn. Phyt. Tab.* 201. *Fig.* 5. an Urticae genus Indiarum minime pungens, forte Batti-Schorigenam *H. Malab. part.* 2. *Tab.* 40. quae plantae noſtrae penitus convenit, & eſt Urtica, Braſilienſis *Pino* indigenis dicta *Ray. hiſt. pl. pag.* 159. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 69. Pino *Markgr. pag.* 8. KATSCHAMBALI noſtra Zeylonenſibus dicitur, cujus caules ſunt tenues, bipedales, ſulcati, ſubhirſuti, virides, folia per caulem diſperſa, majora petiolis longiſſimis inſidentia, minora autem breviſſimis adfixa pediculis, ſunt autem cordata, in ambitu profundis, obtuſiſque crenis inſculpta, ſuperne viridia, inferne incana, ſcabra; ex alis foliorum exeunt pediculi tenuiſſimi, longiſſimi, tres quatuorve uncias longi, ad medium circiter floſculos producentes congregatos, & per petiolum ſparſos, in ſummo crebriores, Urticae vulgari ſimiles, &c.

URTICA fatua, ſpicata, foliis floribusque petiolis longiſſimis donatis. *Nobis. Tab.* 110. *Fig.* 2. Urtica fatua, aculeata, Cannabis Erraticae foeminae flore verticillato. *Herb. Herm.* Urtica forte major, racemoſa, humilior, pungens, ſed non urens. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 38. & *Hiſt. Jam. vol.* 1. *pag.* 12. & Urtica racemoſa, amplo Coryli folio. *Plum. Cat. pl. Amer. pag.* 11.

Noſtrae plantae caulis eſt modice craſſus, viridis, ſulcatus, glaber, aculeis breviſſimis, inermibus, ad latera inſtructus, foliis plurimis, praeſertim ad genicula, binis ſibi oppoſitis minoribus foliolis provenientibus gaudens, majora autem folia ſolitaria, alternatim ex caule exeunt, longiſſimis, quadriuncialibus petiolis inſidentia, quae formam fere habent cordatam, ſecundum marginem crenis inciſa, in acutiſſimum apicem deſinentia, ſuperius ſunt rigida, crinibus armata, laete tamen virentia, duas uncias lata, tres circiter longa, venoſa, verſus caulis ſummitatem parva, & ſimul plura folia minora ad genicula proveniunt ex alis quaſi majorum foliorum, ubi & petioli longiſſimi quinque vel ſex uncias longi, floriferi oriuntur, qui floſculos gerunt plurimos, per interſtitia, & in faſciculum quaſi collectos, in petioli medio incipientes, & ibi unciali fere ſpatio remoti ſunt, & quo magis verſus ſummum vergunt, eo faſciculi floriferi magis accedunt, & in ſummo fere ſibi

fibi invicem accumbunt, flofculi autem funt luteoli, femina relinquentes fere cordata, compreffa, & ad latera punctata.

Urtica Zeylanica, hortenfis, urens, foliis Cannabinis. *Muf. Zeyl. pag.* 47. quae & fylveftris etiam eft, ac Urtica Zeylanica, floribus ac feminibus Cannabinis, feu Cannabina Indica, fylveftris, Urticae foliis urentibus vocatur in *Muf. Zeyl. pag.* 29. WATUHAHAMBJLYA Zeylonenfibus vocatur, id eft Urtica hortenfis, ut explicatur *ibidem. pag.* 47. hujus generis characterem habet *Linnaeus in char. pl. gen. pag.* 283.

WANATITTAWAEL. *Muf. Zeyl. pag.* 61. a *Wani* quod ulcera denotat. *Titta* amarum. *Wael* vimen. Radix eft amara, & lactefcens. Flofculi funt lutei.

WELAGHA. *Muf. Zeyl. pag.* 3. quod pronunciatur *Welengha.*

XANTIUM feu Lappa, URUKOSSA Zeylonenfibus dicta. *Muf. Zeyl. pag.* 59.

ZEDOARIA Zeylanica, Camphoram redolens, HARANKAHA dicta. *H. L. Bat. pag.* 636. *Muf. Zeyl. pag.* 50. *Par. Bat. Pr. pag.* 386. *Plukn. Almag. pag.* 397. *Ray. hift. pl. tom.* 3. *pag.* 648. Zedoaria Zeylanica, HARANKAHA Indis vocata. *Amm. H. Bofian. pag.* 38. de hac in *Muf. Zeyl.* dicitur; Radix recenter effoffa Camphorae fpirat odorem, poftmodum Zedoariae; Radicem hanc inter facra reponunt Cinghali, ad quam folam in morbis defperatis confugiunt. & *Grimm. in Labor. Ceyl. pag.* 118. de hac dicit: Maximi eft pretii apud Cinghalenfes, in morbis fuis periculofiffimis ea vel fola, vel cum aliis medicamentis commixta, quae venenum impugnare debent, utuntur. Radix optime fudores, & urinas movet. Sal quoddam volatile, & Oleum per deftillationem emittit, quod in minima dofi vires totius plantae poffidet. &c. Dum haec radix eft condita, non alium faporem habet, quam *Enula Campana.*

Zedoaria rotunda & officinarum; de hac vide *fupra pag.* 67. ad *Colchicum.*

ZINGIBER latifolium, fylveftre. *H. L. Bat. pag.* 636. ubi icon & defcriptio. *Muf. Zeyl. pag.* 51. *Moris Tab.* 14. *Sect.* 8. *Fig.* 2. Zerumbet Officinarum *Petiv. Gazoph. nat.* & *art. Tab.* 22. *Fig.* 3. quae in *Muf. Zeyl.* male pro Zedoaria Garziae, in *H. L. Bat.* bene pro Zerumbet *Garz. ab hort. lib.* 1. *cap.* 43. *pag.* 158. habetur. & eft Zerumbet Garziae ab horto, vel Zingiber fylvaticum, *Kua* Malabaris dicta, vel WALINGHURU Zeylonenfium *Amm. H. Bofian. pag.* 38. Gengioro *Acoft. edit. Ital. pag.* 196. Zerumbet *Cluf. lib.* 1. *aromat. cap.* 43. *Dale Pharmac. pag.* 328. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 71. quae eft Kua. *H. Malab. part.* 11. *Tab.* 7. ubi vide notas. & apud *Plukn. in Almag. pag.* 397. reliqua fynonyma ad Zedoariam longam *C. B. Pin. pag.* 35. Zerumbet Tommon a *Rumph. in Herb. Ambon. lib.* 8. *cap.* 17. vocatur. cujus Figura proxime cum Curcuma convenit. WALINGHURU Zeylonenfibus dicitur, id eft Zinziber fylveftre.

ZINGIBER fylveftre, flavum, KALUWAALA Zeylonenfibus. *Muf. Zeyl. pag.* 51. an Zingiber Zeylanicum. *H. Beaum. pag.* 42? quod forte Kattu-Infchi *H. Malab. part.* 11. *Tab.* 13. quod a *Petiv. in Gazop. nat.* & *art. Tab.* 23. *Fig.* 1. pro Zedoaria officin. depingitur, in notis vero ad *H. Malab.* pro Zingib. qui mas a *Pifon.* in *Mantiff. arom. pag.* 189. *cap.* 12. habetur, ut & a *Pluknet. in Almag. pag.* 397. ad Zingiber *C. B. P. pag.* 35. Zingiber *Acoft. lib. aromat. cap.* 32. apud *Clufium* etiam defcribitur, ut & a *Rumph. Herbar. Ambon. lib.* 8. *cap.* 14. & Zingiber hoc fylveftre ab incolis KALUWALA dictum a *Grimm. in Labor. Ceyl. pag.* 119. fequenti modo defcribitur. Pulcherrima eft planta, quae mediocris eft altitudinis, florem profert rubicundum, qui non abfimilis eft a Pini pomo, fert etiam nigrum femen, ficut nigrum *Cuminum*, quod valde calidum eft, jacet in quibusdam globulis inter folia florum inclufum. Flos ifte continet in fe magnam quantitatem liquoris, qui rorem fortiffime attrahit, eum ego mane expreffi, & in Balneo Mariae per alembicum deftillavi, eumque praeftantiffimum vehiculum exiftimo. Tota haec planta cum radice deftillata pulchrum Cryftallinum Sal Volatile, oleofum emittit, quod certiffime praeftantiffimum eft medicamentum vires totius plantae continens adverfus graviffimos morbos, dofis folum eft a tribus ad quatuor grana: Eandem virtutem aqua continet, pro vehiculo affumpta.

Zingiber angustiori folio, foemina, utriusque Indiae alumna. *Plukn. Almag. pag.* 397. Zinziber *C. B. P.* Chilli *Hernand. Mus. Zeyl. pag.* 69. *Par. Bat. Pr. pag.* 386. *Sloan. Cat. pl. Jam. pag.* 60. *Hist. Jam. vol.* 1. *pag.* 163. Chilli Indiae Orientalis *Hernand. Hist. Mexioc. pag.* 169. Zinziber *Moris hist. pl. Tab.* 14. *Sect.* 8. *Fig.* 1. *pag.* 251. Zinziber foemina *Pisonis Mantiss. arom. pag.* 190. Inschi, vel Inschi-Kua. *H. Malab. part.* 11. *Tab.* 12. cujus notas characteristicas optime explicatas vide a *Linnaeo in tract. de Musa Cliffort. pag.* 15. ad *Amomum.* vires vero & usum apud *Samuel Dale Pharm. pag.* 327. INGHURU Zeylonensibus haec vocatur.

F I N I S.

W

ADDENDA, & CORRIGENDA.

Pag. 7. ad ADHATODAM fpica longiffima. addatur Frutex Indicus, fpicatus, floribus galeatis, vafculo bivalvi, dicocco. *Ray. hift. pl. pag.* 1709. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 32.

10. ad ALKEKENGI fomniferum add. Alkekengi fructu parvo, verticillato. *Tournef. inft. pag.* 151. &c.

19. ad AMYGDALUM, quae Nagam *H. Malab.* add. quae eft filiquofa flore umbellato, pentapetalo, filiquis digitalibus, fpadiceis. monofpermis, ad unum florem pluribus. *Ray. hift. pl. pag.* 1753. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 62.

21. ad ANONAM fructu virefcente add. Atamaram & Janiljaca *H. Malab. part.* 3. *pag.* 21. quae eft Pomifera Indica, fructu conoide, fquamofo, viridi. *Ray. hift. pl. pag.* 1650. & Ate vel Ahate de Panucho *Hernand. Hift. Mexioc. pag.* 348 & 454.

22. Pro ANTISDESMA lege ANTIDESMA.

27. ad Elengi *H. Malab.* add. quae eft Prunus Malabarica, fructu calyculato. *Ray. hift. pl. pag.* 1564. & *Commel. Fl. Malab. p.* 57. & Oleae adfinis pyrifolio Malabarica, flore odorifero, ftellato, *Syen in notis ad H. Malab.*

33. *Linea* 2. pro viridibus lege viribus.

& ad Katsjula Kelengu *H. Malab. pro part.* 13. lege 11. ubi addatur, quae in notis eft Planta bifolia, radice tuberofa, flore tripetalo, difformi, Malabarenfis. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 55.

42. ad BALSAMINAM quae Tilo-Onapu *H. Malab.* add. Quae in *notis* Perficaria filiquofa, Indica, flore rofaceo colore, fructu pilofo. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 52.

53. ad CARA-SCHULLI *H. Malab.* add. qui eft Frutex fpinofus, Capparis forma, filiqua bivalvi, brevi. *Ray. hift. pl. pag.* 1755. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 32.

61. ad CHRYSANTHEMOIDES addatur: hujus generis Character etiam defcribitur a *Linnaeo in char. pl. gen. p.* 264.

75. ad CORALLODENDRON add. hujus generis characterem dedit Linnaeus in *Char. pl. gen. pag.* 216.

84. ad CAVALAM *H. Malab.* add. quae in *notis a Syen* vocatur Nux Malabarica, fulcata, mucilaginofa, fabacea, & Arbor filiquofa Malab. pluribus ad fingulos flores lobis. *Ray. hift. pl. pag.* 1754. & *Commel. Fl. Malab. p.* 8.

93. ad ELAIOCARPOS quod Perun-Kara *H. Malab.* add. Olea Malabarica, fylveftris, fructu dulci. *Ray. hift. pl. pag.* 1546. & *Commel. Fl. Malab. pag.* 48.

95. ad EUPATORIOPHALACRON add. *Linnaeus* hujus characterem etiam dedit in *char. pl. gen. pag.* 259.

101. ad FLOS-CLITORIUM add. char. hujus vide apud *Linn. in char. pl. gen. pag.* 216. ad CLITORIAM.

104. ad GENISTAM pro *Tab.* 47 lege 49.

121. ad HOTTONIAM pro Sarafraga lege Saxifraga.

126. *Linea* 4. pro umbilicato lege umbellato.

136. ad KETMIAM Tiliae folio. add. Bupariti *H. Malab. part.* 1. *pag.* 51.

142. ad LIGUSTRUM pro *Tab.* 172. lege 72.

145. ad LYCOPODIUM pro *Dodart.* lege *Bobart.*

159. Pro MICROCOS lege MICROCOCOS.

165. in fine, pro infunliforme, lege infundibiliforme.

191. ad PHASEOLUM lobis undiquaque pilofis adde Nou-Corona *H. Malab. part.* 8. *pag.* 61. &c.

209. in fine add:
SAURURUS folio lato, BETELES dicta, Siriboa BONTII. NOBIS. Quam vide fupra ad Beteles *pag.* 46.
SAURURUS volubilis, Convolvuli majoris folio, Betele Tambul. C. B. P. NOBIS. quam itidem exhibitam vide *pag.* 46.

218. *Linea* 15. pro remoto, lege remotus.

Reliqua pro arbitrio L. B. addat, corrigat, mutet.

LOCA & NOMINA
HORTI MALABARICI
ILLUSTRATA,

Et juxta Thesaurum Zeylanicum certis plantarum generibus tributa.

Horti Malabarici nomen.	*Pars.*	*Tabula.*	*Thesauri Zeylanici*	*Pagina.*
Acara-Puda.	Part. 10	20.	*Ros Solis.*	207
Acatsja-Valli.	7	44.	*Cuscuta.*	84
Adaca-Manjeu.	10	43.	*Sphaeranthos.*	221
Adamboe & Cadelipoea.	4	20 & 21.	*Ketmia.*	137
Ain Pariti.	6	43.	*Ketmia.*	133
Amba-Paja.	1	15.	*Papaja mas*	184
Ambel.	11	26.	*Nymphaea.*	173
Ameri.	1	54.	*Colutea, quae Indigo.*	69
Amolago.	7	16.	*Piper, qui Saururus.*	193
Ampana.	1	10.	*Palma.*	181
Ana-Schunda.	2	35.	*Solanum.*	219
Anavinga.	4	49.	*Grossularia.*	112
Anci-Veela.	9	23.	*Sinapistrum.*	215
Arana-Panna.	12	31.	*Filix.*	98
Aria-Bepou.	4	52.	*Azedarach.*	40
Atamaram.	3	29.	*Anona.*	21
Avanacu. & Pandi-Avanacu.	2	32.	*Ricinus.*	206
Bala.	1	12,13,14.	*Musa.*	164
Balam Pulli. & Maderam Pulli.	1	23.	*Tamarindus.*	222
Bara-Mareca.	8	44.	*Phaseolus.*	189
Basella.	7	24.	*Cuscuta.*	44
Batti-Scorigenam.	2	40.	*Urtica.*	232
Bel-Ericu.	2	56.	*Apocynum.*	25
Belilla.	2	18.	*Mussaenda.*	165
Bella-Modagam.	4	59.	*Arbor* TAKKADA.	30
Bellam-Patsja.	12	39.	*Lycopodium.*	145
Belutta.	9	2.	*Nerium.*	167

Horti

Horti Malabarici nomen.	*Pars.*	*Tabula.*	*Thesauri Zeylanici*	*Pag.*
Cupameni.	10	81.	*Ricinokarpos.*	203
Ela-Calli.	2	43.	*Euphorbio Tithymalus.*	95
Elengi.	1	20.	*Arbor, & Kauken.*	27 & 133
Elatteri.	11	4,5 & 6.	*Cardamomum.*	54
Ericu.	2	31.	*Apocynum.*	25
Hummatu.	2	28,29,30.	*Stramonium.*	221
Ily.	1	16.	*Arundo.*	35
Infchi.	11	12.	*Zingiber.*	235
Intfia.	6	4.	*Acacia.*	3
· Kadali.	4	42.	*Melaftoma.*	155
Kaida-Taddi.	2	1.	*Ananas.*	20
Kaka-Toddaly.	5	41.	*Arbufcula & Chamaelea.*	32 & 50
Kaku Valli.	8	36.	*Phafeolus.*	191
Kapa-Mava.	3	54.	*Anacardium.*	19
Kariil.	4	36.	*Nux.*	170
Katu-Bellovera.	6	46.	*Ketmia.*	137
Katou-Indel.	3	22 ad 26.	*Palma Dactylifera.*	183
Katou-Infchi.	11	13.	*Zingiber.*	234
Katou Kadali.	4	43.	*Melaftoma.*	154
Katou-Karua.	5	53.	*Cinnamomum.*	64
Katou-Naregam.	4	13.	*Granata Malus.*	111
Katou-Patsjotti.	5	7.	*Patsjotti.*	185
Katou-Tandale.	9	26.	*Crotalaria.*	82
Katsji Kelengu.	7	38.	*Rizophora.*	206
Katfula-Kelengu.	11	41.	*Aro-Orchis.*	33
Kattu-Kelengu.	7	37.	*Smilax.*	218
Katu-Tagera.	9	30.	*Aftragalus.*	37
Katu-Bala.	11	43.	*Cannacorus.*	53
Katu-Katfiil.	7	36.	*Rizophora.*	207
Katu-Mulla.	6	56.	*Jasminum.*	128
Katu-Uren.	10	54.	*Malvinda.*	149
Kedangu.	6	27.	*Emerus.*	93
Kindici-Valli.	8	27.	*Convolvulus.*	73
Kirganeli.	10	15.	*Urinaria.*	230
Konni.	8	39.	*Orobus.*	178
Kotsjiletti-Pullu.	9	71.	*Gramen.*	109
Kua.	11	7.	*Zingiber.*	234
Maderam-Pulli.	1	23.	*Tamarindus.*	222
Malacca-Schambu.	1	17.	*Jambos.*	124
Malan-Kua.	11	9.	*Colchicum seu Zedoaria.*	67
Mallam-Tsjulli.	9	83.	*Hedyfarum.*	114
Mandsjadi	6	14.	*Crifta-Pavonis.*	80
Manelli.	9	37.	*Dorycnium.*	89

Horti

Horti Malabarici nomen.	*Pars.*	*Tabula.*	*Thesauri Zeylanici*	*Pag.*
Manja-Pumeram.	1	21.	*Arbor tristis.*	32
Manja-Kua.	11	10.	*Curcuma rotunda.*	84
Manjella-Kua.	11	11.	*Curcuma longa.*	83
Mao.	4	1 & 2.	*Mangifera arbor.*	152
Mendoni.	7	57.	*Methonica.*	159
Modecca.	8	20.	*Convolvulus.*	72
Modira-Caniram.	8	24.	*Nux Vomica.*	171
Molago-Codi.	7	12.	*Piper rotundum.*	193
Motta-Pullu.	12	38.	*Gramen.*	110
Mouricou.	6	7.	*Corallodendron.*	74
Mulu-Schena.	11	19.	*Dracunculus.*	90
Muringu.	6	11.	*Moringa.*	163
Nagam.	6	21.	*Amygdalus.*	19
Nai-Corana.	8	35.	*Phaseolus.*	191
Nalla-Mulla.	6	50.	*Jasminum.*	128
Nandi Ervatam major & minor.	2	54& 55.	*Jasminum.*	129
Nanschera-Canschabu.	10	50.	*Veronica.*	228
Narinan-Pulli.	6	44.	*Ketmia.*	135
Narum-Panel.	2	10.	*Uva.*	231
Nehoemeka.	8	19.	*Bryonia.*	50
Nelam-Muri.	9	82.	*Hedysarum.*	114
Nelenschena.	11	20.	*Arum.*	34
Neli-Pouli.	3	47&48.	*Malus.*	148
Nelia-Tandale-Cotti.	9	27.	*Crotalaria.*	22
Nila-Barudena.	10	74.	*Melongena.*	157
Nilacamaram.	1	38.	*Acacia.*	5
Nir-Carambu.	2	51.	*Lysimachia.*	147
Nir-Pullari.	9	36.	*Phaseolus.*	188
Niti-Todda-Vaddi.	9	20.	*Hedysarum, vel Mimosa.*	120&160
Nuli-Tali.	4	56.	*Antidesma.*	22
Odalam.	1	39.	*Manghas.*	152
Onapu.	9	47.	*Balsamina.*	42
Pada-Kelangu.	7	49.	*Nux.*	171
Paeru.	4	15.	*Arbor Gummi Elemi fundens.*	28
Paeru.	8	41.	*Phaseolus.*	189
Pal-Valli.	9	12.	*Nerium.*	168
Panam-Palka.	4	5.	*Nux Myristica.*	172
Panambu-Valli.	7	53.	*Arundo.*	35
Pandi-Avanacu.	2	pag. 60.	*Ricinus.*	206
Pandi-Pavel.	8	9.	*Momordica.*	161
Panna-Kelengu-Maravara.	12	11.	*Polypodium.*	195
Papaja-Maram.	1	15.	*Papaja foemina.*	184
Pariti.	1	30.	*Ketmia.*	136
Parpadagam.	10	35.	*Veronica.*	228
Pavel.	8	10.	*Momordica.*	162

Horti

F I N I S.

I N-

INDEX
NOMINUM
ZEYLANENSIUM.

Ghons

Kor-

Ma-

Puru-

CATALOGI DUO PLANTARUM AFRICANARUM,

Quorum prior complectitur Plantas ab HERMANNO observatas,

Posterior vero illas continet, quas OLDENLANDUS & HARTOGIUS indagarunt.

CATALOGUS PLANTARUM AFRICANARUM,

Quas *Paulus Hermannus* Botanices Professor, ad Caput Bonae Spei olim obſervavit.

ABROTANOIDES Africana, vermiculato folio, craſſiori, magis incano.
—— —— —— vermiculato folio, tenuiori, minus incano.
—— —— —— folio brevi, capitulis globoſis. Frutex cineraceus muſcoſus Capitis Bonae Spei *Breyn.*
—— —— —— Ericae foliis incanis, capitulis majoribus, villoſis.
—— —— —— Ericae folio. Cupreſſo-pinulus *Breyn.*
—— —— —— Ericae foliis tenuiſſimis. Frutex corymbiferus Africanus, Chryſanthemuli Ericoidis facie, flore globulariae. *Breyn. faſc.*
—— —— —— Ericae foliis tomentoſis, acutis.
—— —— —— foliis tenuiſſimis, tomentoſis, capitulis bombaciferis.
—— —— —— foliis anguſtiſſimis, incanis, floribus luteis, capitulis argenteis.
ABSINTHIUM Africanum, Abſinthii Pontici folio. Abſinthio Seriphio ſimilis. Capitis Bonae Spei. *Breyn. faſc.*
—— —— tenuifolium, odoratiſſimum, Monomotapenſe. *Breyn. Cent.* 1.
—— —— Ponticum, tenuifolium, incanum. *C. B.*
—— —— Idem odoratum.
—— —— maritimum, Lavendulae folio. *C. B.*
ACACIA Africana, latifolia, ſpinis majoribus.
—— —— anguſtifolia, ſpinis majoribus, flore odoratiſſimo. Acacia Africana, ſpinis candicantibus horrida. *Plukn.*
—— —— anguſtifolia, ſpinis minoribus.
ACONTIPHORA Africana, belgice *Aſſagai-boom*, ex qua Hottentotti tela *Aſſagai* dicta conficiunt.
ADIANTHUM Africanum, Capilli Veneris facie.
AGERATUM Africanum, Elichryſoides, umbellatum, Abrotani folio.
—— —— —— Idem foliis tenuioribus. *In Hort. Beaumont.*
—— —— —— foliis Tithymali Paralii anguſtioribus.
AIZOIDES folio triangulo, lato, glauco.
—— —— —— viridi, ſpinoſo.
—— Ericae folio.
—— mamillaris, viridis, ſummitate foliorum ſpinis coronata.
—— folio triangulari, glauco, brevi.
—— erectus, foliis brevibus, triangulis, flore albo.
—— Idem flore luteo. Meſembrianthemum, ſive flos meridianus, Africanus, triangulari folio, fruteſcens, maximus, procumbens, fructu turbinato, eduli. *Breyn. pr.* 2.
—— Idem flore purpureo. *Breyn. pr.* 2.

Aizoides Idem flore albo. *Breyn. pr.* 2.
—— —— Idem minus, flore luteo, minore. *Breyn. pr.* 2.
—— —— five Mefembrianthemum Africanum, procumbens, triangulari, glauco folio minimo veluti tuberculis exafperato, flore fuave purpurafcente, feu carneo minore. *Breyn. prodr.* 2.
—— Idem folio triangulo, longiffimo, fructu multicapfularis, flore luteo majori *H. L. B.*
—— Idem minus.
—— teretifolium, majus, Africanum, flore luteo majore. *Breyn. prodr.* 2.
—— teretifolium, majus, flore luteo, majore, tuberculis raris donatum.
—— Idem foliis magis rigidis, magisque fplendentibus *H. A.*
—— erectum, frutefcens, folio tereti glaciali, caulibus hirtis. *H. A.*
—— Idem folio plano, glaciali, latiffimo Plantaginis, flore albo.
—— Idem folio plano Polygoni craffo, floribus copiofis albis. *H. A.*
—— Idem folio finuato, flore tubo longo donato. Ficus Indica, folio ad marginem finuato, Nopalxochcuez Alticquifi *Hernand. pag.* 392 & *pag.* 457.
Alcea veficaria. Capitis Bonae Spei *Moris.* Alcea Veficaria, Africana, flore amplo, patulo *Cat. Hort. Blef.*
Alchimilla Africana, multicaulis, villofa & fpinofa, flore ex coeruleo rubefcente.
Alga maritima, Africana.
Alni materie, feu ligno, arbor Africana, floribus fpicatis albis, foliis Fraxini. *Effenbout* vulgò. an arbufcula Arbuti alatis foliis, forte Jamboloius?
Aloe Africana, foetida, folio triangulari, longiffimo & anguftiffimo, radice lutea *H. L. B.* Iris Uvaria Promontorii Bonae Spei. *Stapel.*
—— —— foliis brevioribus, obtufis, fpinis rarioribus albis, brevioribus in fuperficie utraque foliorum. *H. A.*
—— —— foliis brevioribus, acutis, fere rotundis, fuperficie prona maculis feu tuberculis adfperfa. *H. A.*
—— —— minima, undique tuberculis, feu verrucis albis adfperfa.
—— Eadem foliis obfcure virentibus. *H. A.*
—— Africana, foliis in aculeum definentibus, non fpinofa. *H. A.*
—— —— folio breviffimo, craffiffimo, triangulari, in fpinulam tenuiffimam definentibus nervis albis, flore coeruleo.
—— —— minima, fpinofa, facie aloes Americanae. *H. A.*
—— —— humilis, foliis brevibus, caefiis, flore coeruleo inftar Hyacinthi, *inter depictas Dominae de Flines.*
—— —— folio Pini ftrobulum referente, floribus ramofis.
—— five Lilii fpecies Africana, foliis craffis, longis, obtufis, fquammatim erumpentibus. *H. A.*
Alsine Africana, Laricis folio.
—— —— procumbens, Gallii facie. *H. L. B.*
—— —— mufcofa, folio capillaceo.
—— feu Spergula Africana, folio tenuiffimo.
—— Myofotis dicta, hirfuta, perennis, Africana.
Alsines feu Spergulae dictae fpecies Africana.
—— Africanae fpecies, folio fubrotundo, floribus copiofis in fummitate ramulorum.

Al-

ALSINE Africana, frutefcens, anguftifolia, flofculis ad fingulos nodos binis ternisve. Alfine Indica, polyanthos, tenuifolia ex Maderaspatam *Plukn.*
ALTHAEA Africana arborefcens, folio rotundo, crenato.
——— ——— arborefcens, folio longiori, minus aut nihil crenato.
——— ——— veficaria, frutefcens, flore albo.
——— ——— folio Ranunculi Illyrici.
——— ——— frutefcens, Uvae crispae folio afpero.
——— ——— veficaria, Ibifci minori folio. Althaea (an Alcea) veficaria frutefcens, flore luteo, convoluto, folio molli Ibifci. *Vander Stell.*
——— Eadem minor.
——— folio Pfyllii, feu Spergulae, feu Spergula ipfa.
——— Africana, Alni folio. an Malva incana, frutefcens folio Alni. *Par. Bat. pr.*
——— ——— arborefcens, purpurea, Groffulariae, vel Ribes folio.
AMYGDALUS Africana, five Æthiopica, fructu holoferico. *Breyn. Cent.* 1.
ANAGALLIS Africana, flore phoeniceo.
ANCHUSA Africana, arborefcens. an Bugloffum Africanum, Echii folio. *Breyn. fafc.* vel Cynogloffum Africanum, Myrtifolium. *Breyn. fafc.*
——— ——— frutefcens ferrato Trachelii folio, flore albo.
ANEMONOSPERMOS Africana, Taraxici foliis fubincanis, flore Calendulae Africanae latifolia. Jacobaea Africana Staebes facie, flore Calendulae Africanae latifolia. *Par. Bat. pr.*
——— ——— Eadem foliis anguftis. *Par. Bat. pr.* Chryfanthemum Africanum, foliis anguftioribus. *Breyn. pr.* 1.
——— ——— Africana, foliis anguftis, flore Aurantio, folio Coronopi.
——— ——— Africana, foliis anguftis, frutefcens, folio Tuffilaginis non crenato.
——— ——— Africana, foliis anguftis, flore Cichorei. an Hieracium Huislaardykanum?
——— ——— Africana, foliis anguftis, Taraxici.
——— ——— Africana, foliis anguftis, dentatis.
——— ——— Africana, foliis anguftis Asplenii, flore magno, humilis.
ANETHIFOLIUS frutex Africanus, flore fericeo.
——— ——— frutex Africanus, major, flore non fericeo.
——— ——— frutex Africanus, minor, capite tomentofo.
ANTHYLLIS Africana, anguftiffimo & breviffimo folio.
——— Africana foliis anguftis, acutis.
——— Africana Rubiae anguftiffimae folio.
APOCYNUM Africanum, erectum, villofo fructu, Salicis folio lato, glabro. Apocynum erectum, elatius, Salicis angufto folio, emaculatis flofculis in umbellam folliculis pilofis. *Plukn.* Apocynum Hyficanenfe erectum, Salicis foliis latioribus. *Cat. Hort. Beaumont.*
——— ——— ——— erectum, fructu villofo, anguftifolium, glabrum. Apocynum Africanum erectum, tuberofum, anguftifolium, flore ex luteo virefcente, folliculis pubefcentibus. *Plukn.*
——— ——— ——— foliis fubrotundis, craffis, floribus umbellatis albis.
——— ——— ——— erectum, Salicis folio, hirfutum.

Apocynum Africanum, erectum, floribus luteis in umbellam congestis, foliis undulatis.
——— ——— humile aizoides, siliquis erectis. *H. L. B.* Fritillaria crassa, Capitis Bonae Spei *Stapel.*
——— ——— scandens, hirsutum, foliis rotundioribus. *Par. Bat. pr.*
——— ——— scandens, hirsutum, foliis acutioribus fuscis, intus albis.
——— ——— ——— scandens, foliis Laurinis glabris. *Par. Bat. pr.*
——— ——— ——— scandens, Asphodeli radice, folio Arbuti.
——— ——— ——— scandens, Vincae Pervincae foliis subrotundis.
——— ——— ——— scandens, Coronopi folio, flosculis pentapetalis.
——— ——— ——— Gentianae folio.
Arbor Africana lucida, folio Halimi nostratis.
——— ——— spinis ad singula folia brevibus aduncis, Belgis *Haageboom.*
——— ——— spinosa, foliis conjugatis, fructu nigro.
——— ——— procera.
——— ——— foliis alternis, subrotundis, crassis, splendentibus.
——— ——— spicata, foliis digitatis, quorum nonnulla auriculata instar foliorum Aurantiorum.
——— ——— spinosa, foliis crassis, cordatis & conjugatis, spinis crassis bigeminis.
——— ——— foliis conjugatis subrotundis, subtus tomentosis.
Arbuscula Africana, foliis ternis, rigidis, rotundis.
Aristolochiae species Africana, foliis cordiformibus, *an* Floris passionis species?
Artemisia latifolia Africana.
Arum Africanum, minus, triphyllum. *Par. Bat.*
——— ——— flore albo odorato. *Par. Bat.* Arum Ægyptiacum, flore albo, Moschum olente. *H. L. B.*
Asparagus Africanus foliis falcatis.
——— ——— scandens foliis brevissimis.
——— ——— aculeatus. *H. L. B.*
——— ——— *seu* Corruda Africana, virgulis lignosis, rubris, permanentibus.
Asphodelus Africanus, hispidis, longis, rigidisque foliis. *Par. Bat.*
——— ——— latis, hispidisque foliis, floribus ramosis, albis.
——— ——— flore minore, luteo, foliis angustissimis.
——— ——— flore Lancastriae simili, foliis angustioribus.
Asplenium, sive *Ceterach* folio splendente, subtus ferrugineo, planta capitata Africana.
Aster Africanus, purpureus, lato, rigido folio.
——— ——— aizoides, frutescens, flore albo.
——— ——— ——— ——— coeruleo.
——— ——— luteus, Rorismarini folio, calice rigido.
——— ——— purpureus, foliis brevibus, rigidis, recurvis.
——— ——— frutescens, foliis angustissimis, viridibus, argute serratis.
——— ——— luteus, foliis longis, angustis, serratis.
——— Æthiopicus, Staechadis foliis, flore aureo. *H. L. B. an* Conyza Africana, foliis Staechadis citrinae Gallicae. *Breyn. fasc.*
——— Africanus, frutescens, coeruleus, floribus parvis.

Aster

ASTER Africanus, frutefcens, luteus, Ericae folio.
——— ——— humilis, coeruleus, folio Anchufae luteae minoris.
——— ——— anguftifolius.
BARBA Jovis Africana, five Genifta Capenfis, fpinofa, Liguftri folio pentaphyllos, flore fpicato, rubro. *Plukn.*
BELLIS Africana, capitulo aphyllo, luteo, Coronopi folio, cauliculis procumbentibus. *H. L. B.*
——— Eadem, foliis & cauliculis junceis erectis. *H. L. B.*
——— frutefcens, Camphorata, foliis anguftis craffis, acutis.
BETULAE facie arbor, Africana, major.
——— Eadem minor.
BISTORTA Africana, frutefcens, floribus rubris, foliis Polygoni rotundis.
BLITUM Africanum, Calthae paluftris folio, caule nudo, cubitali, fpicam pedalem & amplius fuftinente. *Plukn. Tab.* 18. Petafites Africanus, folio Calthae Paluftris. *H. L. B.*
——— ——— Hyffopi folio.
BRANCA Urfina Africana.
BRYONIA Africana, glabra, folio profunde fecto, radice rapacea, flofculis herbaceis.
——— ——— folio minus profunde fecto, fegmentis rotundioribus.
——— ——— folio diffecto, minimo, fegmentis rotundis.
BUPLEURI facie Africana, Gladioli foliis anguftis, nervofis, longiffimis feminibus pappo convolutis.
——— ——— ——— Eadem, foliis brevioribus.
——— ——— ——— foliis junceis, carinatis, longioribus, feminibus pappo convolutis.
——— ——— ——— majoribus & brevioribus, feminibus pappo convolutis.
——— ——— ——— gramineis, rigidis, feminibus triquetris, calice perfoliato, angufto. Perfoliato anguftifolio, montano, Columnae fimilis planta umbellifera nova, fructu triplici membranacea. *Breyn. fafcic.*
——— ——— ——— folio anguftiffimo.
CALENDULA Africana.
——— ——— erecta, flore minore.
——— ——— procumbens, flore minore.
——— ——— foliis gramineis, rarius dentatis, aureis.
——— ——— ——— Scabiofae argenteae viridibus.
CAMPANULA Erini facie Africana, flore violaceo, caulibus erectis.
——— ——— ——— ——— procumbentibus. *H. L. B.*
——— Africana Ericae folio, flore coeruleo, patulo.
——— ——— galericulato flore, foliis Violae minoribus.
CAPPARIS Africana, humilis, triphyllos, & tetraphyllos.
CAPPARIDIS leguminofae folio frutex Africanus, flore luteo, fructu membranaceo. Idem foliis glaucis, fructu biunciali in acumen definente, flore albefcente intus carneo.

CAR-

CARDIACA Africana, folio Sideritidis, floribus longiſſimis, phoeniceis villoſis. *H. L. B.* Leonurus Capitis Bonae Spei *Breyn. C.* 1. Sideritis flore aureo, oblongo. *Act. Hafn. An.* 73.
——— Americana, annua, minor, Nepetae folio. *H. L. B.*
CARDUUS Africanus, luteus, Atractylidis facie, extremo foliorum aculeo adunco.
CASSIA poëtica, Africana, folio Sanamundae primae Cluſii.
CENTAURIUM minus, Nummulariae folio.
—— —— Caryophylloides, Africanum, ſemper virens. *Par. Bat. pr.* Rapuntio affinis, Lini facie Capitis Bonae Spei. *Breyn. Cent.* 1.
—— —— Africanum, minus, Lychnidis flore rubro, foliis Centaurii vulgaris majoribus.
—— —— —— —— —— foliis anguſtiſſimis, viridibus.
—— —— —— luteum, flore amplo, capſula quatuor alis membranaceis donata.
—— —— —— humile, multiflorum.
Idem floribus paucioribus, & majoribus.
Centaurium Africanum minus, anguſtifolium, flore luteo minimo.
—— —— —— luteum, floribus majoribus.
—— —— —— floribus minoribus.
—— —— ramoſum, foliis anguſtiſſimis, brevibus.
CERASUS Africana, foliis conjugatis, craſſis, ſubrotundis.
—— —— —— rigidis, craſſis, oblongis.
—— —— ſylveſtris fructu non eduli, foliis latioribus, Belgice *Yſerhout.*
CERASI folio arbor Africana.
CHAMÆLÆA Africana, Rorismarini foliis majoribus, lanuginoſis.
—— —— —— rarioribus, floribus ex foliorum alis erumpentibus.
—— —— folio anguſtiſſimo, capite globoſo, alopecuroide.
—— —— floribus herbaceis.
—— —— foliis Laurinis ſerratis. Alaternus Hyſicanenſis, ſive Africana, Lauri ſerratae, odoratae Stapelianae foliis. *Cat. Hort. Beaum.*
—— —— —— —— —— acutioribus.
—— —— —— fruteſcens, flore rubeſcente, ex plumoſo capite, foliis Rorismarini minoribus.
—— —— —— foliis ſubrotundis.
CHAMÆMELUM Æthiopicum, lanuginoſum. *Breyn.*
—— —— —— tenuiſſimo folio, glabro. *Par. Bat. pr.*
—— —— Africanum, pumilum, Ericae folio.
—— —— —— fruteſcens, folio Millefolii odorati.
—— —— —— foliis longis, anguſtiſſimis, capitulis parvis.
—— —— —— capite nudo.
CHRISTOPHORIANA Africana, Ranunculi flore, foliis rigidis Libanotidis. Sphondilii, ſive Panacis rigido, hirtoque folio, planta Africana cauſtica. *Par. Bat. pr.*
—— —— —— Eadem, minor.

CHRY-

CHRYSANTHEMUM Africanum, foliis anguſtis, dentatis.
—— —— —— Cotulae folio, minus, flore luteo.
—— —— —— pumilum, Oſyridis folio.
—— —— —— —— fruteſcens, facie Cichorei ſpinoſi, vel bacciferum, odoratum, ſpinoſum, flore luteo.
—— —— —— —— folio Erucae Canadenſis Cornuti, ſive ramoſum, floribus parvis.
—— —— —— —— foliis Lini craſſioribus, caule folioſo.
—— —— —— ſemine triquetro, glabro.
—— —— —— fruteſcens, floribus umbellatis, foliis denſe ſtipatis, anguſtiſſimis, viridibus.
—— —— Æthiopicum, arboreſcens, folio Populi albae *Breyn. Cent.* 1. vel Bacciferum, flore luteo.
—— —— —— Conyzoides, capitulo aphyllo, folio Majoranae. *Breyn. Cent.* 1.
—— —— Africanum, Ericoides, coronatum, Capitis Bonae Spei. *Breyn.*
—— —— —— foliis ſcabris Coronopi.
CICER Africanum, phaſeoloides, bituminoſum, flore luteo. *Flor. Bat.* Phaſeolus Africanus, bituminoſus. *H. L. B.*
CISTUS humilis, Africana, aizoides. *H. L. B.* Sedum petraeum, tereti folio, Virginiana. *Plukn.*
—— —— —— foliis Alni minoribus.
—— —— —— Roriſmarini anguſtis.
—— —— —— glabris, dentatis, floribus luteis, pendulis.
—— —— —— —— tenuiſſime diſſectis. Varietas prioris.
COLUTEA Æthiopica, flore phoeniceo, Barbae Jovis folio. *Breyn. Cent.*
—— Africana, Barbae Jovis foliis, & floribus minoribus.
—— —— minor, purpurea, veſiculis depreſſis.
—— —— minor, purpurea, foliis brevioribus, cordatis, ſiliquis minus depreſſis, & quaſi lunatis.
—— —— Lentiſci folio, floribus & nucleo ruberrimo.
—— —— fruteſcens, foliis latis, hirſutis, flore flavo.
CONVOLVULUS Indicus, Orientalis, Inhame ſive Batattas, Siſarum Peruvianorum. Seu Batattas Hiſpanorum.
—— —— Africanus, foliis oblongis, rugoſis, & hirſutis Salviae inſtar, flore coeruleo. *Van der Stell.*
CONYZA Africana, flore nudo, folio Conyzae mediae.
—— —— fruteſcens, folio majore, ſubrotundo.
—— —— —— caule alato, foliis minoribus, ſubrotundis, ſubtus lanuginoſis, flore coeruleo.
—— Eadem, foliis minoribus, & anguſtioribus.
CORALLINA Africana.
CORIDIS folio & ſpica Africanus frutex, alopecuroides, flore albo, *Linconii* nomine miſſus.

CORRUDA Africana, foliis tenuiffimis, fpica brevi, deorfum fpectante, ad ramulorum exortum.
——— ——— ——— frutefcens, ad fingulos aculeos emittens ramulos plurimos falcatos.
CRATEOGONUM Africanum, foliis breviffimis, obtufis, floribus magnis hirfutis.
CROTALARIA Africana, arborefcens, Styracis folio. Genifta folio Styracis. Genifta Africana, quae folia habet Mali Cydonii. *Inter omiffa Act. Hafn.*
CUCUMIS Africanus, fructu echinato. Hiftryx vegetabilis, vulgo Hyfiquanenfis.
——— ——— major.
CUPRESSUS Africana, Lini folio. Larix Conifera *Plukn.*
CYTISUS Africanus *Rivini.*
——— ——— folio angufto, fubtus argenteo, filiqua Securidacae luteae.
——— ——— argenteus, fpicatus.
——— ——— hirfutus, & incanus, flore atro puniceo.
——— ——— ——— anguftifolius, flore luteo, globofo.
——— ——— alopecuroides, foliis Buxeis.
——— ——— capitulis globofis, foliis minoribus.
——— ——— fpicatus, luteus, foliis minoribus, anguftis.
——— ——— humilis, fpicatus, incanus.
CYTISO-GENISTA Africana, Ericae foliis, fructibus in globum lanuginofum congeftis.
——— ——— foliis minimis, filiquis Loti brevibus, rotundis.
DAUCELLUS Africanus, humilis, vel Caucalidis Species, flore rubro; *an* ipfiffima Daucus noftra filveftris?
ECHIUM Lycopfis facie, Africanum, erectum, perenne. *H. L. B.* Anchufa maxima, Bugloffi minoris facie, Cap. Bon. Spei. *Breyn.*
——— Africanum, minus, foliis oblongis, glabris, floribus coeruleis.
EPHEMERUM Africanum, annuum, flore bipetalo *H. L. B.*
ERICA Africana, Taxifolia, floribus Cerinthes, miniatis, in umbellam congeftis. Erica Coris folio, hifpido, Cerinthoides, Africana. *Breyn. Cent.* 1. Erica Africana, umbellata, flore purpureo. *Act. Hafn.*
——— ——— frutefcens, floribus purpureis, longis, ftaminibus longiffimis donatis.
——— ——— ——— ——— tubulofis, longis, coccineis, ftaminibus longiffimis donatis.
——— ——— ——— ——— ——— brevioribus, longis filamentis donatis, foliisque brevioribus.
——— ——— flore longo, tubulofo, incarnato, folio Juniperi.
——— ——— erecta, paludofa, longiffimis floribus, tubulofis, per caulium feriem denfe difpofitis.
——— ——— glabra, floribus veficariis, Juniperi folio.
——— ——— ——— ——— ——— ——— longo filamento difpofitis, foliis breviffimis.
——— ——— hirfuta, floribus atropurpureis, ex capitulis lanuginofis.
——— ——— Coridis folio, Unedonis flore albo.
——— ——— glabra, foliis tenuibus, floribus dilute purpureis, in fummitate ramulorum conglobatis.

ERICA

Erica Africana, Eadem floribus albidis.
—— —— glabra, foliis tenuiſſimis, floribus minoribus, eleganter purpureis, conglobatis.
—— —— Eadem floribus albis.
—— —— tenuifolia, glabra, floribus albis.
—— —— Sanamundae facie.
—— —— Corrudae foliis, hirſutis.
—— —— minima, foliis Thymi minoribus.
—— —— Coridis foliis, floribus magnis, rarioribus.
—— —— Juniperi foliis brevioribus, floribus parvis, oblongis, rubris.
—— —— Sanamundae foliis, floribus copioſis.
—— —— foliis minimis, hirſutis, floribus minoribus, hirſutis, incarnatis, majoribus per ſeriem caulium rarius dispoſitis.
—— —— foliis minimis, floribus minoribus, hirſutis, dilute purpuraſcentibus per ſeriem ramulorum dispoſitis.
—— —— foliis brevibus, Ericae ſcopariae facie.
—— —— foliis tenuiſſimis, ac quaſi capillaceis.
—— —— foliis minimis, floribusque hirſutis, minoribus.
Euonymus Africana, folio vario.
—— —— foliis Phillyreae ſerratae majoribus.
Euonymo affinis, Æthiopica, ſemper virens, fructu globoſo, ſcabro, foliis Salicis rigidis, ſerratis. *H. L. B.* Lauro ſerratae odoratae Stapelianae ſimilis, inodora, Capitis Bonae Spei. *Breyn.*
Eupatorium Africanum, fruteſcens, Senecionis floribus albis, umbellatis, folio ſingulari. Eupatorium Indicum, flore albo. *Act. Hafn.*
—— —— humile, Senecionis facie, foliis Lamii. *Par. Bat. pr.* Senecio Africanus, Lamii folio. *Acad. Paris.*
Euphrasia Africana, foliis tenuiter diſſectis.
Fagus Africana.
Ferrum equinum Africanum, ſiliquis falcatis, marginibus integris.
Ferula Galbanifera. Ferula fruticoſa, ſemper virens, foliis Aniſi, Galbanifera ex qua Galbanum Officinarum. *Par. Bat. pr.* Oreoſelinum Anizoides, arboreſcens, Liguſtici foliis & facie, flore luteo, Capitis Bonae Spei. *Breyn. pr.* 2.
—— —— —— Africana, minor.
—— —— —— —— foliis rigidis, latis.
—— —— —— —— foliis rigidis, anguſtis.
Filicula Africana, humilis, pinnulis multifidis.
Filix Africana, arboreſcens, ramoſa, pinnulis Filicis Maris minoribus.
—— —— —— non ramoſa, Polypodii facie.
—— —— Eadem, colore rubente.
—— —— mas, pinnulis integris, anguſtis, longis.
—— —— —— —— —— rotundis.
—— —— —— Floridae ſimilis, in ambitu foliorum argute denticulata.
—— —— —— romoſa, lucida, pinnis Apii in morem laciniatis.

Filix Africana, pinnarum laciniis in acumen definentibus. Filix Africana, humilis, fpinofa, pinnulis latioribus, minus patula. *Plukn.*
—— —— ramofa, pediculo innitente.
—— —— ramofa, ferrata.
—— —— non ramofa, foliis integris, ferratis, Capitis Bonae Spei. *Breyn. Cent.* 1.
—— —— maxima, Polypodii facie. *Par. Bat. pr.*
—— —— Polypodii facie, fegmentis latioribus, alternis.
—— —— auriculata, Lonchitidis facie, folio in cufpidem longum producto.
—— —— ramofa, Lonchitidis facie, pinnis circa extrema ferratis.
—— —— minor, Lonchitidis facie. *Par. Bat. pr.*
Flos Paffionis, fructu rubicundiffimo, folio Vitis non incifo.
Frutex Africanus, monococcos, Buxi majoribus foliis, floribus albis.
—— —— folio Cifti, odore Rorismarini.
—— —— Ambram fpirans. *Plukn.*
—— —— Ambram fpirans, fpicis florum denfis.
—— —— Laricis folio, capfula oblonga, rotunda, ruffa, femen unicum includente.
—— —— foliis anguftis, alternis, forte Atriplicis fpecies.
—— —— foliis conjugatis, Salviae anguftis, floribus fpicatis, tubulofis, hirfutis.
—— —— foliis minimis, rotundis, denfe ftipatis.
Fucus anguftifolius, Africanus.
—— Africanus, Sargaffo dictus.
—— —— latiffimus, coriaceus, rugofus.
Fumaria Africana, veficaria. Fumaria amplexicaulis veficaria. *Act. Hafn.*
Galeata verticillata, Africana planta, Thymi foliis anguftis. *Galebout* Africana, Salicis foliis, Dominae de Flines. *Breyn.*
Gallium Africanum, foliis anguftis.
Genista Africana, fphaerica, Rufci folio.
—— —— Rufci folio, ramulis tomento obductis.
—— —— Rufci foliis, denfe ftipatis.
—— —— Rufci foliis, anguftioribus, flore luteo.
—— —— Lauri Alexandrinae folio, breviori, nervofo. Planta leguminofa, Æthiopica, folio Rufci. *Breyn.*
—— —— folio lato, orbiculato, arborefcens.
—— —— folio lato, fubrotundo, lucido. Myrto Genifta, Capitis Bonae Spei. *Breyn. Cent.* 1.
—— —— argentea, rotundifolia, flore luteo, calyce holoferico, ferrugineo.
—— —— purpurea, odorata.
—— —— purpurea, foliis in fpinam abeuntibus.
—— —— foliis rigidis, fpinofis, denfe ftipatis, imbricatim pofitis, floribus rubris.
—— —— folio Salicis Pumilae argenteae minor.

Genista

Genista Africana, argentea, minor, folio acuto, & ſiliquis argenteis.

— — argentea, purpurea, foliis Sanamundae.

— — — argentea, foliis minimis, alopecuroides.

— — — lutea, floribus in capſula villoſa conglobatis, foliis villoſis.

— — — lutea, foliis ſubhirſutis, in capſula lanugiṅoſa conglobatis, foliis Corrudae aculeatis, ſubhirſutis. Chenopoda Monomotapenſis. *Breyn. Cent.* 1.

— — — floribus luteis, ſubhirſutis, foliis Corrudae aculeatis, glabris.

— — — lutea, Juniperi folio.

— — — lutea, foliis Ledi Seleſiaci minoribus.

— — — lutea, foliis Laricis, aizoides. Geniſtella ſpinoſa, Laricis folio. *Breyn. Cent.* 1.

— — — lutea, non ſpinoſa, folio Laricis, flore parvo, purpureo, variegato.

— — — lutea, Laricis foliis, incanis.

— — — lutea, foliis Aſparagi, ſeu Corrudae.

— — — ſpicata, Laricis foliis tenuiſſimis, flore minimo.

— — — Laricis folio brevi, ſpica lutea, lanuginoſa.

— — — Eadem, ſpica lutea, viridi, foliis majoribus.

— — viridis, floribus majoribus.

— — foliis juniperi, humilis, floribus parvis purpureis, variegatis.

— — foliis Ericae breviſſimis, raris, flore minimo, ſingulari, ſiliquis brevibus, acutis.

— — humilis, ſpicata, Camphoratae foliis hirſutis, floribus parvis.

— — foliis Geniſtae Hiſpanicae, ſuperioribus longiſſimis, junceis.

— — foliis Geniſtae Tinctoriae majoribus.

— — — Linariae folio.

— — — humilis, Thymi foliis.

Genistae affinis Arbor Africana, monoſpermos, flore coeruleo, foliis pinnatis. *H. L. B.*

Geranium Africanum, arboreſcens, Ibiſci folio rotundo, Carlinae odore. *H. L. B.*

— — — Bismalvae folio, rotundo, undulato, minori.

— — — fruteſcens, Malvae folio, laciniato, odorato. *H. L. B.*

— — — foliis hirſutis, longis, tenuiſſime diſſectis, flore albo, punctis purpureis, radice tuberoſa.

— — — folio anguloſo, circulo purpureo notato.

— — — floribus parvis, rubellis, foliis ſubrotundis, procumbens. *Van der Stell.*

— — — foliis Thapſiae latifoliae *Dominae de Flines.*

— — — Coriandri foliis, flore incarnato, majori. *H. L. B.* Geranium Æthiopicum, Myrrhidis folio, flore magno, ſtriato. *Breyn. Cent.* 1.

— — — Idem, minus.

— — — Betonicae laciniatis foliis, & maculatis, floribus incarnatis. *H. L. B.*

— — — Alchimillae foliis hirſutis, flore ochroleuco. *H. L. B.*

— — — tuberoſa radice, Anemones folio.

 Idem,

GERANIUM Africanum, idem, flore ſuaverubente. *Breyn. pr.* 2.
— — foliis Adianthi. *Par. Bat. pr.*
— — — — humile, tuberoſa radice, floribus ampliſſimis incarnatis, latifolium. *Par. Bat. pr. app.*
— — — — Idem, anguſtifolium.
— — — — tuberoſum, minus, Ferulaceis foliis.
— — — — Abrotani folio, flore ampliſſimo, ſemine duro, ſpinoſo.
— — — — Cicutae folio, acu longiori.
— — — — noctu olens, radice tuberoſa, foliis Paſtinacae. Geranium Æthiopicum, noctu olens, radice tuberoſa, foliis Myrrhidis latioribus. *Breyn. Cent.* I. Idem foliis anguſtioribus. *Breyn. Cent.* I.
GERANIUM Africanum, noctu olens, radice tuberoſa, foliis Myrrhidis anguſtiſſimis, vel potius Scandicis villoſiſſimis. *Breyn.*
— — — — noctu olens, tuberoſum, & nodoſum, foliis Aquilegiae. *H. L. B.*
— — — — Myrrhidis folio aſpero, radice lignoſa, tuberoſa, umbone purpureo.
— — — — folio integro, radice lignoſa, tuberoſa.
— — Æthiopicum, flore galeato, carneo, medio, foliis Pulſatillae, ſeu Dauci ſilveſtris. *Breyn. pr.* 2.
— — — — flore galeato, parvo, foliis ſegmentis latioribus, ſeu Coriandri. *Breyn. pr.* 2.
GLADIOLUS Africanus, maximus, coccineus *Par. Bat. p.* I. Gladiolus Africanus, maximus. *Act. Hafn.*
— — — — idem albus. *Par. Bat. Pr.*
— — — — maximus, purpureus, floribus amplis.
— — Aethiopicus, flore coccineo *Cornuti.*
— — Africanus, pumilus, folio anguſtiſſimo. *Par. Bat.*
— — Aethiopicus, ramoſus, caeruleus, maximus.
— — Africanus, ramoſus, floribus parvis, luteis.
— — — — floribus tubuloſis, inſtar Hyacinthi tuberoſi.
— — — — flore incarnato, nervis foliorum albentibus *Par. Bat. Pr.*
— — — — idem, flore nivo.
— — — — ramoſus, carneo flore.
— — — — non ramoſus, floribus purpureis.
— — — — foliis junceis, convolutis, floribus minoribus tubuloſis.
— — — — foliis junceis, floribus minoribus, ſaturate purpuraſcentibus.
— — Aethiopicus, minor, flore violaceo. *Breyn. Cent.* I.
GNAPHALIUM Africanum, foliis latis, tomentoſis, floribus luteis, umbellatis, calicis foliolis recurvis.
— — — — — idem, floribus purpureis.
— — — — — facie Gnaphalii Anglici, foliis anguſtiſſimis.
— — — — — fruteſcens, Ericae folio, ſeu Coridis, alopecuroides.
— — — — — foliis tomentoſis, ſubrotundis, ramoſis, floribus copioſis, ſpicatis.

GRAMEN Africanum, junceum, elatius, maritimo fimile.
— — — — paniceum, fpica longiffima. Gramen Alopecuroides, fpica maxima, Indiae Orientalis. *Plukn.*
— — — — paniceum, folio latiore.
— — — — latifolium, panicula juncea.
— — — — Triglochin, bulbofum, Monomotapenfe. *Breyn. fafc.*
HAEMANTHOS Africana. *H. L. B.* Tulipa Capenfis, feu Capitis Bonae Spei. *Stapel.* Narciffus Indicus, puniceus, gemino latiori folio. *Ferrar. in flor. cult.*
HELICHRYSUM Africanum, latifolium, foetidum, petalis argenteis. Conyza Africana, graveolens, capitulis argenteis. *Plukn.*
— — — — idem, petalis aureis.
— — — — luteum, latifolium, Meliloti odore, feu odoratum, caule alato.
— — — — foliis undulatis, rigidis, quinquenerveis.
— — — — album, Staechados latifolii folio.
— — — — floribus ferrugineis, folio tomentofo, angufto, oblongo, five Chryfocome Africana, flore phoeniceo, anguftifolia. *Breyn. fafcic.*
— — — — folio angufto, tomentofo, floribus umbellatis, facie Pedis Cati.
— — — — folio anguftisfimo.
— — — — folio tomentofo, anguftisfimo, fquamis acutis, ferrugineis, deorfum reflexis.
— — — — Serpilli foliis, incanis, odoratis.
— — — — idem, foliis fubtus tantum incanis.
— — — — fulphureum, foliis tomentofis, fubrobundis, brevibus.
— — — — luteum, Polii montani lutei foliis.
— — — — Gnaphalii acuti foliis, capitulis parvis.
— — — — luteum, foliis minimis, anguftis, brevibusque.
— — — — luteum, angufto, brevique folio, floribus globofis.
— — — — album, longis, acutis, tomentofisque foliis.
— — — — Lavendulae folio breviori, floribus umbellatis, albis.
— — — — Ericae folio, floribus longis, majoribus.
— — — — umbellatum, album, Coridis folio, flosculis longis, parvis.
— — — — umbellatum, purpureum, Coridis foliis, globofis.
— — — — Ericae foliis, tomento ferrugineo obductis.
— — — — Satureae folio.
— — — — folio, & flore Abrotani viridis.
HELICHRYSI fpecies, folio anguftiffimo, argenteo.
— — Camphoratae folio, floribus minimis, umbellatis.
HELLEBORINE Africana, ramofa, lutea, foliis Gladioli.
HERBA TERRIBILIS Africana, foliis Tithymali Paralii.
HERNIARIA Africana, procumbens, foliis ftellatis, minimis.
— — — — fruticofa, foliis Ericae.
— — — — cauliculis longioribus, pratenfis.

HIERA-

HIERACIUM Africanum, folio anguftiffimo.
— — — — — purpureum, Jacobeae folio.
— — — — — villofum, foliis & floribus Hieracii Pannonici primi. *Clufii.*
HORMINUM Africanum, frutefcens, Chamaedryos folio fubincano. Salvia minor, Æthiopica, foliis Chamaeleagni afperis. *Breyn. Cent.* 1.
— — — — floribus maximis, ex albo & purpureo variegatis, foliis incanis, fubrotundis.
— — — — foliis Salviae minoribus.
— — — — foliis inferioribus, alatis.
HYACINTHI fpecies, Africana, floribus parvis.
HYACINTHUS Africanus, Orchidem aemulans.
— — — bifolius, floribus parvis, erectis.
— — —. Orchiöides, major, bifolius, maculatus, flore fulphureo. *Breyn.*
— — — oblongo flore, ruberrimo, majori.
— — — oblongo flore, ruberrimo, minori.
HYACINTHO affinis, Africana, tuberofa radice, umbella coerulea, inodora. *H. L. B.*
JACEA Africana, frutefcens, ciliaris, Rorismarini folio.
— — — folio Laricis, flore luteo.
— — — — Lavendulae multifidae, flore luteo.
— — foliis Thymi capitati ferratis, purpurea.
JACOBAEA Africana, folio capillaceo, viridi.
— — — — — dentato, obtufo.
— — — — lutea, folio Rapi, vel Lampfanae.
— — — — Hedypnoides, Monfpeffulanae facie.
— — — — purpurea, foliis Senecionis pinguis. Senecio viscofus, Æthiopicus, flore purpureo. *Breyn. Cent.* 1.
— — — — — foliis inferioribus Iberidis, vel Nafturtii hortenfis.
— — — — — — Jacobaeae vulgaris, minoribus.
— — — — frutefcens, folio Saniculae guttatae.
— — — — Abrotani, feu Crithmi. *Par. Bat. pr.*
— — — — — — — minoribus. *Par. Bat. pr.*
— — Æthiopica, Lavendulae folio. *Breyn. Cent.* 1.
— — Africana, foliis Staechados Citrinae, brevioribus, tomentofis.
— — — radice tuberofa. *H. L. B. app.*
— — — maxima, Hormini foliis, frutefcens, floribus parvis.
— — — lutea, folio obtufo, dentato.
— — — foliis Veronicae, hirfutis, ternis.
JUJUBE, feu ZIZYPHUS Africana, Ulmi minoribus foliis, flore violaceo, non fpinofa. Ulmi facie arbuscula Æthiopica, ramulis alatis, floribus purpurafcentibus. *Cat. Hort. Beaumont.*
— — Africana, longiffimis, & acutiffimis fpinis horrida, Loti arboris folio, fructu fubrotundo, parvo, dulci. *Cat. Hort. Beaumont.*
JUNCELLUS Africanus.

JUN-

JUNCELLUS Africanus, ſpica compreſſa, diſticha, brevi.
JUNCUS Africanus, laevis, panicula glomerata, prope ſummitatem caulis.
—— —— capitulis Equiſeti, paniculatis.
—— —— —— ſquammatis, pendulis.
—— —— capite pectinato.
JUNIPERI foliis frutex Africanus. *Par. Bat. pr.*
LACRYMA Jobi Africana, maxima.
LAPATHUM Africanum, facie Acetoſae lanceolatae.
LAURUS Alexandrina, Africana.
—— Africana, ſerrata, odorata. *Stapel.*
—— —— —— —— latifolia. Laurus Africana, ſerratis foliis. *Act. Hafn.*
—— —— —— —— anguſtifolia.
—— —— foliis Ilicis ſubrotundis, parvis, racemifera.
LARIX Africana, Linariae acutis foliis, ſingularibus.
LEUCOS Africana, foliis villoſis admodum, inſtar Marrubii albi, *Caſpar. Bauh.*, floribus parvis, tubuloſis.
LEUCOXYLUM Africanum, ſeu arbor baccifera, foliis alternis, Laurinis.
—— —— —— —— —— —— —— plurimis, baccis onuſta.
—— —— —— —— foliis ex oppoſito ſubrotundis, bacca polypyrena, acidula.
—— —— Idem, foliis acuminatis.
LEUCOJUM Africanum, album, anguſtifolium.
—— —— coeruleum, folio anguſtiſſimo, glabro.
—— —— hirſutum, foliis Coronopi latis, flore coeruleo.
—— —— —— —— anguſtis, flore coeruleo, amplo.
—— —— minus.
LEUCOJUM BULBOSUM, Africanum, foliis anguſtiſſimis.
LILIUM Africanum, umbellatum, purpureum, ad Solem micis aureis adſperſum.
—— —— humile, monanthos.
—— —— Narciſſinis foliis, Polyanthos, elatius, ſaturo colore purpuraſcentibus. *H. L. B.* Narciſſus Indicus, Liliaceus, ſaturo colore purpuraſcens. *Ferr. Fl. cult.*
—— —— Idem, colore diluto purpuraſcens. Narciſſus Indicus, Liliaceus, diluto colore purpuraſcens. *Ferr. Fl. cult.*
—— —— humilius, longiſſimis foliis, polyanthos, ſaturo colore purpuraſcens. *H. L. B.*
—— —— Idem, diluto colore purpuraſcens. *H. L. B.*
—— —— ſphaericum, floribus phoeniceis, majoribus, bulbo rotundo. *H. L. B.*
—— —— —— —— minoribus, obſolete purpureis, foliis guttatis, ad margines cilii inſtar piloſis, bulbo oblongo. *H. L. B.*
LILIO ASPHODELUS Africanus, flore ex albo, coeruleo, & carneo variegatus. *Inter depictas Dominae de Flines.*
LIMONIUM Africanum, Oleae folio.

Limonium Africanum, minimum.
Linum Africanum, luteum.
Lotus Africanus, capitulis alopecuroidibus, pediculis longis infidentibus.
Lychnis Africana, minima, folio anguftiffimo, viridi, flore purpureo, capfulis turgidis, ftriatis.
——— ——— Pfeudomelanthio fimilis, glabra, anguftifolia. *H. L. B.* Lychnis fegetum, Nigellaftrum, minus, glabrum, dictum, flore eleganter rubello. *Mar. Hift.*
——— ——— Lychnidis filveftris rubrae folio, flore pulchro, rubello, capfulis veficulatis.
——— ——— Eadem, anguftoribus foliis, capfulis longiffimis.
Lycium Africanum, rotundifolium, incanum, majus. Belgis *Lepelbout.*
——— ——— ——— ——— minus.
——— ——— longioribus foliis.
——— ——— foliis Cerafi.
——— ——— non fpinofum, craffis & incanis foliis. *Par. Bat. pr.*
——— ——— rotundo, crenato folio, fructu Cerafi rubro. Cerafus Hottentottorum. *Cat. Hort. Beaumont.*
——— ——— fpinofum, Beberidis foliis.
——— ——— ——— ——— ——— fpinis longiffimis.
——— ——— ——— Pyracanthae foliis.
——— ——— Betulae foliis. *Par. Bat. pr.*
——— ——— Rhamni Cathartici foliis, fpinofum.
Lycio forte affinis Africana, floribus in Corymbis Mofchum olentibus, foliis Paliuri.
Majorana Africana, frutefcens, foliis tomentofis.
Marrubium Africanum, Pfeudodictamni foliis, floribus rubris.
Melampyrum Africanum, fpicatum, foliis anguftiffimis, dentatis.
Melianthus Africanus. *H. L. B.*
——— ——— foetidus, minor.
——— ——— humilis, foliis minoribus.
Mercurialis Africana, minor, lucida.
Myrto-Buxus Africana, foliis rotundioribus. Buxus Africana, rotundifolia, ferrata. *Par. Bat. pr.*
——— ——— ——— longioribus, fructu duro, monococco.
Myrtus Africana, latifolia.
——— ——— humilis, foliis rotundioribus.
——— ——— ——— foliis Myrtilli crenatis, cauliculis nigricantibus. *H. L. B.* Frutex Æthiopicus, baccifer, foliis Myrtilli. *Breyn. Cent.* I.
——— ——— Eadem, foliis minoribus, anguftioribus, & oblongioribus. *Breyn. Cent.* I.
Nasturtium Africanum, floribus fpicatis, foliis ternis, Chriftophorianae facie. *Par. Bat. pr.*
Nasturtiolum Africanum, cauliculis procumbentibus, foliis Hyoferidis, flore purpureo.
——— ——— Idem, capitulis turgidis, majus.

Olea

OLEA Africana, filveftris, fructu Olivae, minori.
——— ——— folio longiore, acuto.
——— ——— humilis, lucida. *Par. Bat. pr.*
——— ——— filveftris, folio Phyllireae primae Clufii. Belgis *Pylhout.*
OLEAE FOLIO arbor Africana, fpicata, pappofa.
——— frutex Africanus.
ORCHIS Africana, latifolia, altiffima, flore luteo. Orchis maximus, flore luteor. *Breyn.*
——— ——— foliis junceis, floribus luteis, fundo purpureo.
——— ——— ——— anguftiffimis.
——— ——— abortiva, foliis anguftis, caulem amplectentibus, fpica longa, denfa.
OROBANCHE Africana, ramofa.
OROBUS Africanus, foliis minoribus, floribus globofis.
——— ——— purpureus, foliis & filiquis glabris, floribus fpicatis.
——— ——— glaber, foliis anguftis.
ORNITHOGALUM Africanum, fpicatum, luteum.
——— ——— ——— luteum, odoratum, foliis Cepaceis, radice tuberofa, five Cyclaminis. *H. L. B.*
——— ——— ——— flore viridi, alterno, alteri innato. *an* Ornithogalum, flore luteo, virefcente, Indicum? *Cornuti.*
——— ——— ——— fpicatum, album. *H. L. B.*
OXYS Africana, folio & flore parvo, albente, radice Afphodeli. *Par. Bat. pr.* Trifolium bulbofum, flore albo, Promont. Bonae Spei. *Stapel.*
——— ——— flore albente, ad foliorum exortus bulbifera.
——— ——— alba, foliis, & floribus minimis.
——— ——— alba, foliis hirfutis, flore amplo, albo.
——— ——— flore purpureo, magno, radice bulbofa. *H. L. B.*
——— ——— bulbifera, foliis cordatis, floribus luteis, umbellatis.
——— ——— foliis cordatis, hirfutis, floribus luteis, umbellatis, amplis.
——— ——— flore magno, foliis pedem Caprinum referentibus, in fummitate caulis.
——— ——— foliis anguftis, incanis, radice magna, bulbofa. Acetofa bulbofa; *Stapel.*
——— ——— anguftiffimis, dentatis foliis.
——— ——— ramofa, foliis anguftis, incanis, flore purpureo.
——— ——— heptaphylla, flore magno.
PERICLYMENUM Africanum, foliis lucidis, acuminatis, leviter ferratis.
PERSICA MALUS Africana, nana, flore incarnato, fimplici.
——— ——— eadem, flore incarnato, pleno. *H. L. B.*
PHALANGIUM ramofum, Africanum, floribus albis, fufcis lineis infignitis. *Par. Bat. pr.*
PHASEOLUS Africanus, luteus, annuus, minor.
——— ——— ——— filiquis brevibus, depreffis.
——— ——— annuus, minor, floribus rubellis, feu ex rubro eleganter variegatis.
——— ——— flore fingulari, filiqua brevi, tumida, femen unicum includente.

Phaseolus Africanus, floribus fpicatis, rubris.
——— ——— humilis, acaulos.
Phellandrium Africanum, humile, foliis crifpis.
Phillyrea Africana, Oleae folio, floribus albis, racemofis. *Slangenhout.*
——— ——— ——— eadem, folio & fructu majoribus.
Phyllitis Africana, ramofa.
——— ——— ——— altera, ramofior.
Pini folii Planta Africana, Cyperi capitulis.
Pistachia Africana, trifolia, foliis longis, anguftis, ferratis.
Piperitis Africana, frutefcens. *Peperboom.*
Planta Africana, anomala, foliis binis, in fummitate inftar Cornuum Cervi divifis, floribus ftaminofis, ad exortum divaricationis.
——— ——— ——— folio longo, inftar Plantaginis aquaticae.
Polygala Africana, frutefcens, latifolia, & major. *Par. Bat. pr.* Polygala Africana, frutefcens, Myrtifolia, flore purpurafcente. *Breyn. prodr.* 2.
——— ——— ——— foliis latioribus, hirfutis.
——— ——— ——— eadem, glabra.
——— ——— foliis anguftiffimis, floribus minoribus.
——— ——— Thymi foliis.
Polygonoides Africana, foliis capillaceis.
Polygonum Africanum, foliis anguftiffimis.
Polypodium Africanum, minimum, facie Ceterach. *Par. Bat. pr. app.*
Portulaca Africana, procumbens, Polyanthos, lutea.
Pulsatilla Africana, Apii folio rigido, flore magno.
Ranunculus Africanus, pratenfi hirfuto fimilis.
——— ——— aquaticus, folio capillaceo.
Rapunculus Africanus, galericulatus, annuus, minor, foliolis dentatis. *Par. Bat. pr.*
——— ——— ——— folio Thymbrae, flore galeato. Thymbra Africana, flore purpureo. *Act. Hafn.*
——— ——— ——— foliis Violae Martiae minoribus, flore galeato, coeruleo.
——— ——— ——— altiffimus, floribus in fummitate, foliis crenatis.
——— ——— ——— fpicatus, foliis latis, crenatis.
——— ——— ——— humi fufus, flagellis longiffimis, Thymi vel Polygoni foliis, anguftis.
——— ——— ——— hirfutus, foliis dentatis, capfula turgida.
——— ——— ——— ramofus, foliis dentatis, floribus Gladioli, lacuftris.
——— ——— ——— ramofus, flore albo, Drabae minoris folio.
Rapuntium Æthiopicum, flore violaceo, galeato, folio Pinaftri.
——— ——— ——— ——— coeruleo, galeato, foliis Coronopi.
——— ——— ——— ——— ——— foliolis dentatis. *Breyn. Cent.* I.
Rhamnus Africana, Cerafi fructu; Cerafa Hottentottorum. *Par. Bat. pr.*
——— ——— anguftifolius, fpinofus, cortice albo.
Rhus Africanum, trifoliatum, majus, folio rotundo, glabro. Lentifcus Africana, trifolia, humilis. *Par. Bat. pr.*

Rhus

RHUS Africanum, idem minus. Rhus trifoliatum, Africanum, glabrum, folio ſplendente, ſubrotundo, integro. *Plukn.*

——— ——— trifoliatum, foliis oblongis, integris.

——— ——— ——— majus, lato, anguſto, nonnunquam crenato folio. Rhus trifoliatum Africanum, majus, foliis ſubtus argenteis, & margine inciſis. *Plukn.*

——— ——— lato, anguloſo, folio ſubtus incano.

——— ——— anguſtiſſimo folio, altera parte incano, ſeu Agni caſti folio.

——— ——— foliis crenatis, & hirſutis. Rhus Africanum, trifoliatum, majus, foliis obtuſis, & inciſis, hirſutis. *Plukn.*

——— ——— trifoliatum, foliis rotundis, hirſutis. Rhus Africanum, trifoliatum, majus, folio ſubrotundo, integro, molli, & incano. *Plukn.*

RORISMARINI FOLIIS ternis, anguſtis, fruteſcens planta, Africana, floribus ſpicatis, pentapetalis, minimis.

——— ——— Eadem minor.

Ros SOLIS Africanus, minimus, foliis oblongo-rotundis.

——— ——— folio lato, & longo.

——— ——— foliis longis, anguſtioribus.

——— ——— Ciſtoides, foliis oblongis per caulem diſpoſitis.

RUBIA Africana, foliis Rorismarini anguſtis.

RUBIAE Cruciatae Columnae ſimilis, planta Africana, erecta, foliis brevibus, ſucculentis.

SABINA Africana, conifera.

SALVIA Africana, arboreſcens, major, folio Verbaſci. *Breyn. Cent.* I. Salvia Indica, arboreſcens *Bontii.*

SCABIOSA Africana, fruteſcens, maxima, foliis rugoſis, & crenatis, integris, capite rotundo. *Par. Bat.*

——— ——— ——— Eadem minor. *Par. Bat.*

——— ——— ——— fruteſcens, diſſectis foliis, ſubhirſutis, flore purpureo. *Par. Bat.*

——— ——— ——— Eadem, flore coeruleo. *Par. Bat.*

——— ——— ——— per totam aeſtatem florens.

——— Æthiopica, fruteſcens, foliis lanuginoſis, flore coeruleo, purpuraſcente. *Breyn.*

——— ——— ——— Eadem flore coeruleo.

——— ——— ——— Eadem foliis profunde laciniatis. *Breyn.*

——— Africana, perennis, foliis diſſectis, lucidis, glabris. *Par. Bat. pr.*

——— ——— ——— Eadem foliis glabris, & candicantibus, flore pallide coeruleo. *Par. Bat. pr. app.*

SCILLA Africana, flore viridi, parvo, bulbo ampliſſimo, lanuginoſo. *H. L. B.*

SCOLYMOCEPHALOS Africana, lato, rotundo, glabro folio, cono maximo, ſericeo, candido.

——— ——— ——— foliis ſubrotundis, glabris, minor.

——— ——— ——— foliis longis, glabris, cono ſericeo, ſquamis rubiginea villoſa criſta ornatis.

——— ——— ——— ——— ——— cono variegato, reſinifero.

——— ——— ——— foliis oblongis, glabris, humilis, & procumbens.

SCOLYMOCEPHALOS Africana, foliis oblongis, glabris, craffis, latioribus.
— — — — foliis longis, acutioribus, hirfutis, cono mellifero.
— — — — foliis fericeis, argenteis, longis, acutis. *Silverboom.*
Leucodendros Africana, arbor tota argentea, fericea, foliis integris. *Plukn.*
— — — — latifolia, lanuginofa, foliis in fummitate crenatis. *Kreupelboom.* Salix conophoros, Africana, lato, obtufo, crenato, folio lanuginofo. *Par. Bat. pr.* Leucodendro affinis arbor Africana, argentea, foliorum fummis crenaturis florida. *Plukn.*
— — — — — latifolia, lanuginofa, foliis in fummitate crenatis, cono fericeo.
— — — — latifolia, lanuginofa, foliis in fummitate crenatis, cono filamentis longis recurvis ornato, facie Rapunculi corniculati.
— — — — latifolia, foliis Meferei Germanici, denfe ftipatis, capitulis rarioribus, pluribus filamentis donatis.
— — — — foliis brevioribus, in tubercula definentibus.
— — — — foliis longis, anguftis, Crithmi, in fummitate dentatis.
— — — — foliis anguftis, brevioribus, tribus in fummitate denticulis, capitulis foliolis interceptis.
— — — humilis, floribus dilute purpureis, carinula albida, foliis in fummitate dentatis.
— — argenteus, foliis brevioribus, Myrtiformibus, capitulis rarioribus.
— — — foliis longis, glabris, anguftis.
— — — humils, foliis Thymelaeae. Frutex Æthiopicus, conifer, foliis Cneori, Salici aemulus. *Breyn. Cent.* I.
— — — foliis Doricnii Plateau.
— — folio anguftiffimo, fericeo, viridante.
— — foliis longis, anguftis, asperis.
— — foliis Rorismarini, acutis.
SEDUM Africanum, minimum, Ficoides, & Centaurioides.
— — — — — — flore muscofo.
— — frutefcens, incanum, orbiculatis foliis. *H. L. B.*
— — — viride, orbiculatis foliis, minoribus, floribus Hemerocallidis pendulis, rubris.
— — — — foliis longioribus, floribus Hemerocallidis. *H. A.*
— — — — humilius, folio Ficoidis, glauco, brevi, floribus umbellatis.
— — — — Idem folio glauco, craffiori.
— — — — foliis Ficoidis, longioribus, acutis, floribus minimis, in capitula conglobatis.
— — — — elatius, Ficoidis folio glauco, floribus umbellatis.
— — album, umbellatum. *H. L. B.*
— — annuum, Centaurii minoris facie, flore aureo. *H. L. B.*
— — Centaurioridis, luteum, foliis acutis.
SENECIO Africanus, foetidus, annuus, foliis confertim nafcentibus. *Breyn.* Conyza Africana, Senecionis flore, foliis retufis *H. L. B.*

SIDERITIS Africana, Teucrii, vel Veronicae folio, flore rubro.
SIDERITIDIS FACIE Planta Africana.
SIDEROXYLUM Africanum, feu Lignum ferrea duritie, folio oblongo. Lignum ferreum *Par. Bat. pr.*
— — — — Idem, folio fubrotundo.
— — — — Idem foliis Laurinis, lucidis.
— — — — Idem foliis oblongis, utrimque glaucis.
SISYNRIGHIUM Africanum, flore Phalangii albo, bulbiferum.
— — — — Idem luteum.
— — — — Idem rubrum.
— — — — Idem floribus Liliaceis, coeruleis, foliis nervofis, hirfutis.
— — — — Idem floribus minoribus, & ramofius.
— — — — Idem floribus minoribus, non ramofum.
— — — — Phalangii flore magno, ex coeruleo & albo variegato.
— — — — minimum, floribus longiffimo tubo donatis, foliis gramineis, hirfutis.
— — — — ramofum, foliis nervofis, florbius longis, tubo donatis.
— — — — foliis Colchici, floribus Fritillariae inftar undulatis, floribus longiffimis, tubo donatis.
— — — — ramofum, floribus undulatis.
— — — — flore coeruleo, Iridis feu Sifynrichii Clufii.
— — — — ramofum, umbellatum, floribus coeruleis.
— — — — Idem floribus albis.
— — — — foliis binis, longis, Helleborini montani.
— — Æthiopicum, flore ex Phoeniceo, fuave rubente. *Breyn. Cent.* 1.
— — — — Idem, flore albo. *H. L. B.*
— — — — Idem, flore intus albo, foris purpureo, violaceo. *Par. Bat. pr.*
— — — — flore aureo. *Par. Bat. pr.*
— — — — floribus parvis, flavefcentibus. *Par. Bat. pr.*
— — — — flore pentapetalo, albo. *Par. Bat. pr.*
— — — — Idem, flore obfoleto. *Par. Bat. pr.*
— — — — petalis tribus externis majoribus, & tribus internis minoribus, & bifidis. *Par. Bat. pr.*
— — — — pumilum, fpicatum. *Par. Bat. pr.*
— — — — flore pallefcente, foliis Gladioli parvis. *H. L. B.*
— — — — ramofum, foliis plicatis, nervofis, & incanis, radice tuberofa, phoenicea. *Breyn. Cent.* 1.
— — Africanum, floribus luteis, dodecapetalis. *Inter depictas Dominae de Flines.*
— — — — latifolium, foliis Iridem referentibus. *Inter depictas Dominae de Flines.*
— — — — Croco-Colchicum dictum. *an* Sifynrichium Indicum *Cornuti?*
SISYNRICHIUM Africanum, enneapetalon, album, foliis ad bafin punctatis, tribus majoribus externis, tribus internis minoribus, bifidis, fufcis, & tribus longioribus, bifidis, albis.

SPIR-

Spiraea Africana, Cifti folio.
Spartium Africanum, foliis junceis, fesquiuncialibus, floribus parvis, filiqua fplendente, acuminata.
— — — flore purpureo. Genifta-Spartium coeruleum, Capitis Bonae Spei. *Breyn. Cent.* 1.
— — — luteum, fpicatum, foliis Linariae anguftiffimis.
Solanum Africanum, arborefcens, pomiferum.
— — — ——— latifolium, floribus pendulis, baccis coeruleo-purpurafcentibus.
— — — Idem floribus albis.
— — — fcandens, foliis Bryoniae. Bryonia Africana, foliis Lupuli fcabris. *Plukn.*
— — — frutefcens, foliis Lauri Tini. *an* Frutex anonymos foliis Lauri Tini minoris? *Breyn. fafc.*
— — — ——— pomiferum, fpinofum, nigricans, Borraginis flore, foliis profunde laciniatis. *H. L. B.*
— — — bacciferum, vulgari fimile, foliis frequentius, &profundius crenatis. *Par. Bat. pr.*
— — — incanum, pomiferum, fpinofum, fructu fulcato, rubro. *Par. Bat. pr.*
— — — fpinofum, Rhamni facie, foliis anguftiffimis, flore oblongo, tubulofo, fufco.
— — — Idem, foliis latioribus, inftar Rhamni, flore coeruleo, bacca rubra.
— — — Idem, foliis Rhamno Monfpeffulano Joann. Bauhini adhuc latioribus.
Staphylodendron Africanum, folio lucido, fingulari. *Par. Bat. pr. Swarte baftboom.* Arbor quaedam rariffima, lucens, fructu Halicacabi. *Breyn.*
Thymelaea Africana, Sanamundae facie, Ericae foliis anguftiffimis. *Par. Bat. pr.* *an* Sanamunda Africana, foliis anguftiffimis, candicantibus. *Breyn.*
— — — Linifoliae fimilis, floribus pallidis, odoratiffimis. *Par. Bat. pr.*
— — — foliis Polygalae glabris, brevioribus. *an* Sanamunda Africana quarta, five foliis glabris, acutis. *Breyn. Fafc.* ?
— — — foliis Sanamundae primae Clufii.
— — — foliis Plegmariae fquammatim difpofitis, ramulis fpicatis.
— — — — — latioribus, viridibus, capitulis lanuginofis.
— — — — — longioribus, ramulis fpicatis.
— — — folio Ledi Selefiaci anguftioribus, floribus umbellatis.
— — — folio Abietis, floribus umbellatis, carneis.
— — — foliis Lini anguftiffimis, floribus umbellatis, albis.
— — — foliis Satureae argute denticulatis, floribus in capitula congeftis.
— — — follis anguftis, raris.
— — — Eadem foliis raris, brevioribus, minor.
— — — foliis Jumperi, floribus luteis.

THYMELAEA Africana, foliis Rorismarini minoribus, floribus Jasmini.
— — — foliis breviſſimis, floribus conglobatis.
— — Æthiopica, Paſſerinae foliis. *Breyn. Cent.* 1.
— — Africana, foliis Abietis, capitulis villoſis.
— — Linifoliae ſimilis, Africana, foliis lucidis, latioribus, & obtuſis. *Par. Bat. pr.*
TITHYMALUS Africanus, fruteſcens.
— — — anguſtifolius.
— — — Amygdaloides.
— — — foliis Lini anguſtioribus.
— — — flore herbaceo, folio Geniſtae.
— — — dendroides.
— — — humilis, radice tuberoſa, foliis oblongis, in ſummo cordatis, pediculis inſidentibus biuncialibus.
TRIFOLIUM Africanum, foliis minimis, cordatis, floribus Trifolii Veſicarii.
TUSSILAGO Africana, Petaſitoides, caule foliorum alato, hirſuto.
— — — humilis, flore majore, fere aphyllos.
VERBENA Africana, foliis Verbenae nodiflorae lanuginoſis. Verbena Indica, lanuginoſa *Stapel.* Verbena Africana, lanuginoſa, flore rubente. *Aćt. Hafn.*
— — — Eadem foliis viridibus. Verbena Indica minor, flore luteo. *Aćt. Hafn.*
— — — foliis latioribus, ſerratis, hirſutis.
— — — fruteſcens, ſpicata, foliis anguſtioribus, ſerratis.
— — — —— ſpicata, foliis Ericae.
— — — —— umbellata, foliis anguſtiſſimis, ſerratis.
VERONICA Africana, floribus luteis, tubo longo donatis.
— — — floribus ad genicula pediculis biuncialibus inſidentibus.
VITI IDEAE ſimilis frutex Africanus. *Par. Bat. pr. an* Viti Ideae ſecundae Cluſii ſimilis, *Breyn.*
XERANTHEMUM Africanum, fruteſcens, lanuginoſum, floribus argenteis, ampliſſimis, umbone fuſco.
— — — foliis tomentoſis, longis, capitulis argenteis, minoribus.
— — — fruteſcens, caulibus Geniſtae, foliis junceis, capitulis copioſis, argenteis.
— — — —— lanuginoſum, capite ſulphureo, amplo.
— — — Idem, capitulis ſulphureis, minoribus.
— — — minus, capitulis breviſſimis, argenteis, foliis caulem amplectentibus.
— — — fruteſcens, Thymi foliis incanis.
— — — —— Majoranae foliis minoribus.
XERANTHEMI ſpecies, foliis candidis.
ZIZYPHUS Africana, ſpinis validiſſimis armata.

CATALOGUS ALTER
PLANTARUM AFRICANARUM,

Quas *Henricus Bernardus Oldenlandus*, & *Joannes Hartog*, Botanici egregii, in Capite Bonae Spei quondam invenerunt, ac denominaverunt.

ABUTILON Africanum, foliis rugoſis, & ſiliculis lanuginoſis. *Simon Pauli in quadr. Botan. pag.* 186.

ABSINTHIUM Africanum, fruteſcens, foliis latioribus.

ALATERNOIDES Africana, Ericae foliis, floribus albicantibus, & muſcoſis.

—— —— —— Telephii legitimi Inperati folio, flore viridi.

—— —— —— Lauri ſerratae foliis.

—— —— —— Chamaemeſpili folio, rigidiore & minore, floribus albicantibus.

—— —— —— Roriſmarini latiori & piloſiori folio, flore coeruleo.

ALLIUM Africanum, flore purpuraſcente.

ALOE Africana, arboreſcens, montana, non ſpinoſa, folio longiſſimo, plicatili, flore rubro.

—— —— arboreſcens, floribus albicantibus, fragrantiſſimis.

—— —— cauleſcens, foliis ſpinoſis, maculis ab utraque parte albicantibus notatis.

—— —— breviſſimo, craſſiſſimoque folio, flore ſubviridi.

—— —— folio glabro, rigidiſſimo, flore ſubviridi.

—— —— flore rubro, folio maculis ab utraque parte albicantibus notato.

—— —— flore rubro, folio triangulari, & verrucis ab utraque parte albicantibus notato.

—— —— folio in ſummitate triangulari, margaritifera, flore ſubviridi.

—— —— margaritifera, minor.

—— —— foliis glaucis, margine & dorſi parte ſuperiore ſpinoſis, flore rubro.

—— —— foliis glaucis, margine dorſi integro, ſpinoſis.

—— —— cauleſcens, foliis glaucis, caulem ampleсtentibus.

—— —— folio triangulo, & longiſſimo, floribus luteis, & foetidis.

—— —— cauleſcens, foliis magis glaucis, caulem amplectentibus, & in mucronem obtuſiorem deſinentibus.

—— —— cauleſcens, foliis minus glaucis, caulem amplectentibus, dorſi parte ſuperiore ſpinoſa.

ALOE

Aloe Africana, caulefcens, foliis glaucis, caulem amplectentibus, latioribus, & undiquaque fpinofis.
—— —— —— foliis glaucis, caulem amplectentibus, dorfo integro fpinofo.
—— —— —— foliis glaucis, brevioribus, amplectentibus, foliorum parte interna & externa non nihil fpinofa.
—— —— —— foliis glaucis, breviffimis, foliorum fummitate interna, & externa non nihil fpinofa.
—— —— —— perfoliata, glauca, & non fpinofa.
—— —— glabro folio, minutiffimis cavitatibus donato.
—— —— humilis, fpinis inermibus, & verrucis obfita.
—— —— —— Arachnoidaea.
—— —— —— foliis ex albo & viridi variegatis.
—— —— —— folio non nihil reflexo, floribus ex albo & rubro variegatis.
—— —— —— folio in fummitate triangulari, & rigidiffimo, marginibus albicantibus.
—— —— erecta, triangularis, & triangulari folio, vifcofo.
—— —— —— rotunda, folio parvo, & in acumen rigidiffimum exeunte.
Althaea Africana, veficaria.
Amygdalus Africana, nana, flore incarnato, rofeo, fimplici, folio Mali Perficae anguftiore.
—— —— nana, flore incarnato, rofeo, pleno, folio Mali Perficae anguftiore.
Anemonospermos Africana, foliis Cardui Benedicti, florum radiis intus fulphureis.
—— —— foliis Plantaginis, flore fulphureo.
—— —— folio Jacobaeae maritimae, flore fulphureo.
Apocynum Africanum, erectum, villofo fructu, Salicis folio, lato, glabro.
—— —— —— —— —— —— —— fubhirfuto.
—— —— —— —— —— —— glabro, angufto.
—— —— —— fubhirfutum, foliis undulatis.
—— —— humile, aizoides, filiquis erectis.
—— fcandens Africanum, Vincae Pervincae foliis, fubincanum.
—— Africanum, Asphodeli radice, anguftiffimo folio.
—— —— —— —— Lapathi folio.
Argyrodendros foliis fericeis, & argenteis.
Arum Æthiopicum florigerum, & fructum ferens, radice magna, orbiculari.
—— maximum Ægyptiacum, quod vulgo Colocafia audit.
—— Africanum, flore albo, odorato.
Asclepias Africana, aizoides.
—— —— longioribus foliis, minus dentatis.
—— —— flore pulchro, fimbricato.
Asparagus fylveftris, Africanus, aculeatus.
Asphodelus Africanus, anguftifolius, luteus, minor.
Asplenium Africanum, ramofum, maximum, caulibus fplendentibus.

Aster Africanus, Jacobaeae foliis, flore aureo.
——— ——— Stoechadis foliis, flore aureo.
——— ——— ramofus, Hyffopi foliis, floribus coeruleis.
——— ——— ——— ——— — albis.
——— ——— Helichrifi folio, flore rubro.
——— ——— frutefcens, foliis anguftis, & plerumque conjunctis.
——— ——— ——— fpendentibus, parvis, & reflexis foliis.
——— ——— ——— Lavendulae foliis, flore purpureo.
——— ——— annuus, Senecionis foliis.
——— ——— frutefcens, foliis Senecionis craffioribus.
Asteroplatu-carpos Africana, frutefcens, Crithmi marini foliis.
Astragalus Africanus, odoratus, filiqua triangulari, flore luteo.
Bellis Africana, florum pediculis pene aphyllis, foliis incifis.
——— ——— ——— foliofis, foliis anguftis, & integris.
——— ——— capitulo aphyllo, luteo, Coronopi folio, cauliculis procumbentibus.
——— ——— ——— ——— ——— foliis, & cauliculis junceis, erectis.
Bryonia Africana, glabra, foliis in profundas lacinias divifis, fructu minore.
——— ——— laciniata, tuberofa radice, floribus herbaceis.
Calendula, five Caltha Africana humilis, flore intus albo, foris violaceo, fimplici.
Campanula Africana, annua, hirfuta, latis ferratisque foliis, flore magno, violaceo.
——— ——— ——— ——— glabra, ferrato folio, flore pallido.
——— ——— ——— hirfuta, parvo anguftoque folio, flore pallide violaceo.
——— ——— ——— annua, anguftifolia, flore purpurascente, major.
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— minor.
——— ——— ——— frutescens, aculeofa, flore violaceo.
——— ——— ——— minor, Erini facie, flore violaceo, cauliculis erectis.
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— procumbentibus.
Camphorata Africana, umbellata, frutescens.
Cardamine, feu Nafturtium Africanum, foliis ternis, facie Chriftophorianae.
Centaurium-majus Africanum, laciniatum, flore aureo, odorato.
——— ——— minus Africanum, Lini foliis, & facie, flore amplo, fuave rubente.
——— ——— ——— arborefcens, latifolium, flore ruberrimo.
——— ——— ——— ——— anguftifolium, ———
——— ——— ——— ——— tulipiferum.
Cheiranthos Africana, flore luteo.
Chrysanthemum Africanum, Stoebes foliis anguftioribus.
——— ——— repens, flore aphylo, Coronopi folio.
Chrysanthemoides ofteofpermon, Africanum, odoratum, fpinofum, & vifcofum.
Cistus humilis, aizoides, maritimus, Africanus, flore rubello.
Colutea Africana, annua, foliis parvis mucronatis, veficulis compreffis.
——— ——— ——— cordatis, & veficulis minus compreffis.

Colutea

COLUTEA Africana, Sennae foliis, flore fanguineo.
——— ——— humilis, flore fanguineo, Crotolariae filiquis.
COMA AUREA Africana, fruticans, foliis Linariae anguftis, major.
——— ——— ——— anguftioribus, minor.
——— ——— ——— glaucis, & lanuginofis.
——— ——— — omnium maxima, foliis tomentofis, & incanis.
——— ——— — Ericae folio.
——— ——— — foliis glaucis, & in extremitate trifidis.
——— ——— — —— Crithmi marini.
——— ——— — —— inferioribus incifis, fuperioribus dentatis.
CONYZA Africana, arborefcens, incana, floribus purpureo-violaceis, foliis Salviae, odore Salviae & Rorismarini.
——— ——— humilis, foliis anguftioribus, nervofis, floribus umbellatis.
——— ——— frutefcens, foliis Salviae, odore Camphorae.
——— ——— ——— — Erucae hamatis, & incanis.
——— ——— ——— — Rorismarini.
——— ——— Senecionis flore.
COTULA Africana, calice eleganti, caefio.
COTYLEDON Africanum, frutefcens, foliis orbiculatis, limbo purpureo cinctis.
——— ——— tereti folio, flore pulcherrimo.
——— ——— foliis oblongis, floribus umbellatis, fibrofa radice.
——— ——— frutefcens, folio longo, angufto, flore flavefcente.
——— ——— ——— flore umbellato, coccineo.
CYTISUS Africanus, argenteus, flore atro-purpureo.
——— ——— hirfutus, anguftifolius.
——— ——— herbaceus, floribus rubris.
ECHIUM Africanum, frutefcens, foliis pilofis.
——— ——— perenne, Lycopfis facie.
ELICHRYSUM Africanum, lanuginofum, latifolium, calice floris argenteo, & ampliffimo.
——— ——— lanuginofum, anguftiffimo folio, calice floris argenteo, & ampliffimo.
——— ——— tomentofum, frutefcens, calice argenteo.
——— ——— ——— ——— floris calice aureo.
——— ——— frutefcens, Coridis folio.
——— ——— incanum, tomentofum, foliis fubrotundis.
——— ——— umbellatum, odoratum, luteum.
——— ——— frutefcens, anguftis, & longioribus foliis, incanis.
——— ——— latifolium, foetidum, capitulo argenteo; & aureo.
——— ——— luteum, Polii folio.
——— ——— tomentofum, incanum, anguftifolium, floribus rubris.
——— ——— frutefcens, foliis Chrithmi marini.
——— ——— arboreum, Rorismarini folio.
——— ——— Plantaginis folio.

Elichrysum Africanum, foetidiffimum, ampliffimo folio.
—— — inodorum, glabrum, Coronopi folio.
Ephemerum Africanum, annuum, flore bipetalo.
Erica Africana, viridis, anguftisfimis foliis, flosculis in capitulum congeftis.
— — flosculis fubhirfutis, fecundum ramulos difpofitis.
— — incana, foliis anguftisfimis.
— — capillaceo, brevique folio, flore rotundiore, purpureo.
— — folio minimo, flore rotundiori, albido.
— — Coris folio, flore oblongo, fpicato.
— — —— —— purpureo, è foliorum alis prodeunte.
— — —— — breviori, purpureo, — —
— — —— floribus veficariis.
— — Juniperi folio, flore oblongo, fpicato.
— — — — — umbellato.
Euonymus Africanus, folio lucido, ferrato.
Fabago Africana, arborefcens, flore fulphureo, fructu rotundo.
Ferula Africana, galbanifera, frutefcens, Myrrhidis foliis.
Ficoides Africana, folio Plantaginis undulato, micis argenteis adfperfo.
—— —— acaulos, latiffimis, craffis, & lucidis foliis conjugatis, flore aureo, ampliffimo.
—— —— erecta, Ocymaftri folio, micis argenteis adfperfo, flore rofeo, magno.
—— —— —— ramofa, Tripolii folio, flore aureo, magno.
—— feu Ficus aizoides, Africana, folio anguftiori.
—— —— —— minor, multicaulis, flore intus rubente, extus incarnato.
—— Africana, folio enfiformi, dilute virenti, flore aureo, brevi pediculo infidente.
—— —— —— obfcure virenti, flore longo pediculo infidente.
—— —— —— varie incifo, aureo flore pediculo infidente.
—— feu Ficus aizoides, Africana, procumbens, folio triangulari, enfiformi.
—— —— —— triangulari folio, longiffimo, fructu multicapfulari, flore luteo, major, & altera minor.
—— folio triangulari, longiffimo, flore aureo.
—— —— —— —— flore purpureo.
—— —— —— —— flore carneo.
—— feu Ficus aizoides, Africana, major, procumbens, triangulari folio, fructu maximo, eduli.
—— Africana, folio longo, triangulari, incurvo, purpureo caule.
—— —— triangulari, recurvo, floribus umbellatis, obfoleti coloris, externe purpureis.
—— —— flore flavefcente.
—— —— lanceato.
—— —— incurvo, & dentato.
—— —— obtufo, in geminos aculeos abeunte, flore aureo.

Ficoi-

Ficoides Africana, folio longo, triangulari, apice rubro, caule purpurafcente.
—— feu Ficus aizoides, Africana, minor, erecta; triangulari folio, viridi, flore intus aureo, foris purpureo.
—— —— —— —— —— —— —— glauco, flore luteo.
—— Africana, frutefcens, perfoliata, folio triangulari, glauco, punctato, cortice lignofo, tenui, candido.
—— —— erecta, folio triangulari, glauco, punctis obfcurioribus notato.
—— —— humilis, folio triangulari, glauco, bullato, flore luteo.
—— —— —— —— —— —— dorfo aculeato, flore luteo.
—— —— —— erecta, folio triangulari, glauco, & brevi, flore carneo.
—— —— —— humifufa, folio triangulari, longiori, glauco, flore flavefcente.
—— feu Ficus aizoides, Africana, folio tereti, procumbens, flore purpureo.
—— —— —— —— —— —— —— —— coccineo.
—— Africana, folio tereti, in villos radiatos abeunte.
—— —— —— aculeis longiffimis, & foliatis, nafcentibus ex foliorum alis.
—— —— —— repens, & laete virens, flore purpureo.
Filicula Africana, maxima, ramofa, pinnulis tenuius diffectis.
—— —— in acutas divifa lacinias.
Filix Africana, maxima, ramofa, pinnulis crenatis.
—— —— dentata, Lonchitidis facie.
—— —— ramofa, pinnulis Lonchitidis.
Foeniculum Africanum, foliis in fummitate atro-rubentibus, feminibus anguftis, & longioribus.
Frutex Africanus, aromaticus, flore fpicato, exiguo.
—— Æthiopicus, Portulacae folio, flore ex albido virefcente.
Galega Africana, floribus majoribus, & filiquis craffioribus.
Genista Africana, frutefcens, Rusci nervofis foliis.
—— —— —— —— anguftis foliis.
—— —— Lavendulae folio.
—— —— juncea, floribus coeruleis, foliis minimis.
—— —— minima, foliis Myrthi, in exquifitum mucronem definentibus.
—— —— Rorismarini foliis, flore aureo.
—— —— arborefcens, argentea, lanugine pubefcens.
—— —— frutefcens, fpicata, purpurea, foliis anguftiffimis.
—— —— —— foliis Torton-Raire, flore purpureo.
—— —— Laricis foliis longioribus, & lanuginofis.
—— —— —— craffioribus, & hirfutis.
—— —— frutefcens, fpicata, Laricis foliis.
—— —— —— capitata, ——
—— —— lutea, fpicata, Laricis foliis.
—— —— frutefcens, capitulis lanuginofis, Laricis breviffimo folio.
—— —— —— Laricis incanis foliis.
—— —— Camphoratae foliis, floribus luteis, minimis.

Genista Africana, foliis Gallii.
—— — Dorycnii facie.
—— — arborefcens, Styracis folio, flore coeruleo.
Geranium Africanum, arborefcens, Ibifci folio rotundo, Carlinae odore.
—— — frutefcens, Malvae folio laciniato, odorato, flore purpurafcente.
—— — Alchimillae hirfuto folio, floribus albidis.
—— — arborefcens, Alchimillae hirfuto folio, floribus rubicundis.
—— — Betonicae folio laciniato & maculato, floribus incarnatis.
—— — —— procumbente, floribus parvis, eleganter variegatis.
—— — noctu olens, tuberofum, & nodofum, Aquilegiae foliis.
—— — —— Aquilegiae folio, flore incarnato, rubente.
—— — —— flore ruberrimo, Anemones folio latiore.
—— — —— — rubro, Anemones folio anguftiore.
—— —— —— radice tuberofa, foliis Paftinacae incanis, lanuginofis, flore pallide flavefcente.
—— —— —— —— —— —— lanuginofis, anguftioribus.
—— —— —— tuberofum, Vitis foliis hirfutis.
—— —— minus, Coriandri folio, floribus incarnatis.
—— —— Uvae crifpae folio, floribus exiguis, rubellis.
—— —— majus, Coriandri folio, floribus incarnatis.
—— —— Althaeae folio, flore parvo.
—— —— foliis plerumque auratis, floribus ex rubro purpurafcentibus.
—— —— Myrrhidis folio, flore albicante, radice Rapacea.
—— —— foliis inferioribus Afari, fuperioribus Staphydisagriae, maculatis, fplendentibus, & acetofo fapore.
—— —— Aftragali folio.
—— —— frutefcens, folio craffo, & glauco, Acetofae fapore.
Globularia Africana, frutefcens, Thymelaeae folio lanuginofo.
Haemanthus Africanus, five Tulipa Africana, flore albo.
Hyacinthus Africanus, flore coeruleo, umbellato, tuberofus.
Jacobaea Africana, frutefcens, Abrotani folio.
—— —— —— Hormini folio.
—— —— Sonchi folio.
—— —— Dentis Leonis folio.
—— —— Abfynthii folio.
—— —— foliis integris, undulatis, & crifpis.
—— —— laciniata, latifolia, flore purpureo.
—— —— —— anguftifolia —— ——
—— —— radice tuberofa.
—— —— frutefcens, foliis incifis, & fubtus cineraceis.
—— —— —— —— Abfynthii umbelliferi, incanis.

Jaco-

JACOBAEA Aricana, frutescens, Coronopi foliis.
—— —— —— Lavendulae folio latiore.
—— —— —— folio longo, & glauco.
—— —— Hederae terrestris folio, repens.
—— —— frutescens, crassis, succulentis foliis.
—— —— —— foliis rigidis, & hirsutis.
JASMINUM Africanum, foliis solitariis, floribus vulgatiori similibus.
—— —— Ilicis folio, flore solitario ex foliorum alis proveniente, albo.
KETMIA Africana, Populi folio.
—— —— —— subtus incano, & caule virescente.
—— —— vesicaria, folio tripartito, flore purpureo.
—— —— —— fruticans, & erecta, Alni foliis latioribus, & majoribus, flore spirali, sulphureo.
—— —— frutescens, foliis mollibus, & incanis, flore spirali, sulphureo.
—— —— vesicaria, Uvae crispae foliis, flore spirali, sulphureo.
LAURUS Africana, minor, Querci folio.
—— —— inodora, fructu globoso, Lauro serratae odoratae Stapelianae similis.
LAURIFOLIA Africana. *Swarte bastboom.*
LEONURUS perennis, Africanus, Sideritidis folio, flore phoeniceo, majore, villoso.
LEUCOYUM Africanum, coeruleo flore, latifolium, hirsutum.
—— —— —— —— —— angusto Coronopi folio, majus.
—— —— —— —— —— —— —— —— minus.
LILIO-NARCISSUS Africanus, humilis, longissimis foliis, Polyanthos, saturato colore purpurascens.
—— —— —— platycaulis, flore purpurascente, odorato.
LOTUS Africana, annua, hirsuta, floribus luteis.
—— —— frutescens, flore spicato, rubicundo.
LYCHNIS Pseudo-Melanthio similis, Africana, glabra, angustifolia, flore eleganter rubello.
LYCIUM Æthiopicum, Pyracanthae folio.
MALVA Africana, frutescens, flore rubro.
MELIANTHUS Africanus.
—— —— minor, humi fusus, foliis Pimpinellae crispae.
—— —— —— foetidus.
MYRTUS Africana, humilis, foliis Myrtilli crenatis, cauliculis nigricantibus.
NARCISSUS Africanus, Polyanthos.
OLEA Africana, humilis, sylvestris, folio duro, subtus incano.
OREOSELINUM Anizoides, arborescens, Ligustici foliis & facie, flore luteo.
ORNITHOGALUM Africanum, luteum, odoratum, foliis Cepaceis, radice tuberosa.
—— —— Plantaginis roseae folio, radice tuberosa.
OXYS bulbosa, Africana, rotundifolia, caulibus & floribus purpureis, amplis.
—— —— Æthiopica, vel Africana, minor, folio cordato, flore ex albido, purpurascente.

PETASITES Africana, Calthae paluſtris folio, radice flaveſcente, craſſa.
PHALANGIUM Africanum, ramoſum, floribus albis, petalis reflexis.
PHASEOLUS Africanus, hirſutus, bituminoſus, ſiliquis bullatis, flore flavo.
——— ——— parvo fructu, nonnihil albicante.
——— ——— perennis, minor, flore ſuaverubente.
PLANTA lactaria, Africana.
PIMPINELLA Africana, Saxifraga, maxima.
POLYGALA Africana, fruteſcens, anguſtiſſimo folio, minor.
——— ——— Lini folio, flore magno.
——— ——— fruteſcens, Buxi folio, maximo flore.
——— ——— arborea, Myrthifolia, floribus albis, intus purpureis.
POLYPODIUM Africanum, maximum, acutiſſime diviſum.
PORTULACA Africana, ſempervirens, flore rubicundo.
PSEUDO-DICTAMNUS Africanus, Hederae terreſtris folio.
——— ——— ——— foliis ſubrotundis, ſubtus incanis.
RANUNCULUS Africanus, ſeu Æthiopicus, foliis rigidis, floribus ex luteo vireſcentibus.
RAPUNTIUM Africanum, minus, anguſtifolium, flore violaceo.
RICINUS Africanus, maximus, caule geniculato, rutilante.
SALIX Africana, anguſtis, & longiſſimis foliis, ſubtus incanis.
SALVIA Africana, fruteſcens, Scorodoniae foliis, flore violaceo.
——— ——— ——— folio ſubrotundo, glauco, flore magno, aureo.
SCABIOSA Africana, arboreſcens, maxima, foliis rugoſis, & crenatis, integris.
——— ——— fruteſcens, foliis rigidis, ſplendentibus, & ſerratis, flore albicante.
——— ——— capitulo oblongo, flore albo.
SCILLA Africana, flore viridi, parvo, bulbo ampliſſimo.
SCLAREA Africana, praecox, annua.
——— ——— fruteſcens, Helianthemi folio.
SEDUM Africanum, fruticoſum, Ericae folio.
——— ——— arboreſcens, incanum, foliis orbiculatis.
——— ——— majus, arboreſcens, foliis rotundioribus, glaucis, limbo purpureo auctis.
——— ——— umbellatum, album, folio viridi, anguſto, mucronato, flore albo.
——— ——— annuum, Centaurii minoris facie, flore aureo.
SENECIO Africanus, arboreſcens, Ficoidis folio, & facie.
SIDEROXYLUM Africanum, Ceraſi folio.
SISYNRICHIUM Æthiopicum, ſeu Africanum, majus, anguſtifolium, floribus albis.
——— ——— ——— ——— ——— ——— latifolium, floribus albis, hexapetalis, lineis purpureis, ſtriatis.
——— ——— ——— ——— ——— minus, latifolium, flore hexapetalo, albo.
——— ——— Africanum, flore ex phoeniceo, ſuave rubente.
——— ——— ——— foliis Gladioli parvis, & longis, palleſcente flore.
——— ——— ramoſum, Æthiopicum, ſeu Africanum, foliis plicatis, nervoſis, & incanis, radice tuberoſa, phoenicea.
——— ——— majus, flore luteo, macula notato.

SOLA-

Sisynrichium Africanum, minus, anguftifolium, flore majore, variegato.
Solanum pomiferum, frutefcens, Africanum, fpinofum, nigricans, Borraginis flore, foliis profunde laciniatis.
—— lignofum, Africanum, fempervirens, Laurinis foliis.
Spartium Africanum, frutefcens, Ericae folio.
—— —— —— Rufci folio, caulem amplectente.
Spiraea Africana, foliis cruciatim pofitis.
—— —— odorata, floribus plane rubentibus.
—— —— —— foliis pilofis.
Staphylodendron Africanum, fempervirens, foliis fplendentibus.
Tanacetum Africanum, fruticans, multiflorum, foliis Tanaceti vulgaris, decuplo minoribus.
—— —— arborefcens, foliis Lavendulae multifidae folio.
Tetragonocarpos Africanus, radice magna, tuberofa, & carnofa.
—— —— —— —— fruticans, foliis longis, & anguftis.
Thymelaea Africana, Laurifoliae fimilis, floribus pallidis, odoratiffimis.
—— —— —— —— foliis lucidis, latioribus, & obtufis.
—— —— foliis Lini, floribus in capitulum congeftis.
—— —— Rorismarini folio, anguftiffimo, breviori.
—— —— —— —— —— —— longiori.
—— —— —— —— floribus longioribus.
—— —— Sanamundae facie, Ericae foliis anguftiffimis.
—— —— Tortan Raire fimilis, floribus in capitulum congeftis.
—— —— foliis Rufci.
—— —— anguftifolia, Jasmini flore.
Tithymalus aizoides, Africanus, fimplici, fquammato, caule.
—— —— —— —— —— —— —— Chamaenerii folio.
—— —— arboreus, Africanus.
—— —— —— Æthiopicus, vel Africanus, Mezerei Germanici folio, flore pallido.
—— —— aizoides, Africanus, validiffimis fpinis ex tuberculorum internodiis provenientibus.
Trifolium Africanum, fruticans, flore purpurafcente.
—— —— —— —— —— folio anguftiore, flore rubicante.
—— —— —— —— —— foliis incanis, flore luteo.
Tulipifera arbor Africana.
Valeriana Africana, fruticans, foliis longis, & anguftiffimis.
—— —— —— —— foliis anguftis, flore macula rubicante notato.
—— —— —— —— fruticans foliis Ericae.
Vitis Idaea Æthiopica, feu Africana, Myrti Tarantini folio, flore atro-purpureo.
—— —— —— —— —— —— Buxi minoris folio, floribus albidis.

Plantae exoticae in Capite Bonae Spei

aeque laete germinantes, ac in earum patria.

Abies. Acacia Americana, foliis Coluteae Scorpioidis leguminoſae, ſiliquis echinatis. Acetoſa hortenſis. Allium ſativum, & hortenſe. Alnus rotundifolia, glutinoſa, & viridis. Aloe Americ. ſobolifera. Althaea Indica, ſeu Roſa Sinenſis. Ananas, ſeu Carduus Braſilianus, foliis Aloes. Apium hortenſe, Petroſelinum vulgo. Arundo ſaccharifera. Asparagus ſativa, ſeu hortenſis. Beta rubra, & alba, radice Rapae. Batatas. Convolvulus. Braſſica alba, & rubra, capitata, & non capitata, item florigera. Camphoraria, ſeu arbor Camphorifera, ex qua Camphora officinarum. Cannabis ſativa, & erratica. Carduus Benedictus. Caryophyllus hortenſis. Caſſia Cinnamomaea, h. e. Cinnamomum, ſive Canella Ceylonica. Caſtanea ſylveſtris. Cepa vulgaris. Ceraſus varii generis. Chaerophyllum ſativum. Cicer ſativum. Cinara hortenſis, foliis non aculeatis. Clematis hederacea, Indica, foliis ſubrotundis, flore rubente. Corylus ſativa. Criſta Pavonis. Cucumis vulgaris. Cucumis flos paſſionis dictus. Cucurbita lagenaria, & rotunda. Cupreſſus ramis expanſis. Cyanus ſegetum, & hortenſis flore albo, coeruleo &c. Cytiſus arvenſis. Datura, ſeu Stramonia Indica, major, foetida, pomo ſpinoſo, oblongo. Faba leguminoſa. Foeniculum vulgare, Germanicum. Fragaria ferens fraga rubra. Frumentum Indicum Saracenicum. Fulli Magri, qui frutex eſt inſtar Groſſulariae creſcens, folia ferens, Ceraſi majora, flore albo, ſaepius pleno, odoratiſſimo, inſtar Jasmini, unde apud Italos Jasmin delmin vocatur, inde & Oleum conficiunt, quod uſurpatur inſtar Olei Jasmini. Fulli Enwanne eſt etiam Frutex ex Batavia delatus, folia ferens inſtar Guajavae, ſed minora, & anguſtiora. Flores gerens fragrantiſſimos, luteos, inſtar Stellae expanſos, roſaceos forte, ad altitudinem 12 pedum excreſcit hic frutex. Fulli aros brancho, Malabaris dicta Pelet Settangan, frutex eſt ad hominis altitudinem excreſcens, flores gerens albos & luteos inſtar Roſae Sinenſis, folia Mali vulgaris. Flores tam amoenum ſpirant odorem, inſtar Narciſſi Chonquillae dicti, in horto Societatis Indico tantum occurrunt & a foeminis ob elegantiſſimum, & fragrantiſſimum odorem maxime ibi appetuntur. Gramen vulgare, item bulboſum, & Spartium Hollandicum. Groſſularia multiplici acino, ſive non ſpinoſa, hortenſis, rubra & alba. Guajaca alba, dulcis, ſive Guajabo, pomifera, Indica. Hordeum vernum, & hybernum. Hyacinthus albus. &c. Intibus ſativa, latifolia, & criſpa. Juniperus vulgaris, baccis purpureis, parvis. Kaezschebyring, Japonenſibus Kutschines, arbor ex inſula Madagaſcar delata, convenit cum Fulli aros Brancho, flores gerens forma, Narciſſi lutei, ejusdemque odoris, qui a foeminis ob odorem maxime amatur, ſemen dat luteum, quo Japonenſes tincturam faciunt, qua induſia tingunt. Kaeyiumas, ſeu flos aureus Indorum, quae tranſportata eſt ob folia elegantia aurea, quae forma ſunt Lyſimachiae foliorum, ſed eleganter picta ſunt ex luteo & rubro, quae aureo-lutea videntur. Flores puſilli ſunt virideſcentes, inodori; ob elegantiſſima folia in hortis colitur, quibus etiam omnes alias excellit arbores, creſcit ad hominis altitudinem.